

**GEOCHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN  
DER VARISTISCHEN MAGMATITE  
DES VORDEREN BAYERISCHEN WALDES**

**Michael Olbrich**



**GEOCHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN**  
**DER VARISTISCHEN MAGMATITE**  
**DES VORDEREN BAYERISCHEN**  
**WALDES**

Inaugural - Dissertation

zur

Erlangung des Doktorgrades

im

Fachbereich Geowissenschaften

der

LUDWIG - MAXIMILIANS - UNIVERSITÄT

MÜNCHEN

vorgelegt von

MICHAEL OLBRICH

München, August 1985

1. BERICHTERSTATTER: Prof.Dr. G. Propach

2. BERICHTERSTATTER: Prof.Dr. D.D. Klemm

TAG DER MÖNDLICHEN PRÜFUNG: 23.07.1986

## DANKSAGUNG

Die vorliegende Arbeit entstand in den Jahren 1979 bis 1983.

Ich möchte an dieser Stelle zuerst Herrn Professor Dr. G. PROPACH für das Vertrauen, das er mir mit der Übertragung dieser komplexen Arbeit erwiesen hat, danken.

Herrn Professor Dr. G. HUCKENHOLZ danke ich für die Erlaubnis der uneingeschränkten Benutzung der Institutseinrichtungen, sowie für fruchtbare Diskussionen über petrologische Problemstellungen.

Herr Professor Dr. D. D. KLEMM und Herr Professor Dr. K. WEBER-DIEFENBACH gestatteten freundlicher Weise die Benutzung der Röntgenfluoreszenzanlage im Institut für Allgemeine und Angewandte Geologie.

Herrn Dr. W. KOLLER von der Universität Wien gilt mein Dank für die freundliche Übersendung der neuesten chemischen Analysen der Magmatite des Waldviertels.

Darüberhinaus gilt mein Dank all jenen Kollegen und Institutsangehörigen, die in freundlicher und produktiver Weise bei der Fertigstellung der Arbeit mitgewirkt haben.

Zuletzt möchte ich dem Gremium der Deutschen Forschungsgemeinschaft danken, welches über Herrn Professor Dr. G. PROPACH diese Arbeit über einen Zeitraum von 36 Monaten gefördert hat.



## Zusammenfassung

Um einen genaueren Einblick in das magmatitische Geschehen im Vorderen Bayerischen Wald zu bekommen, wurden die Intrusivgesteine dieses ca. 5000 km<sup>2</sup> großen Gebietes im Osten Bayerns, möglichst flächendeckend beprobt. Die große Anzahl der Gesteinsproben (mehr als 240), sowie die (teilweise) geographisch getrennte Lage der 22 Intrusiva, bedingte, aus Gründen einer besseren Übersichtlichkeit, in diesem Falle eine subjektive Einteilung nach geographischen Erwägungen. Resultierend daraus war eine Trennung in vier Gebiete, die einzeln beschrieben, aber gemeinsam diskutiert werden.

Es sind dies von Westen nach Osten:

- 1) Die Intrusiva des Regensburger Waldes
- 2) Das Intrusivgebiet von Sattelpfeilstein, Flasergranit und die Granite von Lalling und Metten
- 3) Das Fürstensteiner Intrusivgebiet
- 4) Die Intrusiva des Passauer Waldes.

Die Gesteinsproben wurden petrographisch, geochemisch untersucht. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte unter Berücksichtigung von petrologischen Aspekten (System Ab-An-Or-Qz-H<sub>2</sub>O).

Es stellte sich bei diesen Untersuchungen heraus, daß es geochemische, petrologische und auch petrographische Übereinstimmungen zwischen den früh intrudierten Dioriten und den altersmäßig nicht stark differierenden "älteren" Graniten gibt. Neben linearen Beziehungen in Variationsdiagrammen sind dies eine gemeinsame Lage ihrer Projektionspunkte im Plagioklasvolumen des

Granitsystems und in Mineralbestandsähnlichkeiten der Plagioklase (Plagioklase mit Rekurrenzen). Die später intrudierten Magmatite (= jüngere Granite) liegen, mit Ausnahme der Passauer Wald Intrusiva, im Phasenvolumen des Alkalifeldspates. Diese sind zumeist auch deutlich höher differenziert. Eine Entstehung aus den älteren Graniten durch Differentiation ist aus petrologischen Überlegungen nicht möglich. Als ein mögliches genetisches Modell wird über Mischungsverhältnisse von dioritischen und hochdifferenzierten granitischem "Material" versucht, eine Korrelation, vor allem der Granite untereinander zu erzielen, die den beobachteten Fakten genüge trägt.

Aus diesen Modellrechnungen, die nur für ideale Verhältnisse durchgeführt wurden (keine Zu- bzw. Abfuhr von Elementen), ergeben sich bei teilweise unterschiedlichen Mischungsverhältnissen, recht gute Übereinstimmungen, die im einzelnen diskutiert werden.

Eine Neuordnung wird für die sich östlich an den Regensburger Wald anschließenden Magmatite getroffen, wobei die nördlichen Granite (Flasergranit, Granit von Sattelpellstein) den Graniten des Regensburger Waldes zugeordnet werden, die Granite von Lalling und Metten aber dem Intrusivgebiet von Fürstenstein. Daraus resultieren im Vorderen Bayerischen Wald, durch geochemische sowie petrologische und petrographische Vergleiche, drei Intrusivbereiche:

- 1) Intrusiva des Regensburger Waldes
- 2) Intrusiva von Fürstenstein
- 3) Intrusiva des Passauer Waldes.

Letzterer zeigt, abweichend von den anderen Gebieten, mit abnehmendem Intrusionsalter eine Zunahme in der Basizität der Magmatite.

Durch einen beobachteten Differentiationstrend der Diorite und älteren Granite in Richtung höherer Differentiationsindexe von West nach Ost, unter Berücksichtigung einer gleichgerichteten Krustenverdickung, ergibt sich folgende Modellvorstellung:

Auf Grund der mächtigeren Kruste im Osten war der Erstarrungsort eingedrungener (Mantel-) Schmelze tiefer. Die heute freigelegten Areale entsprechen tieferen Krustenniveaus im Westen und höheren im Osten. Um die mit abnehmendem Alter wachsende Basizität im Passauer Wald zu erklären, wird hier ein erneuter Schub basischen Materials postuliert.

Ein Vergleich von varistischen Magmatiten in Europa erbrachte, vor allem für die Granite, eine Zunahme im Differentiationsgrad vom österreichischen Waldviertel über den Vorderen Bayerischen Wald, den Schwarzwald bis zum Massiv Central und gegen die Pyrenäen wieder eine leichte Abnahme. Eine Zuordnung dieses Trends zu einer Subduktionszone scheint zu gewagt. Eine Möglichkeit dies zu erklären wäre durch unterschiedliche Krustenniveaus gegeben, wobei vom Waldviertel und auch den Pyrenäen gegen das Massiv Central immer höhere Krustensegmente angeschnitten sind.



1

Einleitung

Schon GOMBEL (1868) stellte im Vorderen Bayerischen Wald intensive geologische und petrographische Untersuchungen an. Intensiv bearbeitete CLOOS (1923) Teile der hier anzutreffenden Magmatite (Passauer Wald). Er leitete danach ihre Herkunft vom sogenannten Bayerischen Pfahl, einer WNW-ENE gerichteten Störungszone, ab. Es folgten zahlreiche Arbeiten, die sich in erster Linie auf beschreibende, sowie tektonische Aspekte (Gefügeregelungen, Kluftmessungen etc.) beschränkten. Detaillierte petrographische Arbeiten, insbesondere mikroskopische Bearbeitungen, verhalfen zu einer besseren Kenntnis bezüglich des Mineralbestandes. So wurde der Modalbestand einer ganzen Reihe von Magmatiten des Vorderen Bayerischen Waldes ermittelt (FISCHER 1965).

Mit gezielten geochemischen Bearbeitungen der Magmatite wurde erst gegen Ende der siebziger Jahre im Regensburger Wald begonnen (PROPACH et. al.).

Experimentell ermittelte Kenntnisse von P.T-Stabilitätsgrenzen der verschiedenen Mineralparagenesen ermöglichten es, für die mikroskopisch beobachteten Mineralparagenesen, die während der Metamorphose herrschenden P.T-Bedingungen zu rekonstruieren.

So ergab sich für den nordwestlichen Teil des Vorderen Bayerischen Waldes für die kaledonische Metamorphose ein maximaler Druck von etwa 4 kbar und Temperaturen um 690°C (BLÖMEL 1976).

Diese Fakten sind bei der Diskussion der Genese der Magmatite, bezüglich der petrologischen Betrachtung von großer Bedeutung.

## 2

## Methodik

Für die Auswertung der Gesteinsproben und Gesteinsanalysen liegen die im folgenden beschriebenen Methoden zu Grunde.

### 2.1

### Probennahme

Die Gesteinsproben wurden bei mehreren Geländebegehungen gesammelt. Soweit verfügbar wurde auf die geologischen Karten im Maßstab 1:25 000 zurückgegriffen, meistens musste jedoch die Übersichtskarte des Bayerischen Waldes (Maßstab 1:100 000) genügen.

Bei der Probennahme wurde auf einen möglichst geringen Verwitterungsgrad der einzelnen Proben geachtet. Die Probenmenge betrug je nach Körnigkeit der Gesteine zwischen 7kg (feinkörniger Quarz-Glimmerdiorit) und ca. 30kg (porphyrischer Saldenburger Granit).

### 2.2

### Probenaufbereitung

Die Proben wurden in einem ersten Arbeitsgang "entrindet",

anschließend zerkleinert und in einem Backenbrecher auf eine Korngröße von etwa 0,5 cm gebrochen. In einer Scheibenmühle wurde das Gestein zermahlen und anschließend aliquotisiert. 50 bis 70 Gramm des für das Gesamtgestein repräsentativen Aliquots wurden eineinhalb Minuten in einer Scheibenschwingmühle gemahlen. Dieses Gesteinspulver diente dann als Ausgangsmaterial für die nachfolgenden Arbeitsgänge.

## 2.3 Petrographie

Die Proben wurden mikroskopisch auf das Gefüge und den Mineralbestand untersucht. Des weiteren wurde in jeder Probe der Anorthitgehalt der Plagioklase, mittels des Auslöschungswinkels, optisch bestimmt.

## 2.4 Geochemie

### 2.4.1 Herstellung von Glastabletten

Zur Herstellung der benötigten Glastabletten, für die Röntgen-Fluoreszenz-Analyse, wurden zwei Gramm des gesamt-gesteins-repräsentativen Gesteinspulvers, eine Stunde bei 950°C in einem Muffelofen geglüht, im Verhältnis 1:2 mit wasserfreiem Lithiumtetraborat versetzt und innig verrührt.

Dieses Gemenge wurde in einem, zuvor thermisch, geeichten Induktionsofen bei 1400°C innerhalb 200 Sekunden vollständig aufgeschmolzen, durch Schwenken des Pt-Au-Tiegels homogenisiert und in eine erwärmte Platinform geleert.

## 2.4.2

### Analysenverfahren

### 2.4.2.1

#### Röntgenfluoreszenz-Analyse

Die Röntgenfluoreszenz-Analysen wurden am Institut für Allg. und Angewandte Geologie der L.M.U. München durchgeführt, da hier eine moderne, zeitsparende, energiedispersive Röntgenfluoreszenz-Anlage mit automatischem Probenwechsler (bis max. 24 Proben) der Firma ORTEC (Typ TEFA 6111) zur Verfügung stand.

Für die Erstellung der Eichgeraden dienen bei diesem Verfahren internationale Standards. Mittels eines Korrekturprogrammes werden diese Matrixeffekte eliminiert. Bei jeder Meßreihe wird im folgenden eine internationale Standardprobe, die bei der Erstellung der Eichgeraden beteiligt war, mitgemessen und diese, falls es durch Geräteschwankungen nötig ist, rechnerisch auf die Eichgerade "projiziert". Jede nun gemessene, unbekannte Probe wird mit dem für den bekannten Standard ermittelten, elementspezifischen Umrechnungsfaktor multipliziert. Dadurch werden Fehler, infolge von Geräteschwankungen, gering gehalten. Die endgültigen Elementkonzentrationen werden anschließend iterativ berechnet und gleichzeitig eine Matrixkorrektur

wiederholte Messungen einer Probe ergaben keine nennenswerten Schwankungen bei den Elementgehalten.

Tabelle 1:

10-fach Messung einer Probe

|                         | Mittelwert $\bar{x}$ | Standardabweichung s |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| $\text{SiO}_2$          | 70,12                | 0,25                 |
| $\text{TiO}_2$          | 0,38                 | 0,004                |
| $\text{Al}_2\text{O}_3$ | 15,01                | 0,12                 |
| $\text{Fe}_2\text{O}_3$ | 2,74                 | 0,02                 |
| $\text{MnO}$            | 0,10                 | 0,005                |
| $\text{MgO}$            | 0,55                 | 0,07                 |
| $\text{CaO}$            | 2,51                 | 0,02                 |
| $\text{Na}_2\text{O}$   | 3,45                 | 0,21                 |
| $\text{K}_2\text{O}$    | 4,20                 | 0,01                 |
| $\text{P}_2\text{O}_5$  | 0,22                 | 0,01                 |

Eine Schwierigkeit beim energiedispersiven Verfahren liegt in der Bestimmung des Elementes Natrium. Natrium wurde deshalb nachträglich an einer wellenlängendispersiven Anlage (Marke PHILIPS PW 1410) im Mineralogisch-Petrographischen Institut der L.M.U.-München gemessen und anschließend rechnerisch in die Gesamtanalyse eingefügt.

#### 2.4.2.2

#### Naschemie

Das zweiwertige Eisen wurde unter Stickstoffzufuhr in einem Schwefel-Flussäuregemisch aufgelöst und anschließend mit Hilfe von Kaliumdichromat titrimetrisch bestimmt.

#### 2.4.2.3

#### Pyrohydrolyse

Fluorbestimmung (nach FARZANEH, 1980)

Die Extraktion des Fluors aus dem Gesteinspulver erfolgte auf pyrolytischem Weg. Das Ionenpotential wurde anschließend mittels einer fluorionensensitiven Elektrode gemessen und aus diesem rechnerisch der eigentliche Elementgehalt bestimmt.

#### 2.5

#### Variationsdiagramme

In binären bzw. ternären Korrelationsdiagrammen werden die

Elementverhältnisse der einzelnen Gesteine sowie deren Bezug zueinander graphisch dargestellt (z.B. Differentiation). Die eingetragenen Werte sind den Tabellen im Anhang II entnommen.

## 2.6

### Petrologie

#### Das System An-Ab-Or-Qz-H<sub>2</sub>O ("Granit-System")

##### Allgemeines zum Granitsystem

Die granitoiden Gesteine werden in den Gesteinsnormen (Meso-Norm, C.I.P.W.-Norm) zum überwiegenden Teil durch die Komponenten Anorthit (An), Albit (Ab), Orthoklas (Or) und Quarz (Qz) repräsentiert. Da sich diese Arbeit mit den granitoiden Gesteinen des Vorderen Bayerischen Waldes befaßt, erscheint es angebracht, die Entstehungsgeschichte dieser Gesteine in dem von PRESNALL und BATEMAN (1973) erarbeiteten Granit-System zu diskutieren.

Ein wichtiger Faktor, der die Lage der Phasenvolumina von Plagioklas<sub>ss</sub>, Orthoklas<sub>ss</sub> und Quarz (siehe Abb. 1) beeinflusst, sind die leichtflüchtigen Komponenten. So wandert die Phasengrenze Feldspäte/Quarz, bei Zunahme des H<sub>2</sub>O-Druckes, von der Qz-Ecke in Richtung der Feldspatsseite.

Neben dem H<sub>2</sub>O-Gehalt beeinflusst die An-Komponente das Granit-System maßgeblich. Eine Erhöhung des An-Gehaltes bewirkt eine Verschiebung des ternären isobaren Eutektikums (a in Abb. 1), in Richtung der Fläche An-Or-Qz.


In der Literatur ist das System An-Ab-Or-Qz-H<sub>2</sub>O ausführlich nur

bei einem Druck von  $P = 5 \text{ kbar-H}_2\text{O}$  beschrieben, so daß im folgenden nur auf diese Arbeit zurückgegriffen werden kann.

Durch die Festsetzung des Druckes ( $P\text{-H}_2\text{O} = 5 \text{ kbar}$ ) würde für dieses System nach der Phasenregel gelten : Zahl der Phasen + eine Freiheit = Zahl der Komponenten . Da das System aber durch das Auftreten von  $\text{AbAn}_{\text{ss}}$  und  $\text{AbOr}_{\text{ss}}$  (ss = Mischkristalle) degeneriert ist, kann sie so nicht angewandt werden, d.h. der Systemzustand ist dadurch unbestimmter.

Abb. 1:

Das  $\text{An}(\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8)\text{-Ab}(\text{NaAlSi}_3\text{O}_8)\text{-Or}(\text{KAlSi}_3\text{O}_8)\text{-Qz}(\text{SiO}_2)\text{-System}$   
bei  $P_{\text{H}_2\text{O}} = 5 \text{ kbar}$



(Liquidusdiagramm aus PRESNALL u. BATEMAN, 1973; die Linie a-b aus WINKLER u. BREITBART, 1978)

Das Tetraeder setzt sich zusammen aus drei Phasenvolumina:

a) zuerst wird Plagioklas ausgeschieden ( $a-a'-b'-b-c-d-An-Ab$ ),

b) zuerst wird Quarz ausgeschieden ( $d-a-e-b-c-Qz$ ),

c) zuerst wird Alkalifeldspat ausgeschieden ( $a'-a-e-b-b'-Or$ ).

Diese drei primären Phasenvolumina berühren sich in der Linie a-b, entlang welcher, Plagioklas<sub>...</sub>, Alkalifeldspat<sub>...</sub> und Quarz im Gleichgewicht mit der Schmelze und H<sub>2</sub>O stehen. Diese Linie a-b entspricht im System ohne Mischkristallbildung einer quaternären, isobar unvarianten Linie. Da aber das System, wie oben besprochen degeneriert ist, stellt sie vielmehr die Projektion einer isobaren bivalenten Fläche dar.

Es befinden sich im Gleichgewicht mit der Schmelze + H<sub>2</sub>O:

auf der Fläche (a-b-c-d) Plagioklas + Quarz,

auf der Fläche (a-b-e) Alkalifeldspat + Quarz,

auf der Fläche (a-a'-b'-b) Alkalifeldspat + Plagioklas.

Die Linien mit den Pfeilen stellen die isobaren Schmelzkurven dar, und zwar mit abnehmender Temperatur in Richtung der Pfeile.

Geht man von einer Schmelze aus, die z.B. im Phasenvolumen des Plagioklas liegt, so beginnt die Ausscheidung mit einem Plagioklas<sub>...</sub>, der so lange ausgeschieden wird, bis die Zusammensetzung der Restschmelze entweder auf die Fläche: (a-b-c-d) in Abb. 1 gelangt, wo Plagioklas<sub>...</sub> und Quarz nebeneinander auskristallisieren, oder auf die Fläche:

(a-a'-b'-b), auf der es zur Ausscheidung von Alkalifeldspat<sub>...</sub> und Plagioklas<sub>...</sub> kommt. Auf dieser jeweiligen Fläche wandert die Zusammensetzung der Restschmelze bei sinkender Temperatur auf die Linie (a-b) zu, entlang der die drei Phasen AbAn<sub>...</sub>+AbOr<sub>...</sub>+Qz mit

der Schmelze + H<sub>2</sub>O isobar bei fallender Temperatur im Gleichgewicht stehen und schließlich entlang dieser Linie zum

ternären isobaren Eutektikum des Systems Ab-Or-Qz, an dem der Rest als Zusammensetzung von a auskristallisiert


Wichtig ist in dieser Betrachtung, das eine Schmelze, die unter Gleichgewichtsbedingungen auskristallisiert und ihren Ursprung z.B. im Phasenvolumen des Plagioklas hatte, auf keinen Fall in ihrer Zusammensetzung in entweder das Phasenvolumen des Alkalifeldspates oder des Quarzes gelangen kann.

Ein solcher Vorgang läßt sich nur erklären, wenn das System offen war, d.h. wenn z.B. der Schmelze von "außen" etwas zugeführt wurde.

Da eine Eintragung der Projektionspunkte aus der Gesteinsnorm (Meso-Norm) in das Tetraeder des "Granit-Systems" nur schwer durchführbar und darüber hinaus für den Betrachter verwirrend ist, wird in der Folge die Projektion von der Qz-Ecke auf die Seite An-Ab-Or herangezogen (Abb. 2)

Die Abbildung 2 zeigt die Linie (a'-b') als Projektion (doppelt gezogene Linie), die Isothermen und die isobar kotektischen Flächen: Plagioklas<sub>100</sub>+Quarz+L+V sowie Alkalifeldspat<sub>100</sub>+Quarz+L+V bei einem Druck von  $P-H_2O = 5$  kbar. Die Zahlen in der Abb. geben den prozentualen Anteil von Quarz in den jeweiligen Flächen an.

Abb. 2: Die Projektion des "Granit-Systems" von der Qz-Ecke auf die Seite An-Ab-Or bei  $P_{H_2O} = 5$  kbar (aus WINKLER u. BREITBART, 1978)



Die in der Abb. 2 eingetragene Linie a-b (als Projektion der Linie a-b auf die Seite An-Ab-Or) verfälscht die Lage der Grenze der Phasenvolumen von Plagioklas... und Alkalifeldspat... nicht oder nur gering (siehe Abb. 2), da die Projektionspunkte der Granite des Vorderen Bayerischen Waldes die im Alkalifeldspatvolumen zu liegen kommen, alle nahe der Liquidusfläche von Alkalifeldspat und Quarz liegen.

## 2.7 Multivariates statistisches Verfahren

Durch die Anwendung des hier benützten Verfahrens wird versucht, die Datenfülle auf eine geringere und dadurch übersichtlichere Datenmenge zu reduzieren.

Das Ziel dieser Methode ist, dabei festzustellen, ob eine

Klassifikation der Intrusiva des Vorderen Bayerischen Waldes nach geochemischen Gruppen möglich ist. Dazu wird zunächst jedes Intrusivgestein für sich analysiert und weiterhin angestrebt, die Intrusivgesteine eines Gebietes und die aller 4 Intrusivgebiete miteinander zu vergleichen.

#### 2.7.1

#### Diskriminanzanalyse

Bei der multivariaten Diskriminanzanalyse ist die Möglichkeit verwirklicht, zwei oder mehr Stichprobengruppen einer Grundgesamtheit von Analysen mit Hilfe aller gemessenen Variablen auf ihre Ähnlichkeit hin zu untersuchen. Hierbei werden die Stichprobengruppen im sogenannten "Diskriminanzraum" projiziert und Diskriminanzfunktion so abgeleitet, daß eine möglichst geringe Überlappung der Stichproben eintritt. Anschaulich läßt sich das vektoriell beschreiben: Im dreidimensionalen Beispiel wird die Projektionsrichtung von Punktwolken auf eine Projektionsebene (Diskriminanzebene) so festgelegt, daß die Punktwolken möglichst weit voneinander getrennt zu liegen kommen. Im n-dimensionalen Merkmalsraum gilt dies analog. Bei der Projektion unbekannter Proben im Diskriminanzraum kann somit festgelegt werden, welcher Probengruppe sie zuzuordnen sind, je nachdem, wo der Projektionspunkt zu liegen kommt. Generell finden zur Diskrimination von n Punktwolken n-1 Diskriminanzfunktionen Verwendung.

### 3 Neuere Erkenntnisse der Magmen- entwicklung und deren Anwen- dung in dieser Arbeit

(nach CARMICHAEL, TURNER, VERHOOGEN, 1974)

Die Entstehung von Intrusivgesteinen kann in drei aufeinander folgende Abschnitte gegliedert werden:

1) Die Ursachen, die zu einer Aufschmelzung im (oberen) Mantel oder der (unteren) Kruste geführt haben.

Dies hängt in erster Linie von der chemischen Ausgangszusammensetzung, den vorherrschenden Temperaturen und Drucken, sowie dem Anteil der volatilen Komponenten ab, die gemeinsam die Zusammensetzung der partiellen Schmelze bedingen.

2) Die Bedingungen, denen das Magma beim Aufstieg in höhere Krustenniveaus unterworfen ist.

Beim Aufstieg des Magmas durchwandert es verschiedene druckbedingte Mineral-Stabilitätsgrenzen, so daß sich die Schmelzzusammensetzung des Magmas ändert, wenn es zu einer Ausscheidung und Ablagerung der früh ausgeschiedenen druck- und temperaturabhängigen Minerale kommt.

3) Die Wechselwirkung des Magmas mit dem Krustengestein oder mit Krustenschmelze.

#### 3.1 Die magmatische Differentiation

Die magmatische Differentiation umfaßt die Prozesse, welche aus

einer ursprünglichen Magmenzusammensetzung, ohne Kontamination zu chemisch unterschiedlich zusammengesetzten Intrusivgesteinen führen.

Hier ist in erster Linie die *Differentiation durch Kristallisation* mit fallender Temperatur zu erwähnen. Dabei unterscheidet sich die verbleibende Schmelze von der Ausgangszusammensetzung. Sie ist höher differenziert.

Unter der *Fraktionierten Kristallisation* versteht man alle mechanischen Prozesse, die dazu führen, daß die früh ausgeschiedenen Minerale nicht mehr im Gleichgewicht mit der Schmelze stehen, aus der sie hervorgegangen sind. Die resultierenden Schmelzen werden so im Laufe der Zeit reicher an Silizium und Alkalien, Eisen reichert sich in Bezug auf Magnesium an.

Bei der *Gravitativen Differentiation* sinken die früh ausgeschiedenen schweren Minerale in einer nicht sehr dichten Schmelze ab. Dieser Vorgang beschreibt einen frühen Zeitpunkt in der Magmenentwicklung, zu einer Zeit, da die Schmelzphase vorherrscht und die Schmelze noch nicht zu viskos ist.

Die *Fließdifferentiation* beschreibt einen Vorgang, bei dem Minerale sich während der Intrusion in Bereichen von höherer Viskosität der Schmelze anreichern (z.B. Bereiche am Kontakt: Magma/Festgestein).

Die *Dilatation* bezeichnet einen Vorgang, der zu einem späten Zeitpunkt der Gesteinsbildung eintreten kann, wenn die Kristallisation des Magmas weit vorangeschritten ist. Das auslösende Moment ist hier eine "Reistraumverengung", hervorgerufen durch eine Volumenvergrößerung bei der Auskristallisation. Diese Schmelze kann so aus dem zum größten

Teil verfestigten Magma herausgepresst werden und einen separaten Magmenkörper bilden.

### 3.2

#### Die Mischung von Magmen

Die unterschiedlichen Chemismen verschiedener Intrusivgesteine können neben der Differentiation eines Magmas auch auf die Mischung verschiedener Magmen zurückzuführen sein. Einen derartigen Vorgang diskutiert PROPACH (1978) für die Magmatite des Regensburger Waldes, worin er bei der Bildung des Kristallgranits I eine Zufuhr von Mantelmaterial annimmt. Eine solche Mischung kann aber nicht uneingeschränkt postuliert werden, da unterschiedliche Magmen (insbesondere so divergierende Magmen, wie Mantelderivate und saure krustale Schmelzen), deutliche Abweichungen hinsichtlich ihrer polymeren Strukturen aufweisen, wodurch die Mischbarkeit beider Schmelzen beschränkt ist.

### 3.3

#### Assimilation

Unter Assimilation versteht man die Aufnahme von festen Gesteinsmaterial der umgebenden Kruste durch das eindringende Magma. Dieser Vorgang kann zu einer deutlichen Änderung des Ausgangschemismus des intrudierenden Magmas führen. FOURCADE und

ALLEGRE (1981), diskutierten einen solchen Vorgang für die Entwicklungsgeschichte der basischen Gesteinsserie in den Pyrenäen.

### 3.4

#### Reliktische Bestandteile in Magmatiten

Neben WHITE und CHAPPELL (1977) und PITCHER (1978), diskutierten auch schon PRESNALL und BATEMAN (1973), daß unterschiedliche Anteile an, in der Schmelze mitgeführten, reliktschen Bestandteile (metastabile Minerale), den Chemismus der resultierenden Intrusivgesteine beeinträchtigen. PRESNALL und BATEMAN (1973) erklärten auf diese Weise die Abfolge der dioritischen bis granitischen Gesteinsabfolge im Sierra Nevada Batholith.

Eine Schwierigkeit bei diesem Modell besteht in der Erkennung der reliktschen Natur von Mineralen in den Gesteinen. Als solche werden von WHITE und CHAPPELL (1977) und PITCHER (1978) komplex zonar gebaute und verzwillingte Plagioklase sowie Granat, Alumosilikate und Hornblendeaggregate angesprochen.

## 4 Vorkommen der Varistischen Magmatite in Europa

Eine große Anzahl der kristallinen Gebiete innerhalb ganz Europas sind varistischen Ursprungs. Diese erstrecken sich vom Böhmschen

Massiv und dem Harz über den Schwarzwald, die Vogesen, das Massiv Central, die Pyrenäen bis zum Iberischen Massiv. Daneben gibt es Vorkommen in Korsika und Sardinien, sowie in der Bretagne und Südwest-England (siehe Abb. 3)

Abb. 3:

Die varistischen  
Magmatite in  
Mitteleuropa  
(nach Hall, 1973)



#### 4.1 Modellvorstellungen zur Bildung der Varistischen Magmatite in Mitteleuropa

Bei der Frage nach dem auslösenden Mechanismus der Varistischen Orogenese in Mitteleuropa gibt es verschiedene Theorien.

Diese sind:

1. Eine durch vertikalen Magmenaufstieg ausgelöste, gravitative Deformation der sedimentgefüllten Tröge (KREBS u. WACHENDORF 1973)
2. Eine laterale Kompression als Ausdruck einer Krustenverkürzung (LAURENT 1972; NICOLAS 1972; BURRETT 1972; NICHOLLS u. LORENZ 1973).
3. Das "Subfluenz-Modell" (BEHR 1977).

zu 1.

Nach KREBS und WACHENDORF (1973/74) ist das mitteleuropäische präkambrisch-paläozoische Grundgebirge durch einen wiederholten orogenen Diapirismus in einzelnen Faltungskernen gekennzeichnet. Nach ihrer Vorstellung handelt es sich um aus der Ästhenosphäre aufsteigende Manteldiapire, die lokale Wärmedome bilden und in der darüberliegenden Kruste regionalmetamorphe Gebiete mit anatektischen Kernzonen bilden. Diese anatektischen Kernzonen wurden ihrerseits häufig von sauren und intermediären Intrusiva durchdrungen. Diese Faltungskerne repräsentieren während der präkambrisch-paläozoischen Geosynklinalentwicklung ortskonstante Hochlagen kristalliner Gesteine (z. B. zentralböhmisches Moldanubikum, Ost-Erzgebirge, Schwarzwald). Von den Kristallinkernen können im Laufe der Geosynklinalentwicklung die Faltung und die Metamorphose schrittweise in die benachbarten Sedimentationsräume hineinwandern (HOTH u. HIRSCHMANN 1970). Gleichzeitig mit der Heraushebung und Erosion der lokalen Hochzonen erfolgte die Einsenkung der korrespondierenden Tröge mit mächtiger Sedimentfüllung. Die teilweise schon präkambrisch angelegten Faltungskerne erfahren im Karbon einen erneuten Höhepunkt syn- und postkinematischer Intrusionen. Die postkinematischen vorwiegend granitischen Schmelzen dringen in die altangelegten Wärmedome ein, was infolge der dadurch bedingten Überdehnung zu Aufwölbungen und grabenartigen Einbrüchen der Innenmolassebecken führt. Beispiele von Hochzonen und korrespondierenden Trögen im mitteleuropäischen Grundgebirge sind (nach KREBS 1974):

| <u>Kristalline Hochzone</u>   | <u>Korrespondierender Trog</u> |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Zentralböhmisches Moldanubium | Barradium                      |
| Fichtelgebirge-Westerzgebirge | Südliches Vogtland             |
| Oberharzer Devonsattel        | Goslarer Trog                  |

zu 2.

Verschiedene Autoren versuchen die Varistische Orogenese mit Hilfe der Plattentektonik zu deuten. Die Richtungen der von ihnen angenommenen Subduktionszonen variieren dabei. Einzelne Autoren versuchen eine Deutung mit zwei zwischen der Rhenoharzynischen Saxothuringischen Zone entgegengesetzten Subduktionszonen (LAURENT 1972; BURRETT 1972).

Als Hauptargumente liegen allen Arbeiten dieser Theorie folgende drei Fakten zu Grunde:

- a) der Verlauf der devonisch-karbonischen Spillite,
- b) als Melange im Harz angesprochene Gesteinskomplexe und
- c) petrochemische Befunde an Vulkaniten der Saar-Nahe-Senke.

Folgende Ergebnisse widersprechen aber diesem Modell:

zu a)

Nach geochemischen Untersuchungen (HERRMANN u. WEDEPOHL 1970) entsprechen die Varistischen Spillite kontinentalen Tholeiiten. Sie sind stets konkordant in marine Sedimente eingelagert und kommen in nahezu allen mobilen Trögen, vom Protoerozoikum bis zum Unterkarbon vor. So ergeben sich keine Hinweise dafür, daß die Spillite allochthonen Relikten einer ozeanischen Kruste entsprechen. Nach ZWART (1967) ist das gesamte mitteleuropäische Orogen vielmehr über kontinentaler Kruste aufgebaut.

zu b)

KREBS u. WACHENDORF (1974) trennten die aus submarinen Rutschungen entstandenen Gesteinseinheiten, die in der Harzgeröder Zone und in der Umgebung des Elbingeröder Komplexes

weit verbreitet sind, von den als Melange bezeichneten Vorkommen, die nur auf die Südharzmulde beschränkt ist, ab. Die Melange entstand durch eine Zerschörung in schon verfestigtem Zustand, unter der Auflast der gravitativ en bloc bewegten mehreren hundert Metern mächtigen Südharzgrauwacken in den mittel- bis tiefoberdevonischen Sandsteinen, Diabasen, Ton- und Kiesel-schiefern. Einen Bezug zu einer Subduktionszone schlossen diese Autoren aus.

zu c)

Permokarbonische Rhyolite, Andesite und Basalte sind nicht nur auf die Saar-Nahe-Senke beschränkt, sondern im ganzen mitteleuropäischen Grundgebirge weit verbreitet (EIGENFELD u. SCHWAB 1974). Und die von diesen Autoren festgestellten Zusammenhänge zwischen dem räumlichen und zeitlichen Ausklingen der Varlistischen Hauptdeformation und dem Beginn des permokarbonischen Magmatismus, lassen ebenso wie die Bindung dieser Vulkanite an alte Faltungskerne (S-Typ), Inversionsstrukturen (T- und B-Typ), beziehungsweise Lineamente (B-Typ), keine Verknüpfung mit einem Plattenrand in Mitteleuropa erkennen (KREBS 1976).

zu 3.

Ein drittes Modell, das sogenannte "Subfluenz-Modell", wurde von BEHR (1977) vorgestellt. Bei diesem Modell handelt es sich, vereinfacht ausgedrückt, um eine Art Subduktionszone von örtlich sehr begrenztem Ausmaß, wobei Krustensegmente gegeneinander verschoben werden. Für die Böhmisches Masse werden acht Granulitgürtel abgeleitet (Abb. 4):



Diese Granulitgürtel kennzeichnen Grossscherzonen, die bis hinab in die Unterkruste reichen und auf denen die Subfluenzprozesse ablaufen. Im abtauchenden Segment wird in größerer Tiefe Wasser freigesetzt, das auch bei nur sehr geringen Mengen im Kontakt mit den äußeren Bereichen der tiefliegenden Granulite dem Quarzkorngefüge der Granulite randlich durch "hydrolytic weakening" die Funktion eines tektonischen Schmiermittels verleiht. Dadurch wird eine erhöhte Mobilität der Granulite erzielt. Es ermöglicht den Granuliten den Aufstieg entlang der Grossscherzonen durch die Kruste. Im Abtauchen wird unter fortgesetztem Temperaturanstieg und fortgesetzter Dehydration ein Teil des subduzierten Materials aufgeschmolzen. Diese mobilisierten Magmen steigen entlang der Störungszonen auf und bilden am Ort ihrer Erstarrung magmatische "Gürtel".

## 5 Der Vordere Bayerische Wald

### 5.1 Geographische Lage

Der Vordere Bayerische Wald bildet den südwestlichen Teil des Böhmisches Massivs. Er liegt inmitten des Moldanubikums, der von SUESS (1903) so benannten metamorphen Einheit, deren Namen er durch Zusammenziehen der zwei Flußnamen Moldau und Donau (lat. DANUBIA) bildete. Beide Flüsse stellen den geographischen Rahmen dieser geologischen Einheit dar. Der Vordere Bayerische Wald wird im Osten durch die Landesgrenze gegen Österreich, im Süden durch den Donaurandbruch, im Westen durch die Keilbergstörung, im Nordwesten durch Sedimente der Bodenwöhrer Senke und im Norden durch den Bayerischen Pfahl begrenzt (Abb. 5).

#### 5.1.1 Geographische Aufteilung in vier Regionen

Wegen der Größe des zu bearbeitenden Gebietes (ca. 5000 km<sup>2</sup>) und der Anzahl der räumlich getrennten Intrusiva (25) wird im folgenden von vier Intrusivgebieten des Vorderen Bayerischen Waldes gesprochen.

- Diese sind:
1. Das Intrusivgebiet des Regensburger Waldes
  2. Das Intrusivgebiet von Sattelpeilstein, Lalling, Metten und des "Flasergranites" am Pfahl
  3. Das Intrusivgebiet von Saldenburg-Tittling ("Fürstensteiner Intrusivgebiet")
  4. Das Intrusivgebiet des Passauer Waldes

## DER VORDERE BAYERISCHE WALD

ÜBERSICHTSKARTE



## LEGENDE :

Sedimentbedeckung

Pfahlganz

Gneis

Regensburger Granit (f. Granit, Kristallgranit 1, 2; Granitporphyr

Felsgranit; Regen-Vielteich, Sattelstein

Mettner Granit

Kaussinger Granit

Quarz-Diorite

 Saldenburger Granit, Tittlinger Granit  
Eberhardtrauthe Granit, 2-Glimmer Granit

 Hauzenberger Granit 1, 2  
Granodiorit

Breitenberger Granit

Apophysen

10 Km

5.2

Geologischer Aufbau

In sich ist der Vordere Bayerische Wald in drei Zonen gegliedert:

Der Regensburger Wald im Westen,  
der Passauer Wald im Osten  
und ein mittlerer Teil.

Den größten Teil der kristallinen Masse im Vorderen Bayerischen Wald nehmen Paragneise ein. Diese Gneise werden in zwei unterschiedliche Serien unterteilt: in eine "monotone Serie" und in eine "bunte Serie" (MASKA u. ZOUBEK 1960). Die "monotone Serie" herrscht im Westen und im mittleren Teil des Vorderen Bayerischen Waldes vor. Sie besteht aus einer relativ einheitlichen Folge aus Plagioklas-Biotit- und Cordierit-Sillimanit-Gneisen, in die wenige, geringmächtige, kalksilikatische, quarzitisches und amphibolitische Schichten (Schollen) eingelagert sind.

Innerhalb des Regensburger Waldes wurde von FISCHER (1959) ein zunehmender Metamorphosegrad der stratigraphischen Gesteinsabfolge von Norden nach Süden in der antithetisch rotierten Bruchscholle postuliert.

Durch die hochgradige Metamorphose wurden vor allem im Regensburger Wald die Gneise in Anatexite (Diatexite) umgewandelt.

Die "bunte Serie" trifft man im Passauer Wald an. Sie ist durch eine Wechselfolge von graphitischen Paragneisen, Marmor- und Amphibolitlügen gekennzeichnet.

### 5.3 Die Intrusivgesteine des Vorderen Bayerischen Waldes

Eingelagert in die hochgradigen Metamorphite liegen eine große Anzahl von Intrusivgesteinen. Diese Intrusivgebiete sind teilweise sehr komplex aufgebaut. So lassen sich in den einzelnen Massiven bis zu fünf größere Intrusionsfolgen feststellen. Die Hauptmasse der Magmatite bilden dabei granitische Gesteine. Intermediäre Gesteine (Quarzdiorite, Granodiorite) sind nur untergeordnet am Aufbau des Vorderen Bayerischen Waldes beteiligt. Sie zählen zu den frühen Intrusiva.

#### 5.3.1 Die Intrusivgesteine des Regensburger Waldes

Im Regensburger Wald werden fünf Intrusivgesteinstypen unterschieden. Es sind dies chronologisch nach abnehmendem Alter geordnet:

1. Kristallgranit I 348 ± 11 Ma  
(KÖHLER u. MÜLLER-SOHNIOUS 1981)
2. Quarz- bzw. Granodiorit 335 ± 12 Ma  
(KÖHLER u. MÜLLER-SOHNIOUS 1981)
3. Kristallgranit II 318 ± 7 Ma  
(KÖHLER u. MÜLLER-SOHNIOUS 1981)
4. Klein-, mittelkörniger Granit
5. Granitporphyr ("Regenporphyr")

Geologische Karte des Regensburger Waldes



Legende : 5 km

-  = Diorit
-  = Gneis
-  = Kristallgranit I
-  = Kristallgranit II
-  = Kl.-mittelkörniger Granit
-  = Granitporphyr

Flächenmäßig ist der Kristallgranit I am stärksten am Aufbau des Regensburger Waldes beteiligt. Es handelt sich hier um einen (serial-) porphyrischen Granit mit mittelkörniger Grundmasse. Die Alkalifeldspat-Einsprenglinge erreichen eine Größe bis 10 cm. Daneben führt er untergeordnet Cordierit als Einsprenglinge bis 1,5 cm Größe.

Zwischen dem Kristallgranit I und dem häufig benachbarten "Körnelgneis" sind sowohl fließende Übergänge als auch direkte Intrusivkontakte zu beobachten (PROPACH 1977). Diese Übergänge werden als Indiz für eine magmatische Insitu-Bildung des Granits gedeutet (PROPACH 1977 u. 1978). Entgegengesetzt deuten KÖHLER (1981) und ältere Autoren den Körnelgneis als ein vom Kristallgranit I thermometamorph und metasomatisch übergeprägtes Gestein.

Nach der Bildung des Kristallgranits I kam es zur Intrusion von Quarzdioriten (in älterer Literatur nur als Quarz-Glimmerdiorite bezeichnet) entlang NNE - SSW - gerichteten Fugen. Diese fein- bis feinkörnigen Magmatite treten in Form von Linsen und Gängen auf, wobei sie das Gefüge des Nachbargesteins diskordant abschneiden. Als Einsprenglinge sind Plagioklas (bis 0,8 cm) und Hornblende (bis 0,3 cm) zu erkennen.

Zeitlich wie räumlich folgt den Dioriten der Kristallgranit II, der seinerseits den Diorit diskordant schneidet, ihn durchdringt und dabei teilweise korrodiert. Wie der Kristallgranit I ist der Kristallgranit II ein porphyrisch strukturierter Granit. Die Grundmasse ist aber klein- bis mittelkörnig und die Einsprenglinge, wie Alkalifeldspat und Cordierit, sind kleiner ausgebildet als beim Kristallgranit I.

Auf den Kristallgranit II folgen die klein- bis mittelkörnigen

Granite, die in Form von Stöcken und Gängen im Regensburger Wald auftreten.

Der Abschluß des magmatischen Geschehens in diesem Teilgebiet erfolgte mit dem Eindringen des Granitporphyrs ("Regenporphyr") entlang NS- streichender Gänge.

Im westlichen Regensburger Wald bildet der Granitporphyr das häufigste Ganggestein. Das Gefüge dieses Gesteins reicht von serial- bis hiatalporphyrisch. Häufig ist in diesem Gestein eine (Fließ-) Regelung der Einsprenglinge zu beobachten.

Allgemein kann im Regensburger Wald eine Abnahme am flächenmäßigen Anteil der magmatischen Gesteine mit abnehmendem Alter festgestellt werden.

Bearbeiter der Magmatite des Regensburger Waldes waren in den letzten Jahren an der L.M.-Universität:

PROPACH (1977) Kristallgranit I

OLBRICH (1978) Quarz-Glimmerdiorit

KRAFT (1981) Kristallgranit II

CETIN (1979) klein-, mittelkörnige Granite

RYGOL (1980) Granitporphyr

#### 5.3.1.1

#### Petrographie

#### Der Kristallgranit I (nach PROPACH 1981)

Die Struktur des Kristallgranit I ist serialporphyrisch. Er besteht aus einer mittelkörnigen Grundmasse, in die eingebettet Alkalifeldspäte mit einer maximalen Länge von 11 cm liegen.

Gewöhnlich überschreiten diese jedoch eine Länge von 5 cm nicht. Plagioklase und Cordierite können bis 1,5 cm groß werden.

Der Plagioklas ist hypidiomorph ausgebildet. Die Anorthitgehalte im Kern variieren in den einzelnen Proben zwischen maximal  $An_{47}$  und  $An_{25}$ . Bei über 60% der 52 untersuchten Proben schwankt der Anorthitgehalt der Plagioklase zwischen 25 und 30 Mol-%. Der Aufbau der Plagioklase ist zumeist unkompliziert, mit einem Saum aus Albit. Gelegentlich lassen sich Rekurrenzen beobachten. Basische Plagioklase sind zum Teil deutlich zonar gebaut. Als postmagmatische Umwandlungsprodukte sind Serizit, Albit, seltener Zoisit oder Chlorit zu erkennen.

Die Alkalifeldspäte weisen in der Regel orientierte Einschlüsse von Plagioklas, Biotit, Apatit und Ilmenit auf. Nicht orientiert werden daneben Quarz, Cordierit und Zirkon umschlossen. Randlich treten zum Teil gehäuft Quarzeinschlüsse auf. Während eine Mikroklingitterung unterschiedlich stark, jedoch nie sehr deutlich in Erscheinung tritt, ist die Perthitentmischung in Form von Adern und Filmen ausgeprägt. Postmagmatisch kommt es zu einer Umwandlung von Alkalifeldspat in Muskowit.

Der Biotit, mit ungefähr 10% am Aufbau dieses Gesteines beteiligt, weist häufig zonar eingelagerte Apatite und Zirkone (bis 0,15 mm Durchm.) auf. Letztere sind am Rand in zwei unscharf getrennten Zonen angeordnet. Eine Umwandlung von Biotit in Chlorit ist selten anzutreffen.

Apatit wird bis 0,4 mm groß und ist dabei rundlich, nicht säulig entwickelt.

Der Cordierit wurde in 20 der 52 Proben gefunden. Er erscheint stets umgewandelt in Hellglimmer und hellgrünen Phlogopit/Chlorit.

Kleinere Zwickel, die durch die idiomorphen Plagioklase und Alkalifeldspäte gebildet werden, sind häufig mit Quarz und (radialstrahligem) Chlorit, seltener noch zusätzlich mit Hellglimmer, Mikroklin, Erz oder Epidot gefüllt.

Der Quarz löscht undulös aus, zeigt aber bei stärkerer Deformation eine Felderung, wobei er Plagioklas- und Alkalifeldspat ähnlich einer Fließstruktur umgibt.

#### Der Quarz-Glimmerdiorit und Granodiorit (nach OLBRICH 1978)

Der Name Quarz-Glimmerdiorit, wie er in der speziellen Literatur über den Vorderen Bayerischen Wald immer wieder auftaucht, trifft nur bedingt für diese im Regensburger Wald anzutreffenden intermediären Gesteine zu. Zum größten Teil handelt es sich dabei nach den Modalanalysen um Granodiorite (OLBRICH 1978). Um sie mit den anderen intermediären Gesteinen besser vergleichen zu können, von denen keine Modalanalysen existieren, die aber in den Beschreibungen und geologischen Karten gleichfalls als Quarzdiorite des Vorderen Bayerischen Waldes bezeichnet werden, wird hier und im folgenden, die alte Bezeichnung beibehalten.

Es sind fein- bis feinkörnige, mittel- bis dunkelgraue Gesteine mit hypidiomorph körnigem Gefüge. Der Anteil an Einsprenglingen (Plagioklas max. 8 mm und Hornblende max. 3 mm) ist gering.

Die Plagioklase sind häufig zonar gebaut. Dabei schwanken die Anorthitgehalte der idiomorphen Kerne in den untersuchten Proben zwischen  $An_{85}$  und  $An_{40}$ . Der Anorthitgehalt der hypidiomorphen Säume nimmt bis auf  $An_{20}$  ab. Gelegentlich weisen die Plagioklasen Frakturen auf. An Einschlüssen sind Biotit (orientiert nach (001))

und (010)), Hornblende und in einer Probe (Nr. 20 001) Klinopyroxen zu beobachten.

Der Alkalifeldspat (max. 3 mm) ist selten idiomorph, die Regel sind xenomorphe Umrisse. Perthitentmischungen sind häufig, eine Mikroklingitterung konnte dagegen nicht beobachtet werden. Als Einschlüsse sind Biotite zu erkennen.

Der Biotit kommt in Aggregaten sowie in einzelnen größeren Kristallen vor. Der Pleochroismus reicht von hellgelbbraun ( $n_x$ ) bis dunkelrotbraun ( $n_z$ ). Parallel (001) ist Titanit und Ilmenit in Biotit eingelagert. In allen Proben ist eine leichte Chloritisierung der Biotite festzustellen.

Die Hornblende tritt in Form von Aggregaten einzelner Kristalle bis 0,2 mm Größe auf. Die feldrige Anordnung sowie der feste Umriß weisen auf eine Entstehung aus primären Pyroxen hin.

Ein Klinopyroxen (in Hornblende), der in einer Probe gefunden wurde, war farblos und wies eine Auslöschungsschiefe  $\alpha_c$  auf 010 von  $41^\circ$  auf. Der Apatit erreicht eine Länge von 0,5 mm. Er ist zum einen säulig, mit einem Längen-/Breitenverhältnis von 10/1, zum anderen stengelig mit  $L/B = 50/1$  aufgebaut. Selten ist er im Kern der großen Plagioklase anzutreffen.

Ein häufiges akzessorisches Mineral in den Dioriten ist Orthit. Er ist an Biotit gebunden, zonar gebaut und meist leicht isotropisiert. Der Pleochroismus reicht von gelbbraun ( $n_x$ ) nach rötlichbraun ( $n_y$ ).

Zirkon tritt in zwei Formen auf:

- 1) Teilweise gerundete Kristalle kleiner als 0,1 mm in Biotit.
- 2) Skelettähnliche Aggregate gleichorientierter, länglicher Kristalle, die sich über 5 mm durch verschiedene Wirtsminerale (Quarz, Biotit, Feldspäte) hinziehen.

## Kristallgranit II (nach KRAFT 1981)

Der Kristallgranit II weist ein serialporphyrisches Gefüge auf. In der klein- bis mittelkörnigen Grundmasse findet man vor allem Alkalifeldspat (max. 65 mm), Plagioklas (max. 12 mm) und untergeordnet Cordierit (max. 10 mm) als Einsprenglinge. Diese Minerale bilden zusammen mit Quarz und Biotit das Gros der Grundmasse. Die Einsprenglinge machen in den einzelnen Proben zwischen 5 und 30% des Modalbestandes aus.

Die Plagioklase sind vorwiegend hypidiomorph und generell zonar gebaut. Der An-Gehalt nimmt manchmal kontinuierlich, in anderen Fällen sprunghaft, nach außen ab. Die An-Gehalte in den unterschiedlich stark serizitisierten Kernen variieren in den einzelnen Proben zwischen 26 und 45 Mol-%. Einschlüsse in Plagioklas sind Apatit, Erz, Zirkon, Biotit und Quarz.

Der Alkalifeldspat ist idiomorph bis hypidiomorph ausgebildet. Häufig sind Entmischungen in Form von Mikroperthiten und seltener Fleckenperthiten anzutreffen. Eine Mikroklingitterung ist nicht zu beobachten. Der Alkalifeldspat umschließt Zirkon, Apatit, Cordierit, Erz, Quarz, Biotit (Chlorit) und Muskowit. Kleinere Alkalifeldspäte sind zum Teil vollständig in Helliglimmer umgewandelt.

Der Biotit zeigt einen Pleochroismus von gelbbraun ( $n_w$ ) nach dunkelrotbraun ( $n_z$ ). In den Randbereichen ist er oft in Chlorit und/oder Muskowit umgewandelt. Als häufigste Einschlüsse liegen Zirkon, Apatit und Erz vor.

Muskowit tritt als Umwandlungsprodukt von Biotit und Feldspäten auf.

Cordierit kommt in allen untersuchten Proben vor. Zum größten Teil ist er jedoch in Pinit oder Chlorophyllit umgewandelt.

Quarz bildet im allgemeinen die xenomorphen Zwickelfüllungen. Er umschließt dabei Zirkon, Biotit und Muskowit. Daneben findet man Quarz auch hypidiomorph in Form von kleinen rundlichen bis ovalen Querschnitten.

Die Akzessorien Zirkon und Apatit bilden die wichtigsten Einschlussminerale in Biotit. Stellenweise lassen sich idiomorphe Zirkone beobachten, die von Apatit umschlossen sind. Ein häufig beobachtbares Phänomen sind granophyrische und myrmekitische Quarz-Feldspat Verwachsungen.

#### Klein- bis mittelkörnige Granite (nach CETIN 1979)

Die klein- bis mittelkörnigen Granite sind gelblich bis hellgrau gefärbte, hypidiomorph gleich- bis wechselkörnige Gesteine. In einigen Ausnahmen kann man von einer porphyrischen Struktur sprechen. In einigen Proben ist eine Regelung der Glimmer zu beobachten.

Die Plagioklase liegen zumeist hypidiomorph vor. Der Kern ist unterschiedlich stark, aber immer stärker serizitisiert als der Rand. Sie sind meist einfach zonar gebaut, wobei der maximale An-Gehalt in den einzelnen Proben zwischen 13 und 25 Mol-% schwankt. Der Saum ist in allen Fällen albitisch. Neben größeren Hellglimmern sind des öfteren rundliche Quarzeinschlüsse zu erkennen, welche mitunter zonar eingelagert sind. In einigen Proben umgibt ein Saum aus Alkalifeldspat die Plagioklase.

Alkalifeldspat ist hypidiomorph bis idiomorph ausgebildet. Flecken- und Aderperthite sind häufig, eine Mikroklingitterung hingegen seltener und dabei unterschiedlich stark ausgeprägt, zu

beobachten. In einigen Alkalifeldspäten liegen rundliche Quarzkörner als Einschlüsse vor.

Der Biotit weist denselben Pleochroismus auf wie der des Kristallgranit II (gelbbraun nach dunkelrotbraun). Der Chloritisierungsgrad ist aber höher, wenn auch von Probe zu Probe unterschiedlich. Er reicht bis 90%.

Muskowit liegt sekundär als Umwandlungsprodukt des Plagioklas und des Biotit vor, wurde zum Teil aber auch primär aus dem Magma ausgeschieden.

Der Cordierit ist in den meisten Fällen vollständig umgewandelt. Apatit ist in der Regel an Biotit gebunden. Er erscheint in der Hauptsache kantengerundet.

Neben Apatit findet sich am häufigsten Zirkon in Biotit. Dieser ist im allgemeinen idiomorph. Der Zirkon ist aber nicht ausschließlich an Biotit gebunden. Er ist daneben auch in den Feldspäten zu finden.

Hypidiomorph, selbständig oder verwachsen mit Ilmenit, liegen Körner von Titanit in Biotit.

Akzessorisch findet man in diesen Graniten Sillimanit als kleine Fibrolithsträhnen verwachsen mit Muskowit. Auch eine andere Form dieses Alumosilikates, der Andalusit, kommt in fast jeder Probe vor. Dieser ist stets von Muskowit umgeben. In zwei Fällen wurde auch Granat beobachtet.

#### Granitporphyr (nach RYGOL 1980)

Die Granitporphyre des Regensburger Waldes sind hiatal- bis serialporphyrisch. In der Regel sind sie zu je einer Hälfte einer fein- bis feinkörnigen Grundmasse und Einsprenglingen

zusammensetzt. Etwa 70% der Einsprenglinge fallen dabei auf die Feldspäte. Der Rest setzt sich zusammen aus Quarz, Biotit und ungefähr 1% pinitisiertem Cordierit. In allen Proben ist eine Regelung der Alkalifeldspat- und der Plagioklas-Einsprenglinge angedeutet. Die Grundmasse ist stets vollkristallin und besteht aus Alkalifeldspat, Plagioklas, Quarz, Biotit, Muskowit und Erz. Der Plagioklas ist idiomorph und bis zu einer Größe von 15 mm entwickelt. Im allgemeinen überschreitet er aber eine Größe von 8 mm nicht. Die Plagioklase sind mitunter sehr stark serizitisiert. Der maximale An-Gehalt im Kern schwankt zwischen 25 und 35 Mol-% und nimmt randlich oft sprunghaft, teilweise aber auch kontinuierlich, bis auf 15 Mol-% Anorthit ab. Gelegentlich sind randlich kleine Quarzkörner eingelagert.

Alkalifeldspat bildet die größten Einsprenglinge im Granitporphyr (max. 70 mm). Eine Perthitentmischung liegt häufig vor. Der Mikroklinisierungsgrad ist gering. Teilweise lässt sich gar keine Gitterung feststellen. Alkalifeldspat umschließt Zirkon, Apatit, Quarz, Biotit und Plagioklas, wobei letztere häufig orientiert in die Kornrandbereiche eingelagert sind.

Biotit kann sowohl eigengestaltlich wie auch xenomorph vorliegen. Der Pleochroismus geht von hellrotbraun ( $n_x$ ) nach dunkelrotbraun ( $n_m$ ). In den häufig chloritisierten Biotiten kommt es zur Ausscheidung von Titanit, Ilmenit und Limonit.

Der Quarz tritt in einer häufig korrodierten Hochtemperaturmodifikation auf.

Der Cordierit ist generell pinitisiert.

Akzessorien sind idiomorphe Apatite (max. 0,8 mm) und Zirkone (max. 0,1 mm). Sie sind sowohl in der Grundmasse, als auch in den Einsprenglingen, in der Hauptsache aber an Biotit gebunden, anzutreffen.

In fast allen Proben sind Quarz-Feldspat-Verwachsungen vorhanden. Manchmal sind sie nur in der Grundmasse zu sehen, teilweise bilden sie aber Säume und Feldspateinsprenglinge.

#### 5.3.1.2

#### Geochemie

Für die folgende geochemische Auswertung der Intrusiva des Regensburger Waldes wurde auf schon veröffentlichte Analysen zurückgegriffen. Diese Analysen sind folgenden Arbeiten entnommen:

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Diorit und Granodiorit           | (aus OLBRICH 1978) |
| Kristallgranit I                 | (aus PROPACH 1977) |
| Klein- bis mittelkörniger Granit | (aus CETIN 1979)   |
| Granitporphyr                    | (aus RYGOL 1980)   |

Für den Kristallgranit II wurden die Analysen selbst erstellt.

#### 5.3.1.2.1

#### Beschreibung der Diagramme

In den Variationsdiagrammen der Elemente, angetragen gegen den Differentiationsindex (D.I. aus der C.I.P.W.-Norm nach THORNTON und TUTTLE 1960), wurden die vier basischsten Proben der Diorite (D.I. 47-56) nicht mit in die Diagramme aufgenommen (Abb. 6 a-d), um die Abszisse nicht zu vergrößern und so, folglich formatbedingt, die "Granitfelder" zu stark zusammenzupressen. Die Verlängerung der Umrandung des Feldes schließt aber in jedem Falle die Diorite mit niedrigerem D.I. mit ein (4 Proben).

Im Gegensatz zum Kristallgranit II (D.I. 84-88) sind der Diorit (D.I. 47-69), der Kristallgranit I (D.I. 76-87), der klein- bis mittelkörnige Granit (D.I. 87-95) und der Granitporphyr (D.I. 82-94) in sich stärker differenzierte Magmatite (Abb. 6 a-d).

Die Elemente Magnesium, Zirkonium und Phosphor (Abb. 6 a,b,c) weisen für den Diorit (1 Ausreißer) und den Kristallgranit I eine kontinuierliche Abnahme mit steigendem D.I. und eine vergleichbar negative Steigung auf. Die Felder für die beiden Gesteine liegen dabei durch den Differentiationsindex deutlich voneinander getrennt. Ein ähnliches Verhalten, bei allerdings positiver Steigung, ist im Variationsdiagramm  $Zr/TiO_2$  (Abb. 7b) festzustellen. Im Diagramm Rb/Sr (Abb. 7a) berühren sich beinahe die Felder dieser beiden Magmatite. Beiden Gesteinen sind bei deutlich unterschiedlichen  $(MgO+FeO+P_2O_5)$ -Gehalten (Abb. 9), etwa gleiche und im Bezug auf die anderen Intrusiva, relativ hohe Fluor-Gehalte zu eigen ( $FeO+MgO+P_2O_5$  als Summe wichtiger Oxide der Hauptfluorträger in granitoiden Gesteinen: =Blotit und Apatit).

Der Kristallgranit II, welcher zeitlich nach dem Kristallgranit I intrudierte, ist höher differenziert als der Kristallgranit I. Dies geht zum einen hervor aus dem höheren D.I. den der Kristallgranit II aufweist (Abb. 6 a-d), zum anderen ist ein deutlicher Anstieg der Rb-Gehalte (Abb. 6d) und eine deutliche Abnahme der Sr-Gehalte (Abb. 7a) festzustellen. Eine solche höhere Differentiation ist auch in der Abb. 8a aufgezeigt. Das Feld des Kristallgranit II ist gegenüber dem Feld des Kristallgranit I zu deutlich höheren Rb/K-Verhältnissen hin versetzt.

Sehr deutlich unterscheidet sich der Kristallgranit II von den zuvor beschriebenen Magmatiten hinsichtlich des Verhaltens der

Elemente Fluor, Zirkonium und Titan. In dem Variationsdiagramm  $Zr/TiO_2$  (Abb. 7 b) ergibt sich für das Feld des Kristallgranit II eine stärkere Steigung als für den Kristallgranit I. Während die Zirkoniumgehalte der beiden Kristallgranite sich im Mittel nicht sehr stark unterscheiden (271 ppm im Kristallgranit II gegenüber 298 ppm im Kristallgranit I), streuen diese innerhalb des Kristallgranit II (150-500 ppm) im Gegensatz zum Kristallgranit I sehr deutlich. Auch für Fluor ist eine starke Streuung (Abnahme) innerhalb des Kristallgranits II festzustellen (Abb. 9)

Der klein- bis mittelkörnige Granit ist von allen hier betrachteten Graniten der am höchsten differenzierte Granit. In fast allen Diagrammen schließt er sich direkt an das Feld des Kristallgranit II an und weist auch die oben für letzteren beschriebenen geochemischen Merkmale auf (F,Zr;Ti).

Der Granitporphyr weicht in chemischer Hinsicht vom Verhalten der anderen jungen Granite (Kristallgranit II, klein- bis mittelkörniger Granit) ab. So weisen die deutlich höheren Rb-Gehalte auf eine stärkere Differenzierung des Granitporphyrs hin (Abb. 6d, 7a, 8a). Ein entgegengesetztes Bild ergibt sich in Abb. 8b, in dem er, durch ein im Verhältnis zu den anderen jungen Graniten hohes Sr/Ca-Verhältnis, eine besondere Stellung einnimmt. Auch die Fluor-Gehalte steigen gegenüber dem klein- bis mittelkörnigen Granit wieder an.

Allgemein läßt sich feststellen, daß innerhalb der jüngeren Granite in den Variationsdiagrammen eine Zusammengehörigkeit besteht. Diese wird durch einen ihnen gemeinsamen hohen Differentiationsgrad und durch ihr sympathetisches Verhalten in den Variationsdiagrammen  $Zr/TiO_2$  und  $F/FeO+MgO+P_2O_5$  angezeigt (Abb. 7b u. 9).

Abb.6 a:




Abb.6 b:





Abb.6 a.b: Variationsdiagramme MgO und Zr gegen den D.I.



- = Diorite
- = Kristallgranit I
- = Kristallgranit II
- △ = klein- bis mittelkörniger Granit
- = Granitporphyr




Abb. 6 c, d: Variationsdiagramme  $P_2O_5$  und Rb gegen den D.I.




Abb. 7 a: Variationsdiagramm Rb gegen Sr




Abb. 7 b: Variationsdiagramm Zr gegen  $\text{TiO}_2$





Abb. 8 a : Variationsdiagramm  $Rb/K$  gegen  $K_2O$  und Darstellung der Mittelwerte





Abb. 8 b : Variationsdiagramm Sr/Ca gegen CaO und Darstellung der Mittelwerte





Abb. 9: Variationsdiagramm F gegen  $(MgO + FeO + P_2O_5)$ ; Mg, Fe, P als Kationen der Hauptfluorträger Biotit und Apatit

Die Abb. 10 zeigt die Projektion des "Granit-Systems" von der Qz-Ecke auf die Seite An-Ab-Or bei einem Druck von  $P-H_2O = 5$  kbar. Geringe Drucke verschieben die isobaren Liquidusflächen Plagioklas...+Quarz und Alkalifeldspat...+Quarz (gestrichelt in Abb. 10) in Richtung der Qz-Ecke. Für die Magmatite des Vorderen Bayerischen Waldes sind aber diese Drucke vermutlich zu hoch angesetzt (kaledonische Metamorphose im westlichen Bayerischen Wald bei ungefähr 4 kbar, BLÖMEL 1976). Für den Granitporphyr diskutierte RYGOL (1980) einen Druck von  $P-H_2O = 2$  kbar. Die Drucke, die während der Bildung der zuvor intrudierten Magmatite vorherrschten, dürften darüber gelegen haben. Drucke zwischen 2 und 4 kbar erscheinen mir hierfür realistisch.

Abb. 10:

- = Diorit
- = Kristallgranit I
- = Kristallgranit II
- △ = klein-mittelk. Granit
- = Granitporphyr



Die Projektion des "Granit-Systems" von der Qz-Ecke auf die Seite An-Ab-Or (aus WINKLER und BREITBART 1978).

(gestrichelt = Isothermen der isobaren Liquidusflächen)

In der Abb. 10 liegen die Projektionspunkte (aus der Meso-Norm) für den Diorit und den Kristallgranit I oberhalb der Linie a'-b' im Phasenvolumen des Plagioklas, die Projektionspunkte der jüngeren Granite unterhalb dieser Linie im Phasenvolumen des Quarzes. Sie lägen jedoch im Phasenvolumen des Alkalifeldspates, im Falle einer Projektion der Punkte in das "Granit-System", bei P-H<sub>2</sub>O Drücken zwischen 1 - 2 kbar.


### Diskriminanzanalyse:

In der Diskriminanzanalyse (Abb. 11) sieht man die vollständige Trennung der einzelnen Granite (100%), aber auch den geochemischen Trend, der sich vom Kristallgranit I über den Kristallgranit II zu den klein- bis mittelkörnigen Graniten hin ergibt. Für den Granitporphyr, der in den Variationsdiagrammen durch einen Anstieg im Sr-Gehalt und in den petrographischen Befunden, wegen des Anstiegs des An-Gehaltes in den Plagioklasen, gegen den klein- bis mittelkörnigen Granit, eine gesonderte Stellung einnahm, ergibt sich auch hier eine deutliche Trennung. Er liegt gegen die anderen Granite, zu einer deutlich negativen Diskriminanzfunktion 1 und gegen den zeitlich vorangehenden klein- bis mittelkörnigen Granit, positiven Diskriminanzfunktion 2, versetzt.

Abb. 11 : Übersicht der Diskriminanzanalyse der Granite  
des REGENSBURGER WALD

(Symbole siehe Variationsdiagramme;

★ = Gruppenzentrum)



5.3.2      Die Intrusivgesteine von Sattelpellnstein,  
Lalling, Metten und der Flasergranit am Pfahl

Im Osten schließt sich an den Regensburger Wald der mittelkörnige Granit von Sattelpellnstein an. Entsprechend seiner Nähe zum Pfahl weisen die Glimmer dieses Granits eine deutliche Regelung auf. Kennzeichnend für ihn sind auch Alkalifeldspat-Einsprenglinge bis 10 mm Größe.

Weiter nach Osten erstreckt sich, immer entlang des Pfahls, ein weiterer mittelkörniger Granit, der auf Grund seiner pfahlparallelen Regelung den Namen "Flasergranit" erhielt. Wie auch beim Granit von Sattelpellnstein ist die Regelung in erster Linie durch die Glimmer vorgegeben. Charakteristisch sind wiederum bis 10 mm große Alkalifeldspat-Einsprenglinge.

Gegen Südosten, zum Teil eingebettet in den Flasergranit, liegen kleine N- bis NNW-streichende Linsen und Gänge von Dioriten. Sie erreichen eine Mächtigkeit bis 20 m. Im Streichen können sie bis 200 m aushalten. LIST (1958) trennte die Diorite in Quarzdiorite und Titanit-Fleckendiorite. Als Unterscheidungsmerkmale dienen weißliche bis 5 mm im Querschnitt messende Quarz-Feldspat-Flecken. Bei beiden Varietäten handelt es sich um feinkörnige, schwärzliche Gesteine, wobei schon im Handstück eine deutliche Regelung zu beobachten ist.

Im Süden, nordwestlich und östlich der Stadt Deggendorf, in der Nähe des Donaurandbruchs, schließen sich zwei kleine Intrusivgebiete an.

Der nordwestlich von Deggendorf intrudierte Granit wurde nach der

Ortschaft Metten "Mettener Granit" benannt. Es handelt sich um einen Pluton, der nach SCHREYER (1967), aus mehreren, zeitlich kurz aufeinanderfolgenden Intrusionen aufgebaut ist. SCHREYER (1967) unterscheidet hierbei 5 Faziestypen. In dieser Arbeit ist das gesamte Massiv, der Komplexität halber, als ein Granittyp abgehandelt. Auf der geologischen Karte 1 : 100 000 (Geol. Bavaria Nr. 59) ist der Mettener Granit in zwei voneinander getrennte Massive unterteilt. Bei eigenen Begehungen konnte der westliche Teil dieses Granits, in seinem, auf der Karte eingetragenen, flächenmäßigen Umfang, nicht bestätigt werden. Die Gesamtfläche des Mettener Granits beschränkt sich nach eigenen Beobachtungen auf ca. 20 km<sup>2</sup>.

Östlich der Stadt Deggendorf, um die Ortschaft Lalling, befindet sich ein ebenfalls etwa 20 km<sup>2</sup> großes Granitmassiv, das in der Literatur meist als Kaussinger Granit bezeichnet wird. Dieser Granit ist geringfügig feinkörniger als der Mettener Granit und führt im Gegensatz zu diesem auch keine Einsprenglinge von Alkalifeldspat.

Geologische Bearbeiter dieses Teils des Vorderen Bayerischen Waldes waren unter anderen:

- |                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| LIST und DÖRR     | (1958) Messtischblatt Lalling    |
| SCHREYER          | (1957) Messtischblatt Deggendorf |
| WINTER u. GRAUERT | (1963) Messtischblatt Regen      |

# Geologische Karte

## LEGENDE

-  Sedimentbedeckung
-  Gneis
-  Pfahlquarz
-  Quarz-Diorit
-  Granit v. Sattelpfeilstein
-  Flasergranit
-  Mettener Granit
-  Lallinger Granit

10 Km



## 5.3.2.1

## Petrographie

### Diorite:

Im Dünnschliff weist der Diorit ein typisches Erstarrungsgefüge auf. In einer feinkörnigen Matrix, bestehend aus Feldspäten, Quarzen und Biotit, "schwimmen" einige größere Plagioklase (max. 4 mm) sowie Hornblendaggregate (max. 5 mm). Die Glimmer umfließen dabei die größeren Einsprenglinge.

Die großen Plagioklas-Einsprenglinge sind hypidiomorph ausgebildet. Im Kern beträgt der maximale An-Gehalt 45 Mol-%. In einer der untersuchten Proben konnten Rekurrenzen im Aufbau der Plagioklase festgestellt werden. Dem Kern mit  $An_{45}$  schließt sich ein kleiner Saum  $An_{20}$  an. Anschließend wächst der An-Gehalt wieder auf  $An_{45}$  an, sinkt wiederum auf  $An_{20}$ , steigt dann nochmals auf  $An_{45}$  und geht in dem hypidiomorphen Saum auf  $An_{20}$  zurück. Die Plagioklase sind zum größten Teil nur geringfügig serizitisiert. Als Einschlüsse führen sie Biotit, Hornblende und randlich Quarz. Seltener findet man Titanit und Apatit eingeschlossen in Plagioklas. Die hypidiomorphen bis xenomorphen Plagioklase (bis 2 mm) der Grundmasse, weisen einen maximalen An-Gehalt von 30 Mol-% auf, der in einem breiten Saum auf  $An_{20}$  abnimmt. Die einzige Probe eines Titanit-Fleckendiorits (Probe Nr. 20 284) nimmt dabei eine Sonderstellung ein, weil die großen Plagioklase stärker serizitisiert sind. In den kleinen Plagioklasen nimmt der An-Gehalt randlich bis auf  $An_{15}$  ab.

Alkalifeldspat ist nur hypidiomorph und xenomorph in der feinkörnigen Grundmasse zu finden. Er ist stets gegittert. Mengenmäßig tritt er gegen Plagioklas deutlich zurück.

Die Hornblende kommt immer in Form von Aggregaten kleiner Einzelkristalle vor (Pleochroismus: gelbbraun ( $n_x$ ), braungrün ( $n_y$ ), olivgrün ( $n_z$ )). Diese Aggregate werden als Umwandlungsprodukte primärer Pyroxene gedeutet. Randlich ist die Hornblende häufig von einem Biotitsaum umgeben. Mit dieser Umwandlung ist oft eine Ausscheidung von Titanit zu beobachten. Der Biotit ist rotbraun bis dunkelrotbraun ( $n_x$ ). Der aus der Hornblende hervorgegangene Biotit ist größer ausgebildet, als der der Grundmasse (1 mm / 0.2 mm). Sehr häufig wird eine Ausscheidung von Erz parallel (001) beobachtet.

Neben Erz und Titanit ist Zirkon und Apatit an Biotit gebunden. Der Apatit (kurzprismatisch) wird bis 0,4 mm groß. In der Grundmasse und in den größeren Plagioklasen ist er im Gegensatz zu den Apatiten an Biotit und Hornblende säulig bis stengelig, jedoch deutlich kleiner, ausgebildet.

In fünf der sechs untersuchten Proben konnte Orthit nachgewiesen werden. Häufig ist dieser zonar gebaut. Er liegt an Biotit und seltener an Hornblende, ist hypidiomorph und mitunter mit Epidot verwachsen.

Beim Titanit-Fleckendiorit findet sich, wie der Name schon aussagt, inmitten eines Quarz-Feldspatgemenges hypidiomorpher Titanit.

#### Kaussinger Granit:

Der Kaussinger Granit ist ein klein- bis mittelkörniger Granit. Die Plagioklase erreichen eine Größe von 3,5 mm. Sie sind idiomorph entwickelt. In drei Fällen konnte Rekurrenz nachgewiesen werden. In diesen drei Proben sind bedeutend höhere An-Gehalte zu verzeichnen. Beträgt der An-Gehalt sonst maximal 28 Mol-%, so kommen hier Werte bis An<sub>45</sub> vor.

Z.B.: An<sub>26-45-20</sub>; An<sub>24-20-27-20-22</sub>). Alle Plagioklase sind stark serizitisiert und erscheinen teilweise fleckig.

An Einschlüssen sind Biotit, Apatit und untergeordnet Quarz zu beobachten.

Die kleineren Plagioklase sind durchwegs hypidiomorph. Der

An-Gehalt beträgt  $An_{27}$  im Kern und  $An_{20}$  im Saum. Alkalifeldspat liegt in Form hypidiomorpher Einsprenglinge und in xenomorphen Zwickeln vor. Im Falle der Einsprenglinge umwächst er Biotit, Plagioklas, Quarz und Apatit. Eine Mikroklingitterung ist deutlich, die Perthitentmischung (Flecken) dagegen selten zu erkennen.

Der Biotit ist zumeist rotbraun ( $n_x$ ), kann aber auch dunkelbraun gefärbt sein. Sehr häufig ist er in Chlorit umgewandelt.

Neben Chlorit geht auch Muskowit aus Biotit hervor und ist mit diesem verwachsen.

Im Biotit sind viele, meist kleine Zirkone enthalten. Parallel (001) und randlich an Biotit kommt es zu Erz- und Titanitausscheidungen. Mit Titanit vergesellschaftet findet man auch Epidot. Generell ist dieser aber an Plagioklas und, wie Orthit (max. 0,5 mm zonar), an Biotit gebunden. Apatit (bis 0,3 mm) liegt vorwiegend an und in Biotit. In Plagioklas tritt er ebenfalls kurzprismatisch, jedoch kleiner auf. In der Grundmasse findet man ihn klein, stengelig bis nadelig.

#### Mettener Granit:

Auch die Plagioklase des Mettener Granits zeigen in einer der untersuchten Proben Rekurrenzen. Der höchste An-Gehalt beträgt  $An_{30}$ . Die idiomorphen bis hypidiomorphen Kristalle werden bis 5 mm groß. Häufig ist der Kern stark serizitisiert. Teilweise sind sie fleckig entkalkt. Sie umschließen Biotit und Quarz. Kleinere Plagioklase sind "saurer" im Kern ( $An_{27}$ ) und nehmen zum xenomorphen Saum auf  $An_{17}$  ab.

Als Einsprenglinge liegen Alkalifeldspäte vor, die eine Größe bis 10 mm erreichen. Selten ist dabei eine Idiomorphie zu beobachten. Entmischungen in Form von Aderperthiten sind in den deutlich gegitterten Alkalifeldspäten gut zu sehen. Mitunter sind Säume von Alkalifeldspat um Plagioklas zu beobachten.

Der Biotit ist rotbraun gefärbt. Eine Umwandlung in Chlorit ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Immer geht mit einer derartigen Umwandlung eine Titanitausscheidung einher. Daneben lassen sich noch Rutil und Ilmenit parallel (001) als Entmischungsprodukte erkennen.

Muskowit ist mit Biotit verwachsen und geht zum größten Teil aus diesem hervor. Daneben ist Muskowit auf kleinen, verheilten Störungsbahnen anzutreffen. Unterschiedlich häufig ist Zirkon in den Biotiten der einzelnen Proben enthalten. Größere Apatite sind kurzprismatisch an Biotit gebunden.

In den anderen Mineralen ist er fein nadelig verteilt. Neben Apatit liegt seltener auch Epidot an Biotit. Als Akzessorium kommt Andalusit vor, der stets von einem Saum aus Muskowit umgeben ist.

#### Flasergranit:

Ebenfalls Andalusit führend, ist der Flasergranit südlich des Pfahls. Wie auch im Mettener Granit ist dieser zumeist vollständig in Hellglimmer umgewandelt. In einer Probe konnte ein Andalusitaggregat von 3,5 mm Größe beobachtet werden. Die Plagioklase (max. 5 mm) sind idiomorph bis hypidiomorph. Im Kern beträgt der maximale Anorthitgehalt 27 Mol-%. Gelegentlich sind

in den Plagioklasen Frakturen zu beobachten. Der Saum ist albitisch, wobei die Abnahme des An-Gehaltes vom Kern zum Saum in den meisten Fällen kontinuierlich verläuft. Als Einschlüsse liegen Quarz und Biotit vor.

Die meist hypidiomorphen Alkalifeldspäte können bis 10 mm groß werden. Sie sind generell deutlich gegittert und weisen eine Perthitentmischung in Form von Adern auf. Die kleineren Alkalifeldspäte sind xenomorph in Zwickeln auskristallisiert und zeigen keine Perthitentmischung.

Der Biotit ist rotbraun und häufig in Muskowit, selten in Chlorit umgewandelt. Im Chlorit sind Rutilnadeln zu beobachten.

Titanit und Erz kommen nur untergeordnet vor, wobei letzteres überwiegt.

Der Apatit liegt gedrungen (bis 0,3 mm) an Biotit und nadelig in der Grundmasse. Vereinzelt trifft man ihn in den Plagioklasen an. Ein häufiges akzessorisches Mineral im Flasergranit ist der Cordierit. Er wird bis 7 mm groß, ist aber zumeist vollständig in Hellglimmer und Pennin umgewandelt.

#### Granit von Sattelpellstein:

Ein Unterschied der Plagioklase ließ sich beim Vergleich des Flasergranites mit dem Granit von Sattelpellstein kaum erkennen. Ein wenig ausgeprägter scheint hier nur der Zonarbau zu sein. Auch die Alkalifeldspäte gleichen sich, sowohl in der Größe als auch in der Idiomorphie. Ein Unterschied ist durch den erheblich höheren Zirkongehalt der rotbraunen Biotite angedeutet. Daneben ist bei den chloritisierten Biotiten mehr Erz, Titanit und Rutil


ausgeschieden. Cordierit ist mengemäßig nicht so stark am Aufbau des Gesteins beteiligt. Wie auch im Flasergranit ist im Granit von Sattelpellstein eine Regelung des Gefüges in erster Linie durch die Glimmer angezeigt.

#### 5.3.2.2

#### Geochemie

Im System An-Ab-Or-Qz ( $P-H_2O = 5$  kbar - Abb. 12) ist zu erkennen, daß der Projektionspunkt (aus der Meso-Norm) des Diorites auf der isobaren Liquidusfläche Plagioklas und Quarz liegt (vgl. Regensburger Wald: Diorite im Phasenvolumen des Plagioklas). Die Granite von Lalling und Metten liegen oberhalb der Linie a'-b' (in Abb. 12) im Phasenvolumen des Quarzes (Regensburger Wald: Kristallgranit I im Phasenvolumen des Plagioklas). Unterhalb der Linie a'-b', ebenfalls im Phasenvolumen des Quarzes, liegen der Granit von Sattelpellstein und der Flasergranit. Diese sind im Vergleich zu den jüngeren Graniten des Regensburger Waldes etwas in Richtung der Quarz-Ecke versetzt. Der Unterschied zu diesen ist jedoch nicht gravierend.

Abb. 12:



Die Projektionspunkte der Magmatite in der Projektion des "Granit-Systems" von der Qz-Ecke auf die Fläche An-Ab-Or bei  $P_{H_2O} = 5$  kbar (aus WINKLER und BREITBART, 1978).

In den Variationsdiagrammen (Abb. 13, 14, 15) ist ersichtlich, daß die "Diorite" bezüglich ihrer Elementgehalte recht einheitlich aufgebaut sind (Ausnahme: Zr in Abb. 13e, 14b). Dem entsprechen geringe Differenzen innerhalb des Differentiationsindex, der für die "Diorite" mit maximalen Werten von D.I. = 70 sehr hoch liegt. Für eine hohe Differentiation spricht auch eine Lage des "Dioritfeldes" innerhalb des Kaussinger Granits in den Variationsdiagrammen Rb/Sr und (Abb. 14a, 15a).

Ein deutlicher Bezug der Diorite zu den Graniten ist in den anderen binären Diagrammen nicht zu erkennen.

Eine vergleichbare Spanne hinsichtlich des D.I. überdecken die Granite von Lalling und Metten (D.I. 77-88 bzw. 78-89). In den Diagrammen CaO,  $\text{TiO}_2$ ,  $\text{P}_2\text{O}_5$ , Zr und F gegen den D.I. (Abb. 13 a,c,d,e,f), überdecken sich die Felder der beiden Granite fast vollständig. Dagegen nimmt Magnesium mit steigendem D.I. innerhalb des Mettener Granits stärker ab als im Kaussinger Granit (Abb. 13b). Auffallend sind die hohen Sr-Gehalte (Abb. 13), vor allem im Kaussinger Granit (max. 508 ppm Sr).

Die Granite von Sattelpellstein und der Flasergranit sind im D.I. eng begrenzt (D.I. 82-87 bzw. 85-90). Die Elementgehalte von Ca und Sr schwanken in den einzelnen Proben dieser Granite nur gering (Abb. 13, 15). Das Variationsdiagramm Rb/Sr (Abb. 14a) weist sie in Bezug auf die Granite von Lalling und Metten als höher differenzierte Granite aus. Gleichzeitig ist mit dem Anstieg der Rb-Werte ein Anwachsen der  $\text{K}_2\text{O}$ -Gehalte zu beobachten (Abb. 15a). Auffallend sind in diesen nördlichen Graniten ein Anstieg im  $\text{P}_2\text{O}_5$ -Gehalt bei gleichzeitig höherem Differentiationsgrad und die größere Inhomogenität der (hohen) Zr- und F-Gehalte (Abb. 13d,e,f).

Allgemein unterscheiden sich die "südlichen" Granite (Kaussing und Metten) von den "nördlichen" (Flasergranit und Granit von Sattelpfeilstein) in den Variationsdiagrammen (Abb. 13, 14) durch unterschiedliche Steigungen der "Differentiationsfelder".





Abb. 13 a,b : Variationsdiagramme CaO und MgO gegen den D.I.





Abb. 13 c, d: Variationsdiagramme  $\text{TiO}_2$  und  $\text{P}_2\text{O}_5$  gegen den D.I.





Abb. 13 e, f : Variationsdiagramme Zr und F gegen den D.I.




Abb. 13 g : Variationsdiagramm Sr gegen den D.I.




Abb. 14 a : Variationsdiagramm Rb gegen Sr




Abb. 14 b : Variationsdiagramm Zr gegen  $\text{TiO}_2$




Abb. 15 a : Variationsdiagramm  $\text{Rb}/\text{K} \times 10^2$  gegen  $\text{K}_2\text{O}$  und Darstellung der Mittelwert





Abb. 15 b: Variationsdiagramm  $\text{Sr/Ca} \times 10^2$  gegen  $\text{CaO}$  und Darstellung der Mittelwerte

### 5.3.2.3

### Diskriminanzanalyse

Eine Diskriminanzanalyse, vorgenommen an den vier Graniten, führte nur beim Granit von Sattelpellnstein und beim Mettener Granit zu einer eindeutigen Trennung. Eine Probe des Kaussinger Granites wurde dem Flasergranit zugeordnet, der Flasergranit in einem Falle dem Mettener Granit.

### Gruppenmitgliedschaft

| Granit:       | Kaussinger G. | Mettener G. | Sattelp. G. | Flaserg. |
|---------------|---------------|-------------|-------------|----------|
| Kaussinger G. | 88,9%         | ---         | ---         | 11,1%    |
| Mettener G.   | ---           | 100%        | ---         | ---      |
| Sattelp. G.   | ---           | ---         | 100%        | ---      |
| Flaserg.      | ---           | 6,7%        | ---         | 93,3%    |

### 5.3.3

### Die Intrusivgesteine von Saldenburg und Tittling

Östlich vom Kaussinger Granit, an der Grenze zum Passauer Wald, liegt das Intrusivgebiet von Saldenburg und Tittling, in der Literatur auch allgemein als "Intrusivgebiet um Fürstenstein" bezeichnet. Den geographischen Rahmen des ca. 150 km<sup>2</sup> großen

Massivs bilden die Städte Eging im Westen, Schönberg im Norden, Tittling im Osten und Alcha im Süden.

Aufgebaut wird dieses Massiv von fünf Intrusiva, wobei ältere und jüngere Stock- bzw. Ganggranite nicht berücksichtigt sind.

Nach der Intrusionsfolge sind gegliedert:

1. Fürstensteiner Diorit und "Engelburgit"
2. Tittlinger Granit
3. Eberhardsreuther Granit
4. Zwei- Glimmergranit
5. Saldenburger Granit

Die Intrusionsfolge beginnt mit dem Eindringen eines dioritischen Magmas entlang der Linie Eging - Tittling. Im Osten des Gebietes geht dieser Fürstensteiner Diorit in den sogenannten "Engelburgit" über. Megaskopisch unterscheidet sich dieser vom dunkleren Fürstensteiner Diorit vor allem durch gut sichtbare, teilweise idiomorphe Titanitkristalle, die in einer Feldspatmatrix liegen. Gedeutet wurde dieser Engelburgit als ein vom Tittlinger Granit her überprägter, Fürstensteiner Diorit (TROLL 1964).

Es folgt der Tittlinger Granit, ein dunkler, mittelkörniger Biotitgranit, der geographisch die östliche Grenze des ganzen Massivs bildet. Im Norden schließt sich an diesen, getrennt durch eine "Zunge" des Saldenburger Granits, der Eberhardsreuther Granit an. Von SCHOLZ (1927) wurde der Eberhardsreuther Granit auf Grund seiner makroskopischen Ähnlichkeit, dem Tittlinger Granit als dessen nördlicher Ausläufer zugeordnet. Entgegengesetzt sieht TROLL (1964) in ihm, belegt durch eine mikroskopische Bestandsaufnahme, sowie gefügekundlicher Fakten


(abweichendes Klüftungsverhalten), eher einen direkten Vorläufer des Saldenburger Granits und somit auch diesem zugehörig.

Im Süden des Massivs folgte zeitlich der Zwei- Glimmergranit. Dieser Granit ist in sich sehr inhomogen. Einige Proben aus diesem Gebiet lassen sich megaskopisch mit dem Tittlinger Granit vergleichen, während andere als dem Saldenburger Granit zugehörig angesprochen werden können. Namensgebend für den Zwei- Glimmergranit ist das Auftreten von Muskowit neben Biotit. Schollen von Zwei- Glimmergranit, die im Saldenburger Granit am Hochberg gefunden wurden (TROLL 1964), weisen ihn als dessen Vorläufer aus.

Der Saldenburger Granit stellt flächenmäßig den größten Teil des Intrusivgebietes von Fürstenstein. Er grenzt im Süden an den Diorit und Zwei- Glimmergranit, im Osten an den Tittlinger Granit und im Nordosten an den Eberhardsreuther Granit. Es handelt sich um einen porphyrischen Granit mit Alkalifeldspäten bis maximal 10 cm. Die Grundmasse ist klein- bis mittelkörnig. Einmessungen der Alkalifeldspatregelung (TROLL 1964) ergaben für diesen Granit das Bild eines Granitpfropfens, welcher das Gneisgebirge bei der Intrusion anhub und anschließend stellenweise flach überfloss.

Südlich des Intrusivgebiets von Fürstenstein, am Donaurandbruch bei Vilshofen, schließen sich einige kleine Granitvorkommen an. Diese feinkörnigen Granite wurden der Vollständigkeit halber mitbeprob.

Geologische Karte



5.3.3.1

Petrographie

**Quarz-Glimmerdiorit:**

Der fein- bis kleinkörnige Quarz-Glimmerdiorit weist Hornblende-flecken (bis 6 mm) auf. In einer fein- bis kleinkörnigen Grundmasse aus Quarz, Biotit, hypidiomorphen Plagioklas und

zenomorphen Alkalifeldspat liegen größere, länglich bis tafelige Einsprenglinge von Plagioklas.

Diese Plagioklase sind zumeist zonar gebaut, mit einem großen idiomorphen Kern ( $An_{46-55}$ ), einer ersten Zone  $An_{20}$  und einem hypidiomorphen Saum ( $An_{20-17}$ ). Die hypidiomorphen Plagioklase der Grundmasse weisen eine kontinuierliche Abnahme des An-Gehaltes von  $An_{27}$  auf  $An_{17}$  auf.

Die Hornblendeaggregate sind feldrig aufgebaut und zeigen einen Pleochroismus der einzelnen Kristalle von blaugrün ( $n_x$ ) nach grasgrün ( $n_z$ ).

Häufig sind die Aggregate von einem Saum aus Biotit umgeben. Bei teilweise ausgebleichten Hornblenden ließen sich deutliche Titanitausscheidungen beobachten. Dieser randliche Biotit ist hypidiomorph und zeigt einen Pleochroismus von olivbraun ( $n_x$ ) nach dunkelbraun, seltener auch rotbraun ( $n_z$ ). Die Biotite der Grundmasse sind kleiner ausgebildet (max. 0,5 mm) und deuten eine Fließregelung an. Der Alkalifeldspat tritt als Saum um Plagioklas, oder in Form xenomorpher Zwickel in der Grundmasse auf. Nur in den vom Granit überprägten Dioriten ließen sich hypidiomorphe, größere Alkalifeldspatblasten beobachten.

Stets ist der Alkalifeldspat deutlich gegittert, weist dabei aber nur wenig Perthitentmischungen auf.

Namensgebend für die Diorite ist der Quarz, der Große Anteile der Grundmasse ausmacht.

Der Apatit ist hauptsächlich an Hornblende und noch deutlicher an Biotit gebunden. Er ist immer kurzprismatisch ausgebildet (Länge max. 0,5 mm).

Ebenso wie Zirkon ist Orthit an Biotit gebunden. Teilweise ist letzterer zonar gebaut. In angrenzenden Gerüstsilikaten weisen Sprengrisse auf eine erhöhte Radioaktivität hin.

Ebenfalls zusammen mit Biotit und Hornblende tritt der Titanit auf. Im Kern des Titanits ist dabei des öfteren ein Korn von Ilmenit zu beobachten.

In den Engelburgiten (Titanitfleckendioriten) findet man Titanit auch in einer Matrix bestehend aus Feldspat und Quarz.

#### Tittlinger Granit:

Der Tittlinger Granit ist ein mittelkörniger Biotitgranit. Auffallend sind die deutlich zonar gebauten, dicktafeligen Plagioklase. Sehr häufig weisen diese Rekurrenzen auf. Maximal wurden zwei Zonen von Rekurrenzen beobachtet. Die mittels Auslöschungsschiefe ermittelten An-Gehalte variieren etwa wie folgt: vom Kern zum Saum  $An_{27-30-27-30-27-17}$ . Die kleinen Plagioklase zeigen keine Rekurrenzen. Der An-Gehalt nimmt hier kontinuierlich ab ( $An_{27-17}$ ).

Der Alkalifeldspat, bis 15 mm groß, unwächst Biotit und Plagioklas. Eine Mikroklingitterung ist besonders deutlich in den xenomorphen Zwickeln. Perthit in Form von Adern ist selten. An der Grenze Plagioklas/Alkalifeldspat treten Myrmekitsäume auf.

Der rotbraune ( $n_z$ ) Biotit ist hypidiomorph ausgebildet. Teilweise ist er chloritisiert, womit eine erhöhte Titanitausscheidung verbunden ist.

Zirkon liegt nur wenig, klein, in Biotit.

Hauptsächlich auch an Biotit gebunden ist Apatit. Er wird bis 0,4 mm lang bei einem Längen/Breitenverhältnis von ungefähr 5/1.

In Paragenese mit Epidot (max. 0,5 mm) tritt idiomorpher Orthit (max. 1,5 mm) auf. Teilweise ist letzterer isotropisiert. In den

meisten Fällen ist er an Biotit gebunden. Seltener tritt er in Plagioklas und Alkalifeldspat auf.

#### Eberhardsreuther Granit:

Der Eberhardsreuther Granit unterscheidet sich nur geringfügig vom Tittlinger Granit. Zum ersten ist er kleinkörniger ausgebildet, zum zweiten variiert die Farbe des Biotit von olivbraun bis rotbraun ( $n_x$ ). Manchmal erscheint der Biotit braun-fleckig, wobei eine erhöhte Ilmenit- und Titanitabscheidung zu beobachten ist.

Wie im Tittlinger Granit sind auch im Eberhardsreuther Granit die Plagioklase durch deutliche Rekurrenzen gekennzeichnet. Der Anorthitgehalt solcher Plagioklase unterscheidet sich nicht von dem der Tittlinger Plagioklase. Lediglich die kleineren Plagioklase weisen mit  $An_{25}$  gegen  $An_{27}$  im Tittlinger Granit geringere Gehalte auf.

#### Zweiglimmer-Granit:

Der Zwei-Glimmergranit ist sehr heterogen zusammengesetzt. Die Korngröße variiert in einzelnen Proben zwischen klein- und mittelkörnig. Wie der Name des Granits angibt, sind neben Biotit noch Hellglimmer kennzeichnend für den Zweiglimmer-Granit.

Der Anorthitgehalt, der bis 2 mm großen hypidiomorphen Plagioklase von  $An_{25}$ , nimmt zum Saum  $An_{15}$  kontinuierlich ab. Kleinere Plagioklase sind hypidiomorph bis xenomorph ausgebildet. Der An-Gehalt beträgt konstant  $An_{10}$ .

Der Alkalifeldspat ist deutlich gegittert, wird bis 10 mm groß und ist stellenweise als Saum um Plagioklas zu finden.

Der rot- bis dunkelrotbraune Biotit ( $n_z$ ) führt viel kleinen Zirkon in sich.

Muskowit tritt in zwei Generationen auf, einmal geht er sekundär strahlig aus Biotit hervor, daneben liegt er hypidiomorph bis idiomorph größer an Alkalifeldspat. Apatit kommt kurzprismatisch (bis 0,5 mm) in und an Biotit bzw. Muskowit vor. In Plagioklas und Alkalifeldspat ist er in geringeren Mengen stengelig zu finden.

Erz und Titanit sind nur untergeordnet im Zweiglimmer-Granit enthalten. Vorwiegend werden sie aus chloritisierten Biotiten ausgeschieden.

Epidot sowie Orthit konnten im Zweiglimmer-Granit nicht beobachtet werden.

#### Saldenburger Granit:

Im Saldenburger Granit kommen zwei Arten von Plagioklas vor. Sie werden bis maximal 10 mm groß. Einmal sind sie im Kern stark serizitisiert und tragen Einschlüsse von Biotit, Quarz und untergeordnet auch Alkalifeldspat in sich, die andere Art ist häufig zerbrochen und weist niedrigere An-Gehalte auf. In der porphyrischen Randfazies lassen sich bei den Plagioklasen auch Rekurrenzen feststellen (z.B.:  $An_{23-20-23-10}$ ). In den hypidiomorphen Plagioklasen der Grundmasse nimmt der An-Gehalt kontinuierlich von 20 auf 10 Mol-% Anorthit ab. Der Alkalifeldspat wird bis 100 mm groß. Die Mikroklingitterung ist

deutlich. Ader- und Fleckenperthite sind sehr häufig zu beobachten. Durch zonar eingelagerte Plagioklase, Biotit und randlich auch Quarze wird eine magmatische Entstehung der großen Alkalifeldspäte belegt. Spät ausgeschiedene Alkalifeldspäte sind in den Zwickeln xenomorph ausgebildet. Sie zeigen gegenüber den großen idiomorphen Alkalifeldspäten weniger Perthitentmischung. Die bis 3 mm großen Biotite sind dunkelbraun bis rotbraun ( $n_x$ ). Sie enthalten viele, teilweise große Zirkone (bis 0,3 mm Durchm.), die mitunter zerbrochen sind. Der Biotit ist in den einzelnen Proben unterschiedlich stark chloritisiert. Dabei wird stets wenig Titanit ausgeschieden.

Eine Umwandlung in Helliglimmer konnte nur selten beobachtet werden.

Apatit liegt kurzprismatisch (max. 0,3 mm) an und in Biotit.

Fein nadelig tritt er in der Grundmasse auf. Ein häufiges akzessorisches Mineral im Saldenburger Granit ist Orthit. Idiomorph bis hypidiomorph (max. 3 mm) liegt er an Biotit. Neben Orthit findet man auch hypidiomorphen Epidot an Biotit.

#### 5.3.3.2

#### Geochemie

In den Variationsdiagrammen gegen den Differentiationsindex (D.I.) (Abb. 16 a-g) zeigt sich, daß der "Diorit" in sich sehr stark differenziert ist (D.I. 60-79). Dem Differentiationsverlauf entspricht eine kontinuierliche Abnahme der Elementgehalte CaO, MgO,  $P_2O_5$  und Sr gegen den höheren D.I. und ein entgegengesetzter kontinuierlicher Anstieg der Rb-Gehalte (Abb. 16f). Auffallend hoch sind die  $K_2O$ -Gehalte der am stärksten differenzierten

"Dioritproben" (Abb. 18a). Mit dem Anstieg der  $K_2O$ -Gehalte ist ein noch deutlicherer Zuwachs an Rb verbunden. Im Variationsdiagramm Rb/Sr (Abb. 17a), überdeckt das "Dioritfeld" die "Felder" der älteren Granite (Tittlinger Granit, Eberhardsreuther Granit) vollständig.

Während die Sr/Ca-Verhältnisse im Diorit relativ konstant bleiben (Abb. 18b), steigen diese in den Graniten von Tittling und Eberhardsreuth mit abnehmenden CaO-Gehalten deutlich an. In den Diagrammen gegen den D.I. schließt sich das Feld des Eberhardsreuther Granites (D.I. 81-86) immer an das Feld des Tittlinger Granites (D.I. 75-81) an.

Mit Ausnahme von  $SiO_2$ ,  $K_2O$  und Rb nehmen dabei alle Elementgehalte vom Tittlinger Granit zum Eberhardsreuther Granit ab (Tabelle 2).

Die deutlichste Abtrennung gegen die jüngeren Granite (Zweiglimmer-Granit, Saldenburger Granit) ist durch die für Granite sehr hohen Sr-Gehalte gegeben (Abb. 16g). In Bezug auf den Diorit fallen die teilweise niedrigen  $K_2O$ -Gehalte im Tittlinger und Eberhardsreuther Granit auf (Abb. 18a).

Der Zweiglimmer-Granit (D.I. 81-91) und der Saldenburger Granit (D.I. 83-94) sind in sich stärker differenziert als der Tittlinger und Eberhardsreuther Granit. Die Variationsdiagramme CaO, MgO,  $TiO_2$  und Rb gegen den Differentiationsindex zeigen einen natürlichen Differentiationsverlauf von den älteren zu den jüngeren Graniten. Dabei sind die höchsten  $TiO_2$ - und MgO-Gehalte im Saldenburger und Eberhardsreuther Granit durchaus mit denen des Tittlinger Granits zu vergleichen. Mit wachsendem D.I. gehen diese Gehalte in den jüngeren Graniten aber gegen Null.

Für die  $P_2O_5$ -Gehalte ist vom Eberhardsreuther Granit zum Zweiglimmer-Granit und Saldenburger Granit im Mittel ein Anstieg

Tabelle 2:

Vergleich der Mittelwerte des Chemismus der Intrusiva von Fürstenstein

(in Gew.-%) (+/- = Zunahme/Abnahme im Elementgehalt der jeweils folgenden Intrusion)

| Element                        | Qz-Glimmer-Diorite | Tittlinger Granit | Eberhardsreuther G. | 2-Glimmer-G. | Saldenburger |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|--------------|
| SiO <sub>2</sub>               | 63,49              | 69,59 +           | 71,75 +             | 71,64 -      | 73,54 +      |
| TiO <sub>2</sub>               | 1,07               | 0,49 -            | 0,35 -              | 0,35 0       | 0,28 -       |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 15,26              | 15,09 -           | 14,54 -             | 14,45 -      | 13,96 -      |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 1,03               | 0,31 +            | 0,19 -              | 0,45 +       | 0,19 -       |
| FeO                            | 4,67               | 2,27 -            | 1,82 -              | 1,62 -       | 1,77 +       |
| MnO                            | 0,12               | 0,07 -            | 0,05 -              | 0,05 0       | 0,03 -       |
| MgO                            | 1,87               | 0,81 -            | 0,67 -              | 0,55 -       | 0,33 -       |
| CaO                            | 4,09               | 2,74 -            | 1,90 -              | 1,45 -       | 1,16 -       |
| Na <sub>2</sub> O              | 3,94               | 3,59 -            | 3,40 -              | 3,23 -       | 3,05 -       |
| K <sub>2</sub> O               | 3,89               | 4,02 +            | 4,24 +              | 5,11 +       | 5,15 +       |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | 0,45               | 0,21 -            | 0,15 -              | 0,20 +       | 0,18 -       |
| G.V.                           | 0,82               | 0,59 -            | 0,88 +              | 0,57 -       | 0,72 +       |
| SUMME                          | 100,70             | 99,78             | 99,94               | 99,67        | 100,45       |
| Ba (ppm)                       | 1183               | 1063 -            | 927 -               | 587 -        | 538 -        |
| P                              | 890                | 695 -             | 585 -               | 854 +        | 606 -        |
| Rb                             | 93                 | 123 +             | 151 +               | 219 +        | 175 -        |
| Sr                             | 447                | 455 +             | 339 -               | 126 -        | 137 +        |
| Zr                             | 268                | 199 -             | 170 -               | 170 0        | 209 +        |

zu beobachten (vgl. Granite von Lalling, Metten und Flasergranit, Granit von Sattelpellnstein).

Neben den unterschiedlichen Sr-Gehalten (Abb. 16g) ist eine deutliche Trennung zwischen den älteren und jüngeren Graniten des Intrusivgebietes von Fürstenstein durch einen deutlichen Anstieg der  $K_2O$ -Gehalte im Zweiglimmer-Granit und Saldenburger Granit vorgegeben (Abb. 18a). Die Darstellung zeigt, daß die  $K_2O$ -Gehalte im Mittel vom Eberhardsreuther zum Saldenburger Granit dabei stärker anwachsen als die Rb-Gehalte. Beim Zweiglimmer-Granit liegen zwei der vier Proben zu höheren Rb-Gehalten hin versetzt. Der Anstieg der Zr-Gehalte (Saldenburger Granit - Abb. 16d) gegen die älteren Granite, ist bei den jüngeren Graniten ein gewohntes Bild (vgl. klein- bis mittelkörniger Granit, Granitporphyr in Abschnitt 5.3.1 und Granit von Sattelpellnstein in Abschnitt 5.3.2). Im Granit von Sattelpellnstein ist damit ein Anstieg der F-Gehalte verbunden. Dies läßt sich im Saldenburger Granit aber nicht beobachten (Abb. 19).

Die F-Gehalte bleiben, angetragen gegen  $MgO+FeO+P_2O_5$  (Fe, Mg, P = Elemente der Hauptfluorträger Apatit und Biotit), relativ konstant und nehmen nur in den höher differenzierten Proben des Saldenburger Granites deutlich ab.





Abb. 16 a, b: Variationsdiagramme CaO und MgO gegen den D.I.





Abb. 16 c, d : Variationsdiagramme  $\text{TiO}_2$  und Zr gegen den D.I.




Abb. 16 e : Variationsdiagramm  $P_2O_5$  gegen den D.I.




Abb. 16 f : Variationsdiagramm Rb gegen den D.I.




Abb. 16 g : Variationsdiagramm Sr gegen den D.I.




Abb. 17 a : Variationsdiagramm Rb gegen Sr




Abb. 17 b : Variationsdiagramm Zr gegen  $TiO_2$




Abb. 18 a : Variationsdiagramm  $Rb/K$  ( $\times 10^2$ ) gegen  $K_2O$  und Darstellung der Mittelwerte (kleines Diagramm)




Abb. 18 b : Variationsdiagramm  $\frac{Sr}{Ca} (x 10^2)$  gegen CaO und Darstellung der Mittelwerte (kleines Diagramm)





Abb. 19 : Variationsdiagramm F gegen  $FeO+MgO+P_2O_5$  (Fe, Mg, P = Hauptelemente der Fluorträger Biotit und Apatit)

Für die Granite des Intrusivgebietes von Fürstenstein gilt das gleiche wie für die Granite des Regensburger Waldes: Die Projektionspunkte (aus der Meso-Norm) der älteren Granite (Tittlinger Granit, Eberhardsreuther Granit) liegen im System An-Ab-Or-Qz-H<sub>2</sub>O im Phasenvolumen des Plagioklas, die jüngeren Granite (Zweiglimmer-Granit, Saldenburger Granit) im Phasenvolumen des Alkalifeldspats. Die Lage in Abb. 20 im Phasenvolumen des Quarzes ist bedingt durch den für unseren Fall zu hohen Druck von  $P\text{-H}_2\text{O} = 5 \text{ kbar}$ , der für diese Darstellung gilt.

Abb. 20: Die Lage der Projektionspunkte (aus der Meso-Norm) der Magmatite des Intrusivgebietes von Fürstenstein Im Dreieck An-Ab-Or bei  $P_{\text{H}_2\text{O}} = 5 \text{ kbar}$  (nach WINKLER und BREITBART, 1978)



Da in der Meso-Norm für den Diorit deutlich ein zu niedriger An-Gehalt errechnet wurde (CaO-Gehalt wird in Hornblende eingerechnet), muß hier auf einen direkten Vergleich des Diorits mit den Graniten im "Granit-System" verzichtet werden.

Eine genauere Aussage über den Verwandtschaftsgrad des Tittlinger Granites und des Eberhardsreuther Granites, der sowohl im petrographischen Teil, als auch in den Variationsdiagrammen angedeutet wurde, kann jedoch mittels einer Diskriminanzanalyse gemacht werden. Der Eberhardsreuther Granit wurde von den früheren Bearbeitern dieses Massivs einmal dem Saldenburger Granit, einmal dem Tittlinger Granit zugeordnet.

Eine Diskriminanzanalyse vom Saldenburger und Tittlinger Granit, in die nach den ermittelten Diskriminanzkoeffizienten der Eberhardsreuther Granit eingerechnet ist, ergibt folgendes Ergebnis:


Diskriminanzkoeffizienten:

|                                |       |                               |               |
|--------------------------------|-------|-------------------------------|---------------|
| SiO <sub>2</sub>               | 0,29  | TiO <sub>2</sub>              | 6,78          |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | -0,23 | P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | -11,73        |
| MgO                            | 0,93  | Rb                            | 385           |
| CaO                            | 0,78  | Sr                            | 266           |
| Na <sub>2</sub>                | 1,43  | Zr                            | 227           |
| K <sub>2</sub>                 | -2,05 | F                             | 23            |
|                                |       |                               | Konst. -11,86 |

Die Proben des Tittlinger Granites sind bei diesem Rechenvorgang auf die rechte Seite mit einem Gruppenmaximum von + 9,7 eingerechnet (Abb. 20). Die Proben des Saldenburger Granites liegen deutlich getrennt auf der linken Seite bei einem

Gruppenmaximum von - 5,3. Die nachträglich eingerechneten Eberhardsreuther Analysen liegen zwischen + 4,2 und + 7,5, in einem Fall dabei sogar im Feld des Tittlinger Granits. Eine deutliche chemische Ähnlichkeit dieser beiden Granittypen kann also nachgewiesen werden.

Abb. 21: Die Trennung des Saldenburger und des Tittlinger Granits in der Diskriminanzanalyse und die Lage der eingerechneten Analysen des Eberhardsreuther Granits (Symbole: siehe Variationsdiagramme)



Für die beiden Apophysen von Vilshofen, die der gleichen Prozedur unterzogen wurden, ergeben sich hierbei hohe negative Werte.

Probe 20 231 -9,1

Probe 20 232 -12,7

Auch hier wird die chemische Ähnlichkeit zwischen den Apophysen und dem jüngsten Granit (Saldenburger Granit), die sich in den Variationsdiagrammen schon angedeutet haben, aufgezeigt.

#### 5.3.4 Die Intrusivgesteine des Passauer Waldes.

Nach Osten hin sind die Gneise dieser Region von zahlreichen

Granitapophysen durchsetzt. Daran schließt wieder ein größeres Granitmassiv an, das Intrusivgebiet von Hauzenberg.

Vier Intrusiva bauen das Hauzenberger Massiv auf, nach abnehmendem Alter (DOLLINGER 1961) geordnet sind dies:

1. Quarz- Glimmerdiorit
2. Hauzenberger Granit I
3. Hauzenberger Granit II
4. Granodiorit

Der Quarz- Glimmerdiorit, der etwas nördlich des eigentlichen Hauzenberger Massivs und von diesem durch den Gneis getrennt wird, tritt in Form kleiner Linsen auf und bildet einen etwa 2 km breiten Streifen. CLOOS (1927) hob ihn als "nördliche Dioritzone" besonders hervor.

Die Diorite wurden von DOLLINGER (1961) als prägranitische Intrusionen auskartiert.

Das eigentliche Hauzenberger Massiv kann in drei Intrusionsphasen eingeteilt werden. Der Hauzenberger Granit I bildet dabei das Dach des Massivs und liegt auf dem Hauzenberger Granit II auf. Zu sehen ist dies z.B. in dem alten Steilbruch auf dem Kirchberg (Blatt Waldkirchen), wo Schollen des Hauzenberger Granit I im Hauzenberger Granit II liegen (FISCHER, 1968). Im Gelände lassen sich beide Granite nur schwer voneinander unterscheiden, denn sowohl in der Körnigkeit (mittelkörnig) als auch in der Färbung sind sie einander sehr ähnlich. Als Unterscheidungsmerkmale dienen ein etwas intensiverer Blauton und eine geringfügig größere Körnigkeit des Hauzenberger Granit II.

Zuletzt intrudierte der Granodiorit am östlichen Rand des Massivs im Kontakt des Hauzenberger Granits II zum umhüllenden Gneis. Beschrieben wurde ein Kontakt des dunklen, biotitreichen, ebenfalls mittelkörnigen Granodiorits zum Hauzenberger Granit II im EXL-Bruch am Nordostrand des Massivs von FISCHER (1968). Dieser Kontakt konnte bei eigenen Begehungen nicht mehr beobachtet werden. Die Beschreibung FISCHERS sichert jedoch die oben angeführte Altersbeziehung beider Magmatite.

Direkt an der österreichischen Grenze, um die Ortschaft Breitenberg, liegt das östliche Granitmassiv des Vorderen Bayerischen Waldes. Dieser klein- bis mittelkörnige Granit, im folgenden Breitenberger Granit genannt, gleicht im Handstück fast völlig den Hauzenberger Graniten.

### 5.3.4.1

### Petrographie

#### Quarz- Glimmerdiorit:

Im Dünnschliff zeigt der Quarz- Glimmerdiorit ein hypidiomorph-körniges Gefüge. Die linsigen Biotit-Hornblende-Aggregate und die bis 4 mm großen Plagioklase sind deutlich geregelt. Parallel orientierte Biotite in der Grundmasse unterstreichen die Regelung. Der Mineralbestand setzt sich zusammen aus Plagioklas, Biotit, Hornblende, Quarz und Alkalifeldspat. Als Nebengemengteile sind Apatit, Zirkon, Titanit, Orthit und Erz enthalten.

Die gemeine Hornblende tritt in Aggregaten (bis 5 mm) kleiner, filzig verwachsener, hypidiomorpher Körner auf. Randlich sind die Aggregate von einem Saum aus Biotit umgeben.

Die Hornblendens sind pleochroitisch mit einer blaugrünen Färbung ( $n_{\alpha}$ ). Für ( $n_{\alpha}$ ) erscheinen sie hellgelbgrün.

Der Biotit, der einen großen Anteil am Aufbau des Diorites hat, variiert in der Farbe von blas-olivbraun ( $n_{\alpha}$ ) bis rötlichbraun ( $n_{\alpha}$ ). Eine Umwandlung in Chlorit ist nur selten zu beobachten.

Der Plagioklas kommt in drei Ausbildungen vor:

Zum einen ist er sehr homogen aufgebaut (max.  $An_{50}$ ) mit einem schmalen Saum ( $An_{20}$ ), der verzahnt mit der Grundmasse verwachsen ist. In diesen Plagioklasen fehlen Einschlüsse anderer Minerale.

Die zweite Gruppe der Plagioklase ist kleiner ausgebildet, zonar gebaut und ebenfalls idiomorph entwickelt. Der maximale Anorthitgehalt im Kern beträgt  $An_{45}$ , im lappigen Saum  $An_{20}$ . Der Kern ist häufig fleckig entkalkt und serizitisiert. Neben feinen

Apatitnadeln trägt er nach (001) angelagerte kleine Biotite in sich.

Der kleine hypidiomorphe bis xenomorphe Plagioklas der Grundmasse wächst in Myrnekritwarzen gegen Alkalifeldspat vor.

Den deutlich gegitterten Alkalifeldspat findet man nur in der Matrix als kleine xenomorphe Kristalle.

Der Apatit liegt kurzprismatisch (bis max. 0,5 mm) an Biotit und Hornblende, nadelig in Plagioklas und fein verteilt in den Quarzen und Feldspäten der Grundmasse.

Orthit ist ebenso wie Zirkon an Biotit gebunden. Häufig ist dabei um Orthit ein koaxialer Saum von Epidot zu beobachten. Erz und Titanit findet man im Verbund mit Biotit.

#### Hauzenberger Granit I:

Das Gefüge des Hauzenberger Granit I ist hypidiomorph-wechselkörnig.

Die größeren Plagioklase sind idiomorph und zonar gebaut. Der maximale An-Gehalt liegt bei 25 Mol-% im Kern. Der Saum ist albitisch. Teilweise enthalten sie Einschlüsse von Biotit und Hochquarz (Habitus). Häufig ist der Kern serizitisiert. Die kleineren Plagioklase sind durchwegs hypidiomorph und haben niedrigere An-Gehalte (An<sub>20</sub>). Am Kontakt dieser Plagioklase zum Alkalifeldspat kommt es des öfteren zu einer Myrnekitausbildung. Der Alkalifeldspat weist eine deutliche Gitterung sowie Aderperthite auf. Nur in Großkristallen (bis 30 mm) ist er eigengestaltlich ausgebildet. Diese enthalten stets Einschlüsse von Biotit, Plagioklas und Quarz, wobei erstere gelegentlich

orientiert eingelagert sind.

Der dunkelbraune ( $n_x$ ) Biotit ist nie idiomorph, aber stets kleiner ausgebildet als der ebenfalls primär gebildete Muskowit. Neben primärem ist auch sekundärer Muskowit zu beobachten. Dieser tritt als Umwandlungsprodukt von Andalusit, Biotit und Alkalifeldspat auf.

Andalusit ist ein häufiges Mineral im Hauzenberger Granit I. Randlich ist er immer in Hellglimmer umgewandelt.

Quarz ist, bis auf die wenigen Einschlüsse in Plagioklas, durchwegs xenomorph.

Der Apatit ist nicht sehr häufig und liegt an Biotit in Form von kleinen Körnern.

Neben vielen kleinen Zirkonen sind auch Erz und Titanit an Biotit gebunden. Die für den Hauzenberger Granit typischen Glimmernüsse werden von DOLLINGER (1961) als umgewandelte Cordierite gedeutet.

#### Hauzenberger Granit II:

Wie der Hauzenberger Granit I zeigt der Hauzenberger Granit II ein richtungslos-hypidiomorph-wechselkörniges Gefüge. Zwei Typen von Plagioklasen treten im Hauzenberger Granit II auf:

Die größeren Plagioklase sind zonar gebaut, wobei der Kern stark serizitisiert ist. Sie führen als Einschlüsse Biotit, Zirkon und Apatit in sich. Der maximale An-Gehalt im Kern liegt bei  $An_{30}$  und nimmt am breiten Saum kontinuierlich von  $An_{20}$  auf  $An_{10}$  ab.

Kleinere, hypidiomorphe Plagioklase (max.  $An_{24}$  im Kern) gehen verdrängend gegen Alkalifeldspat vor, was sich im Auftreten von Myrmekitwarzen äußert.

Die Alkalifeldspäte sind durchwegs gegittert, wenn auch nicht in gleich starken Mäße wie im Hauzenberger Granit I. Pertit ist in Form von Adern entmischt. Gewöhnlich sind die Alkalifeldspäte hypidiomorph bis xenomorph ausgebildet, bei den Großkristallen (max. 30 mm) ist jedoch ein deutlicher Hang zur Idiomorphie entwickelt. Als Einschlüsse sind wieder Plagioklas und Biotit (teilweise orientiert angelagert) zu beobachten. Im Vergleich zum Hauzenberger Granit I sind solche Großkristalle seltener.

Im Zentrum des Massives kann der modale Gehalt an Muskowit den des Biotits übertreffen, wohingegen der Biotit am Rand des Massivs deutlich vorherrscht. Der Biotit ist zerlappt und manchmal in Aggregate kleiner Kristalle zusammengefaßt. An ihn gebunden treten Apatit (in Körnern bis 0,3 mm), Zirkon, Titanit und Erz auf. Titanit und Erz sind dabei gelegentlich basisparallel angelagert. Der Muskowit ist in der Regel größer ausgebildet als der Biotit. Oft ist er von Quarz "durchlöchert" und randlich zerlappt. Er geht verdrängend gegen Alkalifeldspat vor.

#### Granodiorit:

Im Gegensatz zu den Graniten ist beim Granodiorit des Hauzenberger Massives eine Fließregelung der Plagioklase und vor allem der Biotite angedeutet. Primärer Muskowit fehlt im Granodiorit. Lediglich Serizit ist in den Kernen der großen Plagioklase zu sehen.

Die Kerne der Plagioklase (max. An<sub>26</sub>) sind stellenweise fleckig entkalkt. Der schmale Saum ist albitisch (An<sub>10</sub>). Kleinere

Plagioklase, nicht so deutlich ausgebildet, enthalten nur 28% Anorthit im Kern. Auch die Myrmekite am Kontakt mit Alkalifeldspat sind wieder zu beobachten.

Während die Mikroklingitterung in den hypidiomorphen Alkalifeldspäten nicht so deutlich ausgeprägt ist wie bei den oben beschriebenen Graniten, sind für sie auffallend viele Aderperthite charakteristisch. Modal sind die Alkalifeldspäte deutlich geringer am Aufbau des Gesteins beteiligt.

Neben kurzsäuligen, bis 0,5 mm langen Apatiten liegen im Verband mit Biotit sehr häufig Titanitkristalle (bis 0,3 mm) vor. Zirkon tritt oft in Biotit auf und erreicht eine Größe von 0,2 mm. Generell ist der Biotit im Granodiorit deutlich idiomorpher und größer ausgebildet als in den Graniten.

#### Breitenberger Granit:

Das Gefüge des Breitenberger Granits ist hypidiomorph- bis xenomorph-kleinkörnig bei einer leichten Regelung der Glimmer.

Der An-Gehalt der hypidiomorphen Plagioklase beträgt maximal 30% Anorthit. Die Plagioklase sind häufig zonar gebaut, mit idiomorphen Kern, einer ersten Zone ( $An_{20}$ ) und einem schmalen albitischen Saum. Die Plagioklase werden bis 4 mm groß.

Die hypidiomorphen Alkalifeldspäte weisen eine ausgeprägte Mikroklingitterung auf. Eine Perthitentmischung fehlt entweder völlig oder ist nur undeutlich in Form von Ader- bzw. Filmperthit zu beobachten.

Der rötlichbraune Biotit ( $n_m$ ) ist stets hypidiomorph und wird bis 2 mm groß. Er führt viel kleinen Zirkon in sich. Oft ist er mit

Muskowit verwachsen. Dieser ist im Habitus dem Biotit sehr ähnlich.

Der Cordierit (bis max. 2,5 mm) ist gänzlich verglimmert. Neben Cordierit ist Andalusit ein häufiges Akzessorium im Breitenberger Granit. Er erreicht eine maximale Größe von 1 mm und ist immer von einem Saum aus Muskowit umgeben.

Untergeordnet findet man Sillimanit in Form kleiner Strähnen in Quarz und Alkalifeldspat.


Der Apatit (bis 0,2 mm) liegt seltener an Biotit als in den anderen besprochenen Graniten. Oft findet man ihn in kleinen Gruppen mit Erz verknüpft. Titanit ist selten anzutreffen.

#### 5.3.4.2

#### Geochemie

Im System An-Ab-Or-Qz-H<sub>2</sub>O liegen der Granodiorit und der Hauzenberger Granit II im Phasenvolumen des Plagioklas, die übrigen Granite im Phasenvolumen des Alkalifeldspates (Abb. 21). Für den Diorit wurde in der Meso-Norm (nach MIELKE und WINKLER 1978) ein negativer An-Gehalt errechnet (CaO in Hornblende), so daß auf eine Darstellung des Diorites in diesem System verzichtet werden muß.

Abb. 21: Die Lage der Projektionspunkte der Magmatite des Passauer Waldes im "Granit-System". Die Abb. zeigt die Projektion der Qz-Ecke auf die Fläche An-Ab-Or bei  $P_{H_2O} = 5$  kbar (nach WINKLER und BREITBART, 1978)



In den Variationsdiagrammen gegen den D.I. (Abb. 22 a-g) fällt auf, daß bei einem D.I. von etwa 77, zwei Granodiorite und ein "Diorit" liegen. Ausschlaggebend für den hohen Differenzierungsindex des Diorites sind in erster Linie die in der Gesteinsanalyse ermittelten hohen  $K_2O$ - und  $Na_2O$ -Gehalte, die einen großen normativen Albit und Orthoklasanteil bewirken. Die hohen Rb- und niedrigen Sr-Gehalte (Abb. 23a) weisen ebenfalls auf eine starke Differentiation (Überprägung analog den Fürstensteiner Dioriten ?) des Diorites hin.

In den Variationsdiagrammen  $\text{CaO/D.I.}$  und  $\text{Sr/D.I.}$  (Abb. 22 a, g) sind die Hauzenberger Magmatite deutlich voneinander getrennt. Dabei ist eine lineare Verbindung der drei Probefelder vorgegeben. Die  $\text{P}_{205}$ -Gehalte sind dabei in allen drei Intrusiva in etwa konstant (Abb. 22c). In den Diagrammen  $\text{MgO/D.I.}$ ,  $\text{TiO}_2/\text{D.I.}$  und  $\text{Zr/D.I.}$  (Abb. 22 b, d, e) ist zwar ein Anstieg dieser Elementgehalte vom Hauzenberger Granit I zum Hauzenberger Granit II zu beobachten, doch weisen die Granodioritproben dem Hauzenberger Granit II vergleichbare Elementgehalte auf, d.h. deren Chemismus ist im Bezug auf diese Elemente vergleichbar. Im Diagramm  $\text{Zr/TiO}_2$  (Abb. 23b) bewirkt dies, daß das Feld des Granodiorites im Feld des Hauzenberger Granit II liegt, wobei die Felder der drei Gesteine die gleiche Steigung aufweisen. Auch in den Diagrammen  $\text{Rb/Sr}$  (Abb. 23a),  $\text{Rb/K}$  gegen  $\text{K}_2\text{O}$  und  $\text{Sr/Ca}$  gegen  $\text{CaO}$  (Abb. 24 a, b) ist ein linearer Zusammenhang der drei Hauzenberger Magmatite gegeben.

Die geochemischen Verhältnisse im sich östlich anschließenden Breitenberger Granit, sind in allen Variationsdiagrammen direkt vergleichbar mit jenen der Hauzenberger Granite. Der Breitenberger Granit ist geringfügig höher differenziert, was sich durch niedrigere  $\text{Sr-}$ ,  $\text{MgO}$ ,  $\text{TiO}_2$ - und höhere  $\text{K}_2\text{O-}$ ,  $\text{Rb-}$ Gehalte äußert (Abb. 22 b, d und 24 a, b). Das Feld des Breitenberger Granites überlappt in allen Diagrammen die Felder der Hauzenberger Granite I und II. Dabei ist ersichtlich, daß sechs der insgesamt 17 untersuchten Proben geochemisch dem Hauzenberger Granit II, die restlichen 11 Proben dem Hauzenberger Granit I zugeordnet werden können.

Die Apophysen um das Hauzenberger Massiv sind geochemisch mit den Graniten dieses Massivs zu vergleichen. Dabei fällt auf, daß sie gegenüber diesen Graniten  $\text{Zr-}$  und  $\text{K}_2\text{O-reicher}$ , aber  $\text{Rb-ärmer}$  sind (Abb. 23b, 24a).




Abb. 22 a : Variationsdiagramm CaO gegen den D.I.




Abb. 22 b : Variationsdiagramm MgO gegen den D.I.




Abb. 22 c : Variationsdiagramm  $P_2O_5$  gegen den D.I.




Abb. 22 d : Variationsdiagramm  $TiO_2$  gegen den D.I.

Abb. 22 e :  $\frac{Zr}{D.I.}$




Abb. 22 f :  $\frac{Rb}{D.I.}$




Abb. 22 e,f: Variationsdiagramme Zr und Rb gegen den D.I.




Abb. 22 g : Variationsdiagramm Sr gegen den D.I.




Abb. 23 a : Variationsdiagramm Rb gegen Sr und Darstellung der Mittelwerte




Abb. 23 b : Variationsdiagramm Zr gegen TiO<sub>2</sub>




Abb. 24 a : Variationsdiagramm Rb/K  $\times 10^2$  gegen K<sub>2</sub>O und Darstellung der Mittelwerte





Abb. 24 b : Variationsdiagramm Sr/Ca  $\times 10^2$  gegen CaO und Darstellung der Mittelwerte

Um Übereinstimmungen oder Trennungen, die sich in den binären Korrelationsdiagrammen ergeben, anhand mehrerer Elemente gleichzeitig darzustellen, wurde eine Diskriminanzanalyse der Magmatite von Hauzenberg erstellt (Abb. 25). In dieser Diskriminanzanalyse wird, mittels der bei dieser Analyse bestimmten elementspezifischen Faktorwerten, der Granit von Breitenberg eingerechnet.

Die Trennung der Hauzenberger Magmatite in der Diskriminanzanalyse ist 100%-ig. Die Einrechnung des Breitenberger Granits ergab wie in den binären Korrelationsdiagrammen eine Zuordnung von 6 Proben zum Hauzenberger Granit II. Die restlichen 11 Proben werden auch hier dem Hauzenberger Granit I zugeteilt. Ganz zu negativen Werten in der Diskriminanzfunktion 1 versetzt, liegen die drei Proben des Granodiorites.

Generell weist die Diskriminanzfunktion 2 in Abb. 25 einen kontinuierlichen Trend der Magmatite auf, der einer Zunahme des Differentiationsindex der einzelnen Magmatite zu negativen Werten entspricht. Die Diskriminanzfunktion 1 ergibt in erster Linie die in den Variationsdiagrammen beobachteten Unterschiede der Elementgehalte CaO und Sr wieder (Granodiorit zu negativen Werten versetzt).

Abb. 25 :



### 5.3.5 Der Vergleich der vier geographisch getrennten Intrusivgebiete anhand von Analysenmittelwerten

Die Granite lassen sich dabei in ältere und jüngere Granite einteilen. Die Zuordnung der Granite beruht auf:

- 1) Radiometrische Altersbestimmung
- 2) Geländebefunden
- 3) Petrographische Vergleiche und ähnlicher Chemismus der Granite

Dieser letzte Aspekt gilt insbesondere für noch nicht datierte Magmatite, die nicht im Kontakt zu anderen, schon datierten Intrusiva stehen und folglich keinen Bezug aus Geländebeobachtungen zulassen. Im Vorderen Bayerischen Wald trifft das für die Granite von Lalling und Metten, wie auch für den Flasergranit und den Granit von Sattelpeilnstein zu.

Die Verwandtschaft bezüglich der Plagioklase (Basizität, Rekurrenzen) sowie der basischere Gesteinscharakter (vergleichbar hohe Sr-Gehalte bei niedrigen Rb-Gehalten, fast identische, von den anderen Graniten deutlich getrennt, niedrigere  $K_2O$ -Gehalte), weisen auf eine chemische Verwandtschaft der Granite von Lalling, Tittling, Metten und Eberhardsreuth hin, die in dieser Arbeit auch als eine altersmäßige Verwandtschaft gedeutet wird.

Die Lage der Projektionspunkte des Flasergranites und des Granits von Sattelpeilnstein im Phasenvolumen des Alkalifeldspates und die hohen  $K_2O$ -, Rb-Gehalte in diesen Magmatiten, entsprechen den Befunden der als jünger eingestuften Granite, so daß auch eine gleiche Alterszuordnung wahrscheinlich ist.

Mittlere chemische Zusammensetzung der Varistischen Magmatite des Vorderen Bayerischen Waldes

1) Regensburg-Wald

- 106 -

|                                | Diorit Regensburger<br>Wald | Kristallgranit I | Kristallgranit II | Klein-,Mittelkörniger<br>Granit | Granitporphyr |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| (Gew.-%)                       | n = 16                      | n = 14           | n = 10            | n = 19                          | n = 16        |
| SiO <sub>2</sub>               | 58,97                       | 68,00            | 71,31             | 73,96                           | 73,02         |
| TiO <sub>2</sub>               | 1,47                        | 0,64             | 0,36              | 0,19                            | 0,23          |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 16,26                       | 15,06            | 14,55             | 14,27                           | 14,68         |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0,48                        | 0,59             | 0,56              | 0,40                            | 0,82          |
| FeO                            | 6,27                        | 2,90             | 1,75              | 0,94                            | 1,02          |
| MnO                            | 0,12                        | 0,04             | 0,01              | 0,02                            | 0,02          |
| MgO                            | 2,88                        | 1,11             | 0,59              | 0,52                            | 0,52          |
| CaO                            | 4,70                        | 2,00             | 1,34              | 0,62                            | 0,81          |
| Na <sub>2</sub> O              | 3,00                        | 3,00             | 3,22              | 3,30                            | 2,67          |
| K <sub>2</sub> O               | 3,82                        | 5,03             | 4,90              | 5,11                            | 5,28          |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | 0,93                        | 0,31             | 0,26              | 0,19                            | 0,10          |
| G. V.                          | ---                         | ---              | 0,90              | 0,77                            | 1,29          |
| Summe                          | 98,90                       | 98,68            | 99,75             | 100,29                          | 100,44        |

-106-

| (ppm) |      |      |      |     |      |
|-------|------|------|------|-----|------|
| Ba    | 1093 | 887  | 722  | 267 | 408  |
| F     | 1402 | 1414 | 1191 | 574 | 1086 |
| Rb    | 149  | 222  | 248  | 225 | 347  |
| Sr    | 455  | 181  | 112  | 59  | 110  |
| Zr    | 461  | 298  | 271  | 91  | 184  |
| D.I.  | 52   | 76,5 | 84,5 | 90  | 87,5 |

Mittlere chemische Zusammensetzung der Varistischen Magmatite des Vorderen Bayerischen Waldes

2) Die Intrusiva von Lalling, Metten, Sattelpeilstein und der Flasergranit

| (Gew.-%)                       | Gangdiorit:Lalling,<br>Regen |        | Kaussinger Granit |        | Mettener Granit |       | Granit von Sattel-<br>peilstein |        | Flasergranit |        |
|--------------------------------|------------------------------|--------|-------------------|--------|-----------------|-------|---------------------------------|--------|--------------|--------|
|                                | n = 5                        | n = 9  | n = 9             | n = 9  | n = 9           | n = 9 | n = 9                           | n = 14 | n = 14       | n = 14 |
| SiO <sub>2</sub>               | 63,52                        | 71,58  | 71,74             | 71,68  | 72,97           |       |                                 |        |              |        |
| TiO <sub>2</sub>               | 1,37                         | 0,37   | 0,36              | 0,39   | 0,25            |       |                                 |        |              |        |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 15,91                        | 14,98  | 15,04             | 14,74  | 14,53           |       |                                 |        |              |        |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 1,36                         | 0,40   | 0,34              | 0,34   | 0,19            |       |                                 |        |              |        |
| FeO                            | 5,32                         | 1,77   | 1,72              | 1,96   | 1,57            |       |                                 |        |              |        |
| MnO                            | 0,09                         | 0,05   | 0,03              | 0,03   | 0,01            |       |                                 |        |              |        |
| MgO                            | 2,31                         | 0,90   | 0,68              | 0,83   | 0,62            |       |                                 |        |              |        |
| CaO                            | 3,36                         | 1,98   | 1,80              | 1,19   | 1,02            |       |                                 |        |              |        |
| Na <sub>2</sub> O              | 3,36                         | 2,95   | 3,06              | 2,75   | 2,71            |       |                                 |        |              |        |
| K <sub>2</sub> O               | 3,91                         | 4,29   | 4,33              | 5,25   | 5,34            |       |                                 |        |              |        |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | 0,58                         | 0,16   | 0,18              | 0,20   | 0,22            |       |                                 |        |              |        |
| G.V.                           | 0,53                         | 0,61   | 0,61              | 0,96   | 0,99            |       |                                 |        |              |        |
| Summe                          | 101,30                       | 100,04 | 99,89             | 100,39 | 100,42          |       |                                 |        |              |        |

| (ppm) |  | Ba   |     | F   |      | Rb   |  | Sr |  | Zr |  | D.I. |  |
|-------|--|------|-----|-----|------|------|--|----|--|----|--|------|--|
|       |  |      |     |     |      |      |  |    |  |    |  |      |  |
|       |  | 1211 | 776 | 692 | 527  | 385  |  |    |  |    |  |      |  |
|       |  | 1352 | 583 | 753 | 1029 | 883  |  |    |  |    |  |      |  |
|       |  | 134  | 126 | 177 | 234  | 256  |  |    |  |    |  |      |  |
|       |  | 288  | 334 | 189 | 107  | 83   |  |    |  |    |  |      |  |
|       |  | 582  | 246 | 191 | 342  | 164  |  |    |  |    |  |      |  |
|       |  | 61,5 | 80  | 82  | 83,5 | 86,5 |  |    |  |    |  |      |  |

Mittlere chemische Zusammensetzung der Varistischen Magmatite des Vorderen Bayerischen Waldes

3) Das Intrusivgebiet von Fürstenstein

| (Gew.-%)                       | Fürstensteiner |        | Tittlinger |        | Eberhardsreuther |       | Zwei-Glimmer- |       | Saldenburger |        | Apophysen |       |
|--------------------------------|----------------|--------|------------|--------|------------------|-------|---------------|-------|--------------|--------|-----------|-------|
|                                | Diorit         | n = 12 | Granit     | n = 11 | Granit           | n = 3 | granit        | n = 4 | Granit       | n = 20 | Vilshofen | n = 2 |
| SiO <sub>2</sub>               | 63,49          |        | 69,59      |        | 71,75            |       | 71,64         |       | 73,54        |        | 72,03     |       |
| TiO <sub>2</sub>               | 1,07           |        | 0,49       |        | 0,35             |       | 0,35          |       | 0,28         |        | 0,38      |       |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 15,26          |        | 15,09      |        | 14,54            |       | 14,45         |       | 13,96        |        | 14,38     |       |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 1,03           |        | 0,31       |        | 0,19             |       | 0,45          |       | 0,28         |        | 0,96      |       |
| FeO                            | 4,67           |        | 2,27       |        | 1,82             |       | 1,62          |       | 1,77         |        | 1,15      |       |
| MnO                            | 0,12           |        | 0,07       |        | 0,05             |       | 0,05          |       | 0,03         |        | 0,04      |       |
| MgO                            | 1,87           |        | 0,81       |        | 0,67             |       | 0,55          |       | 0,33         |        | 0,42      |       |
| CaO                            | 4,09           |        | 2,74       |        | 1,90             |       | 1,45          |       | 1,16         |        | 1,27      |       |
| Na <sub>2</sub> O              | 3,94           |        | 3,59       |        | 3,40             |       | 3,23          |       | 3,05         |        | 3,15      |       |
| K <sub>2</sub> O               | 3,89           |        | 4,02       |        | 4,24             |       | 5,11          |       | 5,15         |        | 5,42      |       |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | 0,45           |        | 0,21       |        | 0,15             |       | 0,20          |       | 0,18         |        | 0,25      |       |
| G.V.                           | 0,82           |        | 0,59       |        | 0,88             |       | 0,57          |       | 0,72         |        | 0,76      |       |
| Summe                          | 100,70         |        | 99,78      |        | 99,94            |       | 99,67         |       | 100,45       |        | 100,21    |       |
| (ppm)                          |                |        |            |        |                  |       |               |       |              |        |           |       |
| Ba                             | 1183           |        | 1063       |        | 927              |       | 587           |       | 538          |        | 680       |       |
| F                              | 890            |        | 695        |        | 585              |       | 587           |       | 538          |        | 692       |       |
| Rb                             | 93             |        | 123        |        | 151              |       | 219           |       | 175          |        | 208       |       |
| Sr                             | 447            |        | 455        |        | 339              |       | 126           |       | 137          |        | 168       |       |
| Zr                             | 268            |        | 199        |        | 170              |       | 270           |       | 209          |        | 389       |       |
| D.l.                           | 67             |        | 77         |        | 82,5             |       | 85            |       | 87           |        | 87,5      |       |

Mittlere chemische Zusammensetzung der Varistischen, Magmatite des Vorderen Bayerischen Waldes

4) Passauer\_Wald

|                                | Hauzenberger | Hauzenberger | Hauzenberger | Hauzenberger | Hauzenberger | Breitenberger | Apophysen  |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
|                                | Diorit       | Granit I     | Granit II    | Granodiorit  | Granit       | Hauzenberg    | Hauzenberg |
| (Gew.-%)                       | n = 1        | n = 22       | n = 18       | n = 3        | n = 17       | n = 11        |            |
| SiO <sub>2</sub>               | 63,11        | 72,28        | 70,01        | 67,13        | 72,29        | 72,37         |            |
| TiO <sub>2</sub>               | 1,30         | 0,24         | 0,51         | 0,53         | 0,22         | 0,38          |            |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 14,15        | 14,55        | 14,83        | 16,78        | 14,57        | 14,20         |            |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 1,20         | 0,20         | 0,43         | 0,35         | 0,36         | 0,38          |            |
| FeO                            | 4,19         | 1,23         | 1,93         | 2,03         | 1,33         | 1,24          |            |
| MnO                            | 0,14         | 0,04         | 0,06         | 0,06         | 0,03         | 0,03          |            |
| MgO                            | 2,08         | 0,48         | 0,87         | 1,00         | 0,42         | 0,57          |            |
| CaO                            | 2,88         | 0,95         | 1,83         | 3,22         | 1,16         | 1,24          |            |
| Na <sub>2</sub> O              | 4,51         | 3,00         | 3,17         | 4,50         | 3,23         | 2,77          |            |
| K <sub>2</sub> O               | 4,50         | 5,36         | 5,00         | 3,34         | 5,51         | 5,87          |            |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | 0,58         | 0,24         | 0,22         | 0,18         | 0,18         | 0,15          |            |
| G.V.                           | 0,81         | 0,64         | 0,71         | 0,59         | 0,65         | 0,66          |            |
| Summe                          | 99,45        | 99,38        | 99,66        | 99,71        | 99,95        | 100,35        |            |
| (ppm)                          |              |              |              |              |              |               |            |
| Ba                             | 1778         | 938          | 1285         | 1364         | 779          | 794           |            |
| F                              | 1467         | 906          | 1024         | 1074         | 782          | 814           |            |
| Rb                             | 158          | 264          | 238          | 86           | 279          | 222           |            |
| Sr                             | 229          | 119          | 288          | 791          | 134          | 145           |            |
| Zr                             | 423          | 234          | 313          | 352          | 240          | 395           |            |
| D.I.                           | 76           | 88           | 81           | 74,5         | 86           | 87,5          |            |


### 5.3.5.1

### Beschreibung der Diagramme

Die Ausnahme des Passauer Waldes (Zunahme der Basizität der Intrusiva mit abnehmendem Gesteinsalter) bewirkt in den Variationsdiagrammen, daß die Magmatite des Passauer Waldes, nicht oder nur zum Teil in die Feldereinteilung der jüngeren und älteren Granite eingegliedert werden können.

Im Granitsystem liegen, wie in den vorangegangenen Kapiteln gezeigt wurde, die Projektionspunkte der älteren Granite im Phasenvolumen des Plagioklas, die der jüngeren Granite, in dem des Alkalifeldspates (Ausnahme: Passauer Wald, Abb. 26).

Abb. 26 : Die Lage der Projektionspunkte der Magmatite des  
Vorderen Bayerischen Waldes im System An-Ab-Or-Qz-  
H<sub>2</sub>O bei einem Druck von P<sub>H<sub>2</sub>O</sub> = 5 kbar



In den Variationsdiagrammen gegen den D.I. (Abb. 27 a-e) kommt es zu einer deutlichen Aufteilung in drei Probenfelder. Diese repräsentieren, nach zunehmendem D.I. geordnet, die Diorite, die älteren und schließlich die jüngeren Granite. Während von den Dioriten zu den Graniten eine starke (nicht kontinuierliche) Abnahme der Elementgehalte  $MgO$ ,  $TiO_2$  und  $P_2O_5$  (Abb. 27 b, d, e) zu beobachten ist, unterscheiden sich die älteren von den jüngeren Graniten hinsichtlich dieser Elementgehalte nicht sehr deutlich. Anders ist dies bei den  $CaO$ -Gehalten. Hier weisen die älteren Granite deutlich höhere Gehalte auf (Abb. 27a). Allgemein ergibt sich in den Diagrammen  $CaO$  und  $K_2O$  gegen den D.I., eine lineare Verbindung zwischen den drei Probenfeldern.

Im Variationsdiagramm  $Zr/TiO_2$  (Abb. 28) haben die Felder beider Granitgenerationen deutlich unterschiedliche Steigungen, was durch die höheren  $TiO_2$ -Gehalte in den älteren Graniten bedingt ist. Durch diese  $TiO_2$ -Gehalte ergibt sich für die älteren Granite in Abb. 28 ein Trend zu den Dioriten.

Dieser Trend bestätigt sich deutlich in den Variationsdiagrammen  $Rb/Sr$  und (Abb. 29a, b) in denen sich die Felder der Diorite und der älteren Granite überlappen. Die jüngeren Granite sind von den älteren durch höhere  $Rb$ - und niedrigere  $Sr$ -Gehalte getrennt. Bei der Normierung von  $Rb$  und  $Sr$  gegen  $Ba$  kommt es zu einer Separation der drei Felder, wofür in erster Linie die anwachsenden  $Rb/Ba$ -Verhältnisse, von den Dioriten über die älteren zu den jüngeren Graniten den Ausschlag geben (Abb. 29c).

Aus dem Variationsdiagramm  $F$  gegen  $FeO+MgO+P_2O_5$  (Abb. 30) ist zu ersehen, daß mit Ausnahme des Kristallgranit I die  $F$ -Gehalte in den älteren Graniten im Mittel niedriger sind als in den jüngeren Graniten.




Abb. 27 a : Variationsdiagramm CaO gegen den D.I.




Abb. 27 b : Variationsdiagramm MgO gegen den D.I.




Abb. 27 c : Variationsdiagramm  $K_2O$  gegen den D.I.




Abb. 27 d : Variationsdiagramm  $TiO_2$  gegen den D.I.




Abb. 27 e : Variationsdiagramm  $P_2O_5$  gegen den D.I.




Abb. 28 : Variationsdiagramm Zr gegen  $TiO_2$




Abb. 29 a : Variationsdiagramm Rb gegen Sr




Abb. 29 b : Variationsdiagramm Rb/Sr gegen Sr





Abb. 29 c : Variationsdiagramm Rb/Ba gegen Sr/Ba

Abb. 30 : Variationsdiagramm F gegen  $\text{MgO}+\text{FeO}+\text{P}_2\text{O}_5$



6

DISKUSSION

Neben den hohen  $\text{TiO}_2$ -Gehalten sprechen auch die teilweise enorm hohen  $\text{P}_2\text{O}_5$ -Gehalte (bis max. 1,13 Gew.%  $\text{P}_2\text{O}_5$ ) für eine Herkunft der Diorite aus Derivaten des oberen Mantels "low degree of partial mantle melting" (HUCKENHOLZ, mündliche Mitteilung).

Wie in den Variationsdiagrammen aufgezeigt wurde, sind die Diorite stark in sich differenziert (D.I. 47-76!). Im Mittel nimmt hierbei der D.I. von Westen nach Osten zu (Tabelle 3).

Tabelle 3: Elementgehalte und der D.I. der Diorite im  
Trend von W nach E

| Element                   | Diorit<br>Regensburger<br>Wald | Diorit<br>Lalling<br>Metten | Diorit<br>Fürstenstein | Diorit<br>Hauzenberg |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| D.I.                      | 52                             | 62                          | 67                     | 76                   |
| $\text{TiO}_2$            | 1,47                           | 1,37                        | 1,07                   | 1,30                 |
| $\text{Fe}_{\text{ges.}}$ | 7,45                           | 7,27                        | 6,21                   | 5,86                 |
| $\text{MgO}$              | 2,88                           | 2,31                        | 1,87                   | 2,08                 |
| $\text{P}_2\text{O}_5$    | 0,93                           | 0,58                        | 0,45                   | 0,58                 |

Entgegengesetzt nehmen die Gehalte an Ti, Fe, Mg und P ab, wobei mit Ausnahme von  $\text{Fe}_{\text{ges.}}$  vom Fürstensteiner Diorit zum Hauzenberger Diorit wieder eine Zunahme festzustellen ist. Dies ist eine Beobachtung, die sich mit den für dieses östliche Gebiet des Vorderen Bayerischen Waldes anders gelagerten Intrusionsverhältnissen deckt.

Drei Faktoren können eine große Spanne im Differentiationsindex bewirken. Es sind dies eine "normale" Differentiation eines Magmas, basierend auf der Mineralausscheidungsfolge bei Abkühlung und "Platznahme" einer Intrusion. Daneben kann eine Kontamination mit saurem Material während der Intrusion erfolgen. Ein Vorgang, der von FOURCADE und ALLEGRE (1981), für die Entwicklungsgeschichte der basischen Gesteinsserie in den Pyrenäen beschrieben wurde. Und schließlich, kann eine postmagmatische Überprägung, wie es TROLL (1968) bei den Fürstenberger Dioriten beschrieb, erfolgen, die zur Bildung von Alkalifeldspatblästen führt.

Für den Vorderen Bayerischen Wald kann mit Sicherheit gesagt werden, daß im Fürstensteiner Intrusivgebiet letzterer Fall zu einer Chemismusänderung der "ursprünglichen" Diorite führte.

Für eine Assimilation von Krustenmaterial, oder einer Mischung von Schmelzen, spricht, die in den Variationsdiagrammen aufgezeigte Linearität zwischen den Dioriten und den "älteren" Graniten, welche am deutlichsten im Regensburger Wald (Abb. 6a, S. 39) und im Intrusivgebiet von Fürstenstein (z.B. Abb. 16a, S. 78) zu beobachten ist. Auch das Variationsdiagramm  $Zr/TiO_2$  (Abb. 28), in dem das Feld der älteren Granite in seiner Elongation auf das Feld der Diorite weist, wobei die Linearität innerhalb der Fürstensteiner Magmatite besonders hervorzuheben ist, kann für einen derartigen Vorgang angesehen werden. Als Hinweis für eine gemeinsame Herkunft der Magmen wurde das von MADEL (1968) gedeutet.

In den älteren Graniten ist, von West nach Ost, eine Abnahme der Elementgehalte K, Rb, Ti, Mg und P zu beobachten. Dem entgegengesetzt nehmen die Gehalte an Ca und Sr zu (Tabelle 4).

Tabelle 4: Die mittleren Elementgehalte K, Rb, Ti, Mg, Ca, Sr und P in den älteren Graniten

| <u>Element</u>                | <u>Regensburger Wald</u> | <u>Intrusivgebiet</u>  | <u>Intrusivgebiet</u> |            |                |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------|----------------|
| (Gew.-%)                      |                          | <u>Lalling, Metten</u> | <u>Fürstenstein</u>   |            |                |
|                               | Kristallgranit I         | Kaussinger             | Mettener              | Tittlinger | Eberhards-     |
|                               |                          | Granit                 | Granit                | Granit     | reuther Granit |
| K <sub>2</sub> O              | 5,03                     | 4,31                   | 4,33                  | 4,02       | 4,24           |
| Rb                            | 222                      | 126                    | 177                   | 123        | 151            |
| TiO <sub>2</sub>              | 0,64                     | 0,37                   | 0,36                  | 0,49       | 0,35           |
| MgO                           | 1,11                     | 0,90                   | 0,68                  | 0,81       | 0,67           |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 0,31                     | 0,16                   | 0,18                  | 0,21       | 0,15           |
| CaO                           | 2,00                     | 1,98                   | 1,80                  | 2,74       | 1,90           |
| Sr                            | 181                      | 334                    | 189                   | 455        | 339            |

Die Abnahme der Elementgehalte Mg, Ti, P und Rb stimmt mit dem geochemischen Trend in den Dioriten (vgl. Tabelle 3) überein, in denen für diese Elemente ebenfalls eine Abnahme von Westen nach Osten festzustellen war.

Die jüngeren Granite unterscheiden sich von den älteren Graniten insbesondere durch einen höheren Differentiationsindex, der Lage ihrer Projektionspunkte im Granitsystem (d.h. im Phasenvolumen des Alkalifeldspates), niedrigere CaO-, Sr- und teilweise höhere K<sub>2</sub>O-, Rb-Gehalte (Ausnahme: Magmatite des Passauer Waldes).

Die unterschiedliche Steigung im Variationsdiagramm  $Zr/TiO_2$  (Abb. 28), gegen die älteren Granite, kann dadurch erklärt werden, das letztere eine Zufuhr basischer  $TiO_2$ -reicher Schmelze erfahren haben.

Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Normierung von Rb und Sr gegen Ba (Abb. 29c), wobei nach LANGMUIR, VOCKE, HANSON und HART (1978), bei einer Mischung von, entweder Ausgangsmaterial oder Schmelze, eine Linearität resultiert. Die älteren Granite variieren, wie auch die Diorite, im  $Sr/Ba$ -, die jüngeren im  $Rb/Ba$ -Verhältnis. Das Feld der älteren Granite fügt sich dabei zwischen das Feld der Diorite und das der jüngeren Granite ein. In Richtung höherer  $Rb/Ba$ -Verhältnisse ist ein linearer Bezug angedeutet, was für einen derartigen Vorgang spricht.

Beiden ist gemein, Dioriten sowie den älteren Graniten, wie schon erwähnt, die Lage ihrer Projektionspunkte im System  $An-Ab-Or-Qz-H_2O$  ( $P-H_2O = 5$  kbar) (Abb. 26, S. 110) im Phasenvolumen des Plagioklas. Der vorherrschende Druck während der Intrusion dürfte dabei, wie unter 5.3.1 beschrieben, etwas niedriger gelegen haben. Getrennt von diesen Magmatiten, liegen, im "Granitsystem", die jüngeren Granite, die mit Ausnahme von einer Rb-Abnahme von West nach Ost, keinen eindeutigen geochemischen Trend aufweisen, im Phasenvolumen des Alkalifeldspates.

Wie im Kapitel "Das System  $Ab-An-Or-Qz-H_2O$ " aufgezeigt wurde, kann die Bildung der jüngeren Granite, durch reine Differentiation eines, den "älteren" und "jüngeren" Graniten gemeinen Ausgangsmagmas, nicht erklärt werden. Ausschlaggebend für die Lagepunkte in diesem System sind in erster Linie die jeweiligen Elementoxidgehalte von  $CaO$  und  $K_2O$ , welche im granitischen Gestein in der Hauptsache von dem jeweiligen modalen Gehalt an (basischerem) Plagioklas bzw. Alkalifeldspat abhängig sind. Die mikroskopischen Befunde wiesen für die älteren Granite immer

einen gewissen Anteil an Plagioklasen mit Rekurrenzen auf, was durch eine Änderung des jeweilig vorherrschenden Magmenchemismus erklärt werden kann. Zusammen mit in den Variationsdiagrammen aufgezeigten Beziehungen zu den Dioriten, deutet dies auf eine Interaktion von granitischer und dioritischer Schmelze hin. Ob diese Plagioklase aber vielleicht reliktschen Ursprungs sind (vgl. WHITE und CHAPPELL 1977), kann mit den zur Verfügung stehenden Analysendaten nicht geklärt werden. Kennzeichnend sind für die älteren Granite und die Diorite durchaus vergleichbar hohe Sr-Gehalte.

Da die Entstehung der jüngeren Granite aus den älteren nicht durch Differentiation erklärt werden kann (Überschreiten der Grenze der Phasenvolumina von Plagioklas/Alkalifeldspat), können petrologisch gesehen nur drei Ursachen für diese unterschiedliche Lage im "Granitsystem" ausschlaggebend sein:

1) Die Ausgangsmagmen können unterschiedlich gewesen sein. Das aber ist in einem geologisch so kleinen Bereich wie er hier behandelt wird, zusammen mit der bisher ermittelten temporär kurz aufeinanderfolgenden Intrusionsfolge, nicht sehr wahrscheinlich.

2) Die Magmenentwicklung begann mit dem Eindringen von Mantelderivaten, führte zur Aufschmelzung von Krustensegmenten und zur Bildung von Mischschmelzen. Mit zunehmender Wärmezufuhr kam es zur sukzessiven Aufschmelzung von Biotit in den umgebenden Gesteinen (Gneise), wobei eine nicht unbedeutende Or-Komponente freigesetzt wurde. Diese führte zu einer Chemismusänderung bei

den jüngeren Graniten, was deren Lage der Projektionspunkte im Phasenvolumen des Alkalifeldspats bedingt. Von KNABE (1976) durchgeführte Versuche ergaben dieses Resultat. Hierbei treten als Abbauprodukte Gedrit, Hornblende und Ilmenit auf, Minerale die in den untersuchten Graniten nicht zu beobachten waren. EMMERMANN (1977) hält einen solchen Vorgang bei der Bildung der jüngeren Granite des Schwarzwaldes für wahrscheinlich. Im Falle des Vorderen Bayerischen Waldes fehlen, um definitive Verifikationen machen zu können, jedoch Analysen der Seltenen Erden, der in Frage kommenden Biotite, als auch der Alkalifeldspäte in den Graniten. Auszuschließen ist aber ein solcher Vorgang auch hier nicht, obwohl, wie im Regensburger Wald beobachtet, die jeweiligen Lagepunkte der älteren und jüngeren Granite (K.G.I bzw. K.G.II) im "Granitsystem" in erster Linie durch die CaO-Komponente bedingt ist.

Mittlere CaO- und K<sub>2</sub>O-Gehalte der Kristallgranite  
des Regensburger Waldes

| Gew. %           | Kristallgranit I | Kristallgranit II |
|------------------|------------------|-------------------|
| CaO              | 2,00             | 1,34              |
| K <sub>2</sub> O | 5,03             | 4,90              |

Dies führt zu der dritten möglichen magmatischen Entwicklungsgeschichte:

3) Durch Eindringen von Mantelderivaten in die Kruste, kam es zu Aufschmelzungen von Krustensegmenten und unterschiedlich starken Mischungen von Mantel- Krustenschmelzen, die, bedingt durch die jeweiligen Mischungsverhältnisse zu den (chemisch) verschiedenen

Gesteinsvarietäten führten. Dabei muß berücksichtigt werden, daß z.B. nur teilweise Aufschmelzungen erfolgt sein können, das heißt, daß auch reliktsche nicht aufgeschmolzene Bestandteile mitgeführt wurden. Als solche Relikte werden von WHITE und CHAPPELL (1977) und PITCHER (1978) u.a. komplex verzwilligte, zonar gebaute Plagioklase angesprochen.

Dieser 3. Fall kann für die Abfolge im Regensburger Wald (K.G.I - K.G.II), im Intrusivgebiet von Fürstenstein (Tittlinger Granit, Saldenburger Granit), also in Gebieten, in denen keine deutliche geographische Trennung dieser Intrusiva vorhanden ist, angenommen werden. Am eindeutigsten ist es im Regensburger Wald, wo die Trennung der Lagepunkte in die Phasenvolumina Plagioklas/Alkalifeldspat nur durch die Plagioklaskomponente CaO bedingt ist.

Für diesen magmengeschichtlichen Ablauf werden verschiedene Modellrechnungen diskutiert, wobei als Krustenschmelze die jeweils am höchsten differenzierten Granite herangezogen werden. Nur im Regensburger Wald konnte zusätzlich auf Anatexitanalysen zurückgegriffen werden (PROPACH 1977), so daß auch dieser hier als möglicher "Krustenschmelzenlieferant" erwogen wird. Für den Regensburger Wald ergeben sich, nach diesem Modell, also folgende Bildungsmöglichkeiten der resultierenden Magmen:

- 1) Die Entstehung aus sedimentärem Ausgangsmaterial (z.B. Anatexit des Regensburger Waldes (PROPACH 1978)) unter teilweiser Mitführung von reliktschem Material in der Schmelze.
- 2) Ein unterschiedliches Mischungsverhältnis von dioritischer Schmelze mit einer aus der Aufschmelzung von Paragneisen hervorgegangenen granitischen Schmelze.

zu 1)

Das Ausgangsmaterial der Granite lag in Form der Anatexite vor, wie sie heute im Regensburger Wald anzutreffen sind. Das Endprodukt der Aufschmelzung bildet der Granit mit dem höchsten D.I. (klein- bis mittelkörniger Granit). Das heißt, der krustale Anteil der Schmelze aus der alle Granite hervorgingen, entspricht der chemischen Zusammensetzung dieses Granits.

Die anderen Granite sind zusammengesetzt aus dieser Schmelze und einem Residualanteil des Ausgangsgesteins (Anatexit). Den Gegenüberstellungen liegen die folgenden, auf die chemischen Analysen bezogenen Berechnungen zugrunde. Diese Rechnungen wurden für ideale Bedingungen erstellt, was bedeutet, daß in der Betrachtung keine Zu- oder Abfuhr von Elementen stattfindet ("Geschlossenes System").

Die resultierenden Magmenzusammensetzungen werden, wie in folgenden Beispielen, errechnet.

a) Berechnung des Restitchemismus bei unterschiedlichem Aufschmelzungsgrad des Anatexits:

$0,3 \text{ Teile Restit} + 0,7 \text{ Teile Schmelze (entsprechend dem klein- bis mittelkörnigem Granit)} = 1 \text{ Teil Anatexit.}$

Daraus folgt: Restit =

b) Berechnung der endgültigen Magmenzusammensetzung:

$0,2 \text{ Teile Restit} + 0,8 \text{ Teile Schmelze} = \text{resultierendes Magma.}$

Die folgenden Tabellen zeigen:

In Tabelle 5,

die chemischen Zusammensetzungen des Kristallgranit I, des Anatexits, die chemischen Zusammensetzungen der Restite bei Aufschmelzungsgraden des Anatexites von 60% und 80% und die

chemischen Zusammensetzungen der resultierenden Magmen, bei einem Mischungsverhältnis 70% Schmelze (klein- bis mittelkörniger Granit) und 30% Restit.

In Tabelle 6,

die chemischen Zusammensetzungen des Kristallgranit II, des Anatexites, der Restite bei 60- und 80%iger Aufschmelzung des Anatexites und die resultierenden Magmenzusammensetzungen bei einem Mischungsverhältnis von 80% Schmelze und 20% Restit.

Tabelle 5: Die Magmenzusammensetzungen bei einer Zusammensetzung von 70-% Schmelze und 30-% Restit bei Aufschmelzungsgraden des Anatexiten von 60 bzw. 80 Prozent

+ und - hinter den Mischungsverhältnissen Restit + Schmelze = Abweichungen gegen den Kristallgranit I (in %)

\*Anatexitanalyse aus PROPACH (1977)

|                                | Kristallgranit I | Anatexit * | 60-% Aufschmelzung des Anatexit |                   | 80-% Aufschmelzung des Anatexit |                   |
|--------------------------------|------------------|------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                |                  |            | Restit                          | Restit + Schmelze | Restit                          | Restit + Schmelze |
| SiO <sub>2</sub>               | 68,00            | 69,70      | 63,31                           | 70,76 + 4 (%)     | 52,66                           | 67,57 - 0,6 (%)   |
| TiO <sub>2</sub>               | 0,64             | 0,54       | 1,07                            | 0,45 - 30         | 1,94                            | 0,79 + 23         |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 15,06            | 14,90      | 15,84                           | 14,74 + 2         | 17,42                           | 15,22 + 1         |
| FeO                            | 2,90             | 3,60       | 7,59                            | 2,94 + 1          | 14,24                           | 4,93 + 70         |
| MnO                            | 0,04             | 0,05       | 0,11                            | 0,05(+125         | 0,17                            | 0,06 + 50         |
| MgO                            | 1,11             | 1,30       | 2,47                            | 1,10 - 1          | 4,42                            | 1,69 + 52         |
| CaO                            | 2,00             | 1,40       | 2,57                            | 1,20 - 40         | 4,52                            | 1,79 - 11         |
| Na <sub>2</sub> O              | 3,00             | 2,80       | 2,05                            | 2,93 - 2          | 0,80                            | 2,55 - 15         |
| K <sub>2</sub> O               | 5,03             | 4,10       | 2,59                            | 4,36 - 13         | 0,06                            | 3,60 - 28         |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | 0,31             | 0,19       | 0,19                            | 0,19 - 39         | 0,19                            | 0,19 - 39         |
| Rb                             | 222              | 142        | 18                              | 163 - 27          | - 190                           | 101 - 55          |
| Sr                             | 181              | 138        | 257                             | 118 - 35          | 454                             | 177 - 2           |

Tabelle 6 :

Die Magmenzusammensetzungen bei einer Zusammensetzung von 80-% Schmelze und 20-% Restit bei Aufschmelzungsgraden des Anatexiten von 60 bzw. 70 Prozent

+ und - in Prozent hinter den Mischungsverhältnissen Restit + Schmelze = Abweichungen gegen den Kristallgranit II (in %); \* = Anatexitanalyse aus PROPACH (1977)

| Kristall-<br>granit II         | Anatexit | 60-% Aufschmelzung des Anatexiten |                   | 70-% Aufschmelzung des Anatexiten |                   |
|--------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                |          | Restit                            | Restit + Schmelze | Restit                            | Restit + Schmelze |
| SiO <sub>2</sub>               | 69,70    | 63,31                             | 71,84 + 0,7 (%)   | 59,70                             | 71,14 - 0,2 (%)   |
| TiO <sub>2</sub>               | 0,54     | 1,07                              | 0,36 -----        | 1,36                              | 0,42 + 17         |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 14,90    | 15,84                             | 14,59 + 0,3       | 16,37                             | 14,69 + 1         |
| FeO                            | 3,60     | 7,59                              | 4,32 + 147        | 9,87                              | 3,12 + 78         |
| MnO                            | 0,05     | 0,11                              | 0,04 + 300        | 0,12                              | 0,04 + 300        |
| MgO                            | 1,30     | 2,47                              | 0,91 + 54         | 3,13                              | 1,05 + 78         |
| CaO                            | 1,40     | 2,57                              | 1,53 + 14         | 3,23                              | 1,15 - 14         |
| Na <sub>2</sub> O              | 2,80     | 2,05                              | 3,05 - 5          | 1,63                              | 2,97 - 8          |
| K <sub>2</sub> O               | 4,10     | 2,59                              | 4,61 - 6          | 1,73                              | 4,44 - 9          |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | 0,19     | 0,19                              | 0,19 - 27         | 0,19                              | 0,19 - 27         |
| Rb                             | 142      | 18                                | 184 - 26          | - 52                              | 170 - 31          |
| Sr                             | 112      | 257                               | 98 - 13           | 322                               | 111 - 0,9         |

In Tabelle 5 entspricht die Magmenzusammensetzung am besten den Analysen des Kristallgranit I, die aus einer Aufschmelzung von 60% des Anatexites und einem Mischungsverhältnis von 70% Schmelze des klein- bis mittelkörnigen Granites und 30% des Restites resultieren. Auffallend stark sind aber die negativen Abweichungen hinsichtlich der Elemente  $\text{CaO}$ ,  $\text{P}_2\text{O}_5$ , Rb und Sr.

In Tabelle 6 entspricht dem Kristallgranit II am besten die Magmenzusammensetzung, die aus einer 70%igen Aufschmelzung des Anatexites hervorgegangen ist. Bemerkenswerte Abweichungen zeigen die Elemente Ti, Fe, Mg und Mn, zu hoch und die Elemente P und Rb, zu niedrig.

Für die beiden, rechnerisch unter idealen Bedingungen bestimmten Magmenzusammensetzungen, fallen die  $\text{P}_2\text{O}_5$ -Gehalte zu niedrig aus. Was nicht überraschen darf, wenn man das Ausgangsprodukt, den Anatexit betrachtet, denn in diesem liegen die  $\text{P}_2\text{O}_5$ -Gehalte bei 0,19 Gew.%. Dies aber entspricht den Gehalten des klein- bis mittelkörnigen Granites.

zu 2)

Wie anfangs erwähnt, sind hohe  $\text{P}_2\text{O}_5$ -Gehalte charakteristisch für den Diorit des Regensburger Waldes. Zusammen mit den geochemischen Trends zwischen dem Diorit und dem Kristallgranit I, gibt dies den Ausschlag, eine unterschiedlich starke Mischung von dioritischer und granitischer Schmelze (klein- bis mittelkörniger Granit) zu postulieren. Eine solche Modellrechnung wurde unter der Voraussetzung aufgestellt, daß keine Zu- oder Abfuhr stattgefunden hat. Mischungsverhältnisse dioritischer Schmelze zu granitischer Schmelze: 30 : 70 und 20 : 80 (Tabelle 7).

Tabelle 7 : Die Magmenzusammensetzungen bei einer Zusammensetzung von 70-% granitischer Schmelze und 30-% dioritischer Schmelze bzw. 80-% granitischer und 20-% dioritischer Schmelze und der Vergleich mit dem Kristallgranit I und II (positive und negative Abweichung in Prozent)

|                                | Kristall-<br>granit I | 0,7-% Granit+<br>0,3-% Diorit | Kristall-<br>granit II | 0,8-% Granit+<br>0,2-% Diorit |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| SiO <sub>2</sub>               | 68,00                 | 69,46 + 2 (%)                 | 71,31                  | 70,96 - 0,5(%)                |
| TiO <sub>2</sub>               | 0,64                  | 0,57 - 11                     | 0,36                   | 0,44 + 22                     |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 15,06                 | 14,87 - 1                     | 14,55                  | 14,40 - 1                     |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0,59                  | 0,42 - 34                     | 0,56                   | 0,42 - 25                     |
| FeO                            | 2,90                  | 2,48 - 14                     | 1,75                   | 2,00 + 14                     |
| MnO                            | 0,04                  | 0,05 + 25                     | 0,01                   | 0,04 +300                     |
| MgO                            | 1,11                  | 1,22 + 10                     | 0,59                   | 0,99 + 68                     |
| CaO                            | 2,00                  | 1,84 - 8                      | 1,34                   | 1,44 + 7                      |
| Na <sub>2</sub> O              | 3,00                  | 3,21 + 7                      | 3,22                   | 3,24 + 0,6                    |
| K <sub>2</sub> O               | 5,03                  | 4,73 - 6                      | 4,90                   | 4,85 - 1                      |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | 0,31                  | 0,41 + 32                     | 0,26                   | 0,33 + 27                     |
| Ba                             | 887                   | 515 - 42                      | 722                    | 433 - 40                      |
| Rb                             | 222                   | 203 - 9                       | 248                    | 210 - 15                      |
| Sr                             | 181                   | 178 - 2                       | 112                    | 138 + 23                      |
| Zr                             | 298                   | 202 - 32                      | 271                    | 165 - 39                      |

Bemerkenswert ist in diesen errechneten Magmenzusammensetzungen (in Tabelle 7), die gute Übereinstimmung mit dem Kristallgranit I und II (Ausnahme MgO, MnO im Kristallgranit II). In beiden Magmen sind auch deutlich zu hohe  $P_2O_5$ -Gehalte.

Da der Gehalt in Fall 1 zu niedrig, in Fall 2 zu hoch errechnet wurde, kann angenommen werden, daß beide Modelle zusammengewirkt haben.

Die bei einem solchen, komplexen Entstehungsmodell der resultierenden Magmen zu hoch errechneten MgO- bzw. MnO-Gehalte, können in einem "natürlichen" Magma durch den Entzug von Hornblende (MgO- und MnO-Träger) entfernt werden (z.B. Absaigerung).

Im Falle des sich östlich an den Regensburger Wald anschließenden Intrusivgebietes von Lalling, Metten, dem Flasergranit und dem Granit von Sattelpfeilstein, ist ein primärer Unterschied im Ausgangschemismus, aufgrund der geographisch deutlich getrennten Lage, dennoch nicht auszuschließen.

Die Position der Projektionspunkte im "Granitsystem" (nördliche Granite im Phasenvolumen des Alkalifeldspates, Granite von Lalling und Metten in dem des Plagioklas) in Abb. 12, trennt sie geochemisch ebenso, wie die deutlich divergierenden  $P_2O_5$ -Gehalte, sowie die hohen CaO- und Sr-Gehalte (Kaussinger und Mettener Granit) einerseits und die höheren  $K_2O$ - und Rb-Gehalte in den nördlichen Graniten andererseits.

Die mikroskopischen Übereinstimmungen (Rekurrenzen in den Plagioklasen der Gangdiorite und der südlichen Granite, sowie der maximale An-Gehalt von ca. 45 Mol%), könnten wiederum durch eine Mischung von dioritischer und granitischer Schmelze erklärt werden.

Für die Errechnung des Modellmagmas wurde der höchst-differenzierte Granit des Gebietes herangezogen (Flasergranit und der Mittelwert des Gangdiorites, Tabelle 9). Die berechneten Mischungsverhältnisse beziehen sich auf ein geschlossenes System (keine Zu- oder Abfuhr von Elementen).

In Tabelle 8 sind die chemischen Analysen (Mittelwerte) der Granite von Kaussing, Metten und Sattelpeilnstein aufgeführt, sowie die resultierenden Magmenchemismen, die einem Mischungsverhältnis Gangdiorit zu Flasergranit von 0,3 : 0,7, von 0,2 : 0,8 und 0,1 : 0,9 entsprechen.

Tabelle 8 : Der resultierende Magmenchemismus bei Mischungsverhältnissen von dioritischer (Gangdiorit) und granitischer (Flasergranit) Schmelze von 0,3:0,7 ; 0,2:0,8 ; 0,1:0,9 und die chemischen Analysen der Granite von Lalling, Metten und Sattelpfeilstein (Mittelwerte aus Anhang 1)

(%)= Abweichungen gegen de Granit von Sattelpfeilstein

| Kaussinger                     | Mettener | Granit von Mischungsverhältnisse Gangdiorit : Flasergranit |                  |            |             |             |
|--------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|-------------|
|                                |          | Granit                                                     | Sattelpfeilstein | (%)        | (%)         |             |
|                                |          |                                                            |                  | 0,3:0,7    | 0,2:0,8     | 0,1:0,9     |
| SiO <sub>2</sub>               | 71,51    | 71,74                                                      | 71,68            | 70,14 - 2  | 71,08 - 0,8 | 72,03 - 0,5 |
| TiO <sub>2</sub>               | 0,37     | 0,36                                                       | 0,39             | 0,59 + 51  | 0,47 + 21   | 0,36 - 8    |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 14,98    | 15,04                                                      | 14,74            | 14,94 + 1  | 14,81 + 0,5 | 14,67 - 0,5 |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0,40     | 0,34                                                       | 0,34             | 0,54 + 59  | 0,42 + 24   | 0,31 - 8    |
| FeO                            | 1,77     | 1,72                                                       | 1,96             | 2,70 + 37  | 2,32 + 18   | 2,28 + 16   |
| MnO                            | 0,05     | 0,03                                                       | 0,03             | 0,03 ---   | 0,03 ---    | 0,02 - 33   |
| MgO                            | 0,90     | 0,68                                                       | 0,83             | 1,13 + 36  | 0,96 + 16   | 0,81 - 2    |
| CaO                            | 1,98     | 1,80                                                       | 1,19             | 1,72 + 45  | 1,45 + 22   | 1,25 + 5    |
| Na <sub>2</sub> O              | 2,95     | 3,06                                                       | 2,75             | 2,81 + 2   | 2,78 + 1    | 2,74 - 0,4  |
| K <sub>2</sub> O               | 4,29     | 4,33                                                       | 5,25             | 4,91 - 6   | 5,05 - 4    | 5,20 - 1    |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | 0,16     | 0,18                                                       | 0,20             | 0,33 + 65  | 0,29 + 45   | 0,26 + 30   |
| Ba                             | 776      | 692                                                        | 527              | 663 + 26   | 550 + 4     | 468 - 11    |
| F                              | 583      | 753                                                        | 1029             | 1024 - 0,5 | 977 - 5     | 930 - 10    |
| Rb                             | 126      | 177                                                        | 234              | 219 - 6    | 232 - 1     | 244 + 4     |
| Sr                             | 334      | 189                                                        | 107              | 145 + 36   | 124 + 16    | 104 - 3     |

Wie aus der Tabelle 8 ersichtlich ist, kann eine Mischung von dioritischer und granitischer Schmelze zwar die chemische Zusammensetzung der Granite von Sattelpfeilstein hervorbringen (Mischungsverhältnis 0,1 : 0,9), nicht aber jene der Granite von Lalling und Metten. Hier fallen in erster Linie hohe Unterschiede der Elementgehalte  $\text{CaO}$ ,  $\text{K}_2\text{O}$ ,  $\text{P}_2\text{O}_5$ ,  $\text{Rb}$  und  $\text{Sr}$  der südlichen Granite und der errechneten Chemismen auf. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der Flasergranit höhere  $\text{P}_2\text{O}_5$ -Gehalte aufweist als die Granite von Lalling und Metten. Falls die gemeinsame granitische Schmelze der des höchstdifferenzierten Granites (Flasergranit) entsprochen hätte, so müßte die zugeführte dioritische Schmelze extrem niedrige  $\text{P}_2\text{O}_5$ -Gehalte und extrem hohe  $\text{Sr}$ -Gehalte aufweisen, um eine gemeinsame Herleitung dieser Gesteine mittels Mischung zu erklären. Eine solche chemische Zusammensetzung wurde aber für keine dieser dioritischen Proben festgestellt.

Eine Gegenüberstellung der Analysen von Kaussinger und Mettener Granit, mit den älteren Graniten des sich östlich anschließenden Fürstensteiner Intrusivgebietes (Tittlinger und Eberhardsreuther Granit), ergab eine auffallende Übereinstimmung im Chemismus, die eine Zuordnung dieser Granite ermöglicht (Tabelle 9).

Besonders hohe  $\text{CaO}$ - und  $\text{Sr}$ -Gehalte und gleichzeitig niedrige  $\text{K}_2\text{O}$ - und  $\text{Rb}$ -Gehalte sind charakteristisch.

Ein analoges Ergebnis weist der Vergleich des Flasergranites und des Granites von Sattelpfeilstein, mit dem jüngeren Granit (K.G.II) und dem klein- bis mittelkörnigen Granit des Regensburger Waldes auf (Tabelle 10).

Tabelle 9: Mittelwerte des Chemischen Analysen

|                                | Kaussinger<br>Granit | Mettener<br>Granit | Tittlinger<br>Granit | Eberhardsreuther<br>Granit |         |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|---------|
| SiO <sub>2</sub>               | 71,58                | 71,74              | 69,59                | 71,75                      | (Gew-%) |
| TiO <sub>2</sub>               | 0,37                 | 0,36               | 0,49                 | 0,35                       |         |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 14,98                | 15,04              | 15,09                | 14,54                      |         |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0,40                 | 0,34               | 0,31                 | 0,19                       |         |
| FeO                            | 1,77                 | 1,72               | 2,27                 | 1,82                       |         |
| MnO                            | 0,05                 | 0,03               | 0,07                 | 0,05                       |         |
| MgO                            | 0,90                 | 0,68               | 0,81                 | 0,67                       |         |
| CaO                            | 1,98                 | 1,80               | 2,74                 | 1,90                       |         |
| Na <sub>2</sub> O              | 2,95                 | 3,06               | 3,59                 | 3,40                       |         |
| K <sub>2</sub> O               | 4,29                 | 4,33               | 4,02                 | 4,24                       |         |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | 0,16                 | 0,18               | 0,21                 | 0,15                       |         |
| G.V.                           | 0,61                 | 0,61               | 0,59                 | 0,88                       |         |
| Summe                          | 100,04               | 99,89              | 99,78                | 99,94                      |         |
| Ba                             | 776                  | 692                | 1063                 | 927                        | (ppm)   |
| F                              | 583                  | 753                | 695                  | 585                        |         |
| Rb                             | 126                  | 177                | 123                  | 151                        |         |
| Sr                             | 334                  | 189                | 455                  | 339                        |         |
| Zr                             | 246                  | 191                | 199                  | 170                        |         |

Tabelle 10:

|                                | Kristallgranit | Granit v. Sattel-<br>peilnstein | Flasergranit | klein.-mittelk.<br>Granit |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|
| SiO <sub>2</sub>               | 71,31          | 71,68                           | 71,97        | 73,96                     |
| TiO <sub>2</sub>               | 0,36           | 0,39                            | 0,25         | 0,19                      |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 14,55          | 14,74                           | 14,53        | 14,27                     |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0,56           | 0,34                            | 0,19         | 0,40                      |
| FeO                            | 1,75           | 1,96                            | 1,57         | 0,94                      |
| MnO                            | 0,01           | 0,03                            | 0,01         | 0,02                      |
| MgO                            | 0,59           | 0,83                            | 0,62         | 0,52                      |
| CaO                            | 1,34           | 1,19                            | 1,02         | 0,62                      |
| Na <sub>2</sub> O              | 3,22           | 2,75                            | 2,71         | 3,30                      |
| K <sub>2</sub> O               | 4,90           | 5,25                            | 5,34         | 5,11                      |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | 0,26           | 0,20                            | 0,22         | 0,19                      |
| G.V.                           | 0,90           | 0,96                            | 0,99         | 0,77                      |
| Summe                          | 99,75          | 100,39                          | 100,42       | 100,29                    |
| Ba                             | 722            | 527                             | 385          | 267                       |
| F                              | 1191           | 1029                            | 883          | 574                       |
| Rb                             | 248            | 234                             | 256          | 225                       |
| Sr                             | 112            | 107                             | 83           | 59                        |
| Zr                             | 271            | 342                             | 164          | 91                        |
| D. I.                          | 84,5           | 83,5                            | 86,5         | 90                        |

Nach den chemischen und petrologischen Erkenntnissen können also die nördlichen Granite eher dem Regensburger Wald, die Granite von Lalling und Metten aber den älteren Graniten des Fürstensteiner Intrusivkomplexes zugeordnet werden, diesem komplex aufgebauten magmatischem Areal, in dem die Diorite eine vergleichbar hohe Spanne im Differentiationsbereich aufweisen (wie jene des Regensburger Waldes). Die hohen  $K_2O$ - und Rb-Gehalte die z.T. höher sind als im Tittlinger Granit (Abb. 18a), dürften dabei in einer postmagmatischen Überprägung der Diorite seitens der zeitlich folgenden Granite (TROLL 1964) begründet sein, was makroskopisch durch "einspiegeln" der Alkalifeldspatblasten erkennbar ist. Neben Kalium und Rubidium weisen die Diorite mit einem höheren D.I. ebenfalls erhöhte Zr-Gehalte auf. Sie sind charakteristisch für basischere Proben des Saldenburger Granits. Neben dieser Überprägung der Diorite erfolgte, sicherlich auch eine Differentiation des Ausgangsmagmas und, wie bei den zuvor behandelten Dioriten, teilweise Assimilation von krustalem Material (Schmelze). Für diesen Vorgang, der von FOURCADE und ALLEGRE (1981) im Falle der basischen bis intermediären Gesteinsserie der Pyrenäen angenommen wird, spricht der Trend der Diorite, in den Variationsdiagrammen gegen den D.I. (Abb. 16), worin sich das Dioritfeld an das Feld der älteren Granite anschließt, oder teilweise überlappt (wie z.B. im Diagramm Rb/Sr Abb. 17a). Die in den älteren Graniten im Kapitel 5.3.3.1 petrographische und in der Diskriminanzanalyse im Kapitel 5.3.3.3 "untermauerte" Verwandtschaft des Tittlinger und Eberhardsreuther Granites, findet das geochemische Gegenstück in den Variationsdiagrammen gegen den D.I. und im Diagramm Abb. 18b. Beiden gemein ist die Lage ihrer Projektionspunkte (aus der

Meso-Norm) im Phasenvolumen des Plagioklas. Ein Merkmal, das sie deutlich von den jüngeren Graniten (Zweiglimmer-Granit, Saldenburger Granit) trennt, die wie schon besprochen, im Phasenvolumen des Alkalifeldspates liegen. Durch Differentiation aus einer gemeinsamen Schmelze können die jüngeren Granite folglich nicht hervorgegangen sein (vgl. Kapitel 2.6).

Die Lagepunkte im System An-Ab-Or-Qz-H<sub>2</sub>O sind, in erster Linie bedingt durch die Oxidgehalte von CaO und K<sub>2</sub>O, die in den älteren und den jüngeren Graniten deutlich differieren. Die Oxide SiO<sub>2</sub> und Na<sub>2</sub>O beeinflussen die Lage im Granitsystem kaum.

Die CaO-Komponente repräsentiert hier in der Hauptsache den modalen Plagioklasbestand, die K<sub>2</sub>O-Komponente den des Alkalifeldspats. Die mikroskopischen Befunde zeigen für die älteren Granite komplex zonar gebaute Plagioklase mit Rekurrenzen, die in den jüngeren Graniten, mit Ausnahme der Proben der porphyrischen Randfazies des Saldenburger Granites, nicht zu beobachten waren. Ein weiteres Indiz, daß diese Plagioklase den Projektionspunkt der älteren Granite im Phasenvolumen des Plagioklas bedingen, stellt das Diagramm Sr/D.I. (Abb. 16g) dar. Hier sind die Proben des Tittlinger und des Eberhardsreuther Granits gegen die jüngeren Granite zu höheren Sr-Gehalten versetzt (reliktische Plagioklase = Sr-Lieferant).

Die deutliche Anreicherung an K<sub>2</sub>O im Zweiglimmer- und Saldenburger Granit gegenüber den älteren Graniten, kann einmal durch fortschreitende Differentiation unkontaminierten Magmas erklärt werden, daneben ist eine Zufuhr von Kalium, die durch eine Aufschmelzung von Biotit im krustalen Ausgangsgestein hervorgerufen wird, möglich (KNABE 1976).

Tabelle 11:

Vergleich der Mittelwerte des Chemismus der Intrusiva von Fürstenstein

(in Gew.-%) (+/- = Zunahme/Abnahme im Elementgehalt der jeweils folgenden Intrusion)

| Element                        | Qz-Glimmer-Diorite | Tittlinger Granit | Eberhardsreuther G. | 2-Glimmer-G. | Saldenburger G. |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| SiO <sub>2</sub>               | 63,49              | 69,59 +           | 71,75 +             | 71,64 -      | 73,54 +         |
| TiO <sub>2</sub>               | 1,07               | 0,49 -            | 0,35 -              | 0,35 0       | 0,28 -          |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 15,26              | 15,09 -           | 14,54 -             | 14,45 -      | 13,96 -         |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 1,03               | 0,31 -            | 0,19 -              | 0,45 +       | 0,19 -          |
| FeO                            | 4,67               | 2,27 -            | 1,82 -              | 1,62 -       | 1,77 +          |
| MnO                            | 0,12               | 0,07 -            | 0,05 -              | 0,05 0       | 0,03 -          |
| MgO                            | 1,87               | 0,81 -            | 0,67 -              | 0,55 -       | 0,33 -          |
| CaO                            | 4,09               | 2,74 -            | 1,90 -              | 1,45 -       | 1,16 -          |
| Na <sub>2</sub> O              | 3,94               | 3,59 -            | 3,40 -              | 3,23 -       | 3,05 -          |
| K <sub>2</sub> O               | 3,89               | 4,02 +            | 4,24 +              | 5,11 +       | 5,15 +          |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | 0,45               | 0,21 -            | 0,15 -              | 0,20 +       | 0,18 -          |
| G.V.                           | 0,82               | 0,52 -            | 0,88 +              | 0,57 -       | 0,72 +          |
| SUMME                          | 100,70             | 99,78             | 99,94               | 99,67        | 100,45          |
| Ba (ppm)                       | 1183               | 1063 -            | 927 -               | 587 -        | 538 -           |
| P                              | 890                | 695 -             | 595 -               | 854 +        | 606 -           |
| Rb                             | 93                 | 123 +             | 151 +               | 219 +        | 175 -           |
| Sr                             | 447                | 455 +             | 339 -               | 126 -        | 137 +           |
| Zr                             | 268                | 199 -             | 170 -               | 170 0        | 209 +           |

Auffallend ist bei einer deutlichen Zunahme an  $K_2O$  in den jüngeren Graniten, nur eine geringfügige Abnahme der Elementgehalte von  $TiO_2$  und  $Fe_{\text{ox}}$  gegen die älteren Granite. Die  $P_2O_5$ -Werte nehmen vom Eberhardsreuther Granit zu den jüngeren Graniten im Mittel sogar geringfügig zu. Allerdings entspricht dem bedeutenden  $K_2O$ -Zuwachs kein ebenso deutlicher Anstieg der Rb-Gehalte (Tabelle 11).

Die Wahrscheinlichkeit einer durch Aufschmelzung von Biotit bedingten Zunahme der  $K_2O$ -Gehalte, ließe sich mit Hilfe einer Analyse der Seltenen Erden, für die Biotite des Nebengesteins (Anatexit?), sowie der Alkalifeldspäte in den jüngeren Graniten untermauern (vgl. EMMERMANN 1977).

Ein möglicher Hinweis dafür, daß Plagioklase mit Rekurrenzzonen, etwas mit den dioritischen Gesteinen zu tun haben, ergibt sich durch die Beobachtung, daß diese Plagioklase, in Proben der porphyrischen Randfazies des Saldenburger Granits, also nahe am Kontakt zu den Dioriten, zu finden sind.

Wenn man davon ausgeht, daß die Granite aus einer gemeinsamen Ausgangsschmelze hervorgegangen sind, ist die Lage der Projektionspunkte der älteren Granite im Phasenvolumen des Plagioklas, durch die höheren modalen Anteile an basischeren Plagioklasen mitbestimmt.

Auch die sehr hohen Sr-Gehalte innerhalb der älteren Granite sprechen für eine mögliche Mischung von dioritischer mit granitischer Schmelze.

Für einen solchen Fall wurden verschiedene Mischungsverhältnisse rechnerisch ermittelt (Tabelle 12). Diese gelten für ein geschlossenes System. Die hierfür angenommenen Ausgangszusammensetzungen entsprechen einer relativ basischen Dioritprobe, die gleichzeitig hohe Sr-Gehalte aufweist (Probe Nr. 20 224 A) und einer hochdifferenzierten Probe des Saldenburger Granites, mit einem niedrigen  $P_2O_5$ -Gehalt (Probe Nr. 20 272).



Die besten Übereinstimmungen ergeben sich für die älteren Granite durch ein Mischungsverhältnis von 7 Teilen granitischer Schmelze zu 3 Teilen dioritischer Schmelze (Tittlinger Granit) und 8 Teilen granitischer Schmelze zu 2 Teilen dioritischer Schmelze (Eberhardsreuther Granit). Bei den jüngeren Graniten entsprechen die Mischungsverhältnisse von 8 : 2 und 9 : 1 (Zweiglimmer-Granit bzw. Saldenburger Granit) am ehesten den mittleren chemischen Zusammensetzungen.

Allen errechneten Zusammensetzungen gemein sind zu hohe resultierende  $K_2O$ -Gehalte. Der Grund hierfür liegt in dem sehr hohen Kaliumgehalt der Granitprobe (7,05 Gew.%  $K_2O$ ). Eine Berechnung der resultierenden Magmen in gleichen Mischungsverhältnissen, aber unter Verwendung der Mittelwerte der Diorite und des Saldenburger Granits, führten zwar im Falle des Kaliums zu besseren Resultaten, bei anderen Elementgehalten waren die Fehlergrenzen jedoch bedeutend höher (z.B. Sr,  $P_2O_5$ , MgO und CaO). Für das Element Sr ergeben sich für die älteren und die jüngeren Granite kontroverse Ergebnisse. Im Tittlinger und Eberhardsreuther Granit sind die Gehalte zu niedrig, im Zweiglimmer- und Saldenburger Granit deutlich zu hoch. Für den Fall, daß eine derartige Mischung zur Bildung der Granite führte, muß also angenommen werden, daß für die älteren Granite eine Sr-reichere, basische bis intermediäre, für die jüngeren Granite eine Sr-ärmere Schmelze vorlag. Eine mögliche Erklärung wäre die Annahme, daß es während der Mischung mit dem mengenmäßig größeren Anteil dioritischer Schmelze (Granite von Tittling und Eberhardsreuth), zur Ausbildung der basischen Plagioklase kam, die der Schmelze hohe Sr-Anteile "entzog", was charakteristisch ist für diese Magmatite.

Eine weiterführende Klärung könnte durch Plagioklas-Analysen erzielt werden.

Mit den bisher behandelten Intrusiva im westlichen Teil des Vorderen Bayerischen Waldes können die Magmatite des Passauer Waldes nicht direkt verglichen werden, da hier die granitoiden Gesteine mit abnehmendem Alter (DOLLINGER 1961) an Basizität zunehmen.

Auch der Diorit, der nach DOLLINGER (1961), die erste Intrusion darstellt, weist einen sehr hohen D.I. auf und ist vergleichbar mit den höchstdifferenzierten Fürstensteiner Dioriten. Allerdings konnte hier eine Überprägung, welche die hohen Rb- und K<sub>2</sub>O-Gehalte erklären könnte, mikroskopisch nicht nachgewiesen werden.

Die nach MADEL (1968) als Hinweis für eine gemeinsame Magmenabstammung geltende Linearität im Variationsdiagramm Zr/TiO<sub>2</sub> (Abb. 23b), welche sich in den Variationsdiagrammen Rb/Sr, Rb/K gegen K<sub>2</sub>O und Sr/Ca gegen CaO (Abb. 23a, 24a, b) wiederholt, trifft nicht oder nur bedingt zu, da die Projektionspunkte des Granodiorits und des Hauzenberger Granits II im "Granitsystem" im Phasenvolumen des Plagioklas, die des Hauzenberger Granits I im Phasenvolumen des Alkalifeldspats liegen. Ein solcher Wechsel der Lagepunkte der Magmatite kann nicht auf eine Ausscheidungsfolge aus einer gemeinsamen Schmelze zurückgeführt werden, obwohl die oben aufgeführten Variationsdiagramme darauf hinweisen.

Eine Möglichkeit, die die Lage der Projektionspunkte in den unterschiedlichen Phasenvolumina erklärt, liegt in der Zufuhr von basischer Schmelze zu einer gemeinsamen Or-reichen Schmelze (entsprechend dem Hauzenberger Granit I), die den Chemismus hinsichtlich der Zusammensetzung des Hauzenberger Granits II und

des Granodiorites veränderte.

Um diese Hypothese zu erhärten, wurde eine Modellrechnung durchgeführt, wobei als chemische Ausgangszusammensetzungen der Schmelzen die Mittelwerte des Hauzenberger Granits I und des Hauzenberger Diorits herangezogen wurden (Tabelle 13). Eine Schwierigkeit ergibt sich hinsichtlich des Elementes Phosphor, da sowohl im Hauzenberger Granit II und auch im Granodiorit die Elementgehalte niedriger sind als im Hauzenberger Granit I.

Tabelle 13: Mittlere chemische Zusammensetzung des Hauzenberger Granit II und die errechnete Zusammensetzung entsprechend einem Mischungsverhältnis von 2 Teilen dioritischer Schmelze (Hauzenberger Diorit) und 8 Teilen granitischer Schmelze (Hauzenberger Granit I) sowie die prozentuale Abweichung gegen den Hauzenberger Granit II

| Element<br>(Gew.-%)            | Hauzenberger<br>Granit II | Mischungsverhältnis<br>2 Teile Diorit : 8 Teile Granit<br>(%) |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| SiO <sub>2</sub>               | 70,01                     | 70,45 + 1                                                     |
| TiO <sub>2</sub>               | 0,51                      | 0,45 - 12                                                     |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 14,83                     | 14,47 - 2                                                     |
| Fe <sub>ges.</sub>             | 2,57                      | 2,43 - 5                                                      |
| MnO                            | 0,06                      | 0,06 0                                                        |
| MgO                            | 0,87                      | 0,80 - 8                                                      |
| CaO                            | 1,83                      | 1,34 - 27                                                     |
| Na <sub>2</sub> O              | 3,17                      | 3,30 + 4                                                      |
| K <sub>2</sub> O               | 5,00                      | 5,19 + 4                                                      |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | 0,22                      | 0,31 + 41                                                     |
| (ppm)                          |                           |                                                               |
| Ba                             | 1285                      | 1106 - 14                                                     |
| F                              | 1024                      | 1018 - 1                                                      |
| Rb                             | 238                       | 243 + 2                                                       |
| Sr                             | 288                       | 141 - 51                                                      |
| Zr                             | 313                       | 272 - 13                                                      |

Neben  $P_2O_5$  ergaben sich für CaO und Sr die größten Abweichungen. Ein Vergleich mit dem Granodiorit erbrachte auch bei einem erhöhten Anteil dioritischer Schmelze im Mischungsverhältnis, deutlich zu niedrige CaO- und Sr-Gehalte, da der Hauzenberger Diorit geringere Gehalte an diesen Elementen aufweist als der Granodiorit. Es muß also davon ausgegangen werden, daß, falls eine solche Mischung stattfand, die zugeführte basische Schmelze CaO- und Sr-reich war. Hier muß berücksichtigt werden, daß sich der Hauzenberger Granit II in den MgO-,  $TiO_2$ -,  $Fe_{\text{gesamt}}$ - und Zr-Gehalten nicht gravierend vom Granodiorit unterscheidet. Die deutlichsten Differenzen liegen bei den Elementen, die in erster Linie in die Feldspäte eingebaut werden (Tabelle 14).

Tabelle 14: Die mittleren  $Na_2O$ -, CaO-,  $K_2O$ , Sr- und Rb-Gehalte in den Hauzenberger Magmatiten (aus Tabelle in Anhang I)

| Element<br>(Gew-%) | Hauzenberger<br>Granit I | Hauzenberger<br>Granit II | Hauzenberger<br>Granodiorit |
|--------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| $Na_2O$            | 3,00                     | 3,17                      | 4,50                        |
| CaO                | 0,95                     | 1,83                      | 3,22                        |
| $K_2O$             | 5,36                     | 5,00                      | 3,34                        |
| Sr                 | 119                      | 288                       | 791                         |
| Rb                 | 264                      | 238                       | 86                          |

Hieraus wird ersichtlich, daß vom Hauzenberger Granit I zum Hauzenberger Granit II, vor allem die "Plagioklaselemente" Na, Ca und Sr zunehmen. Gegen den Granodiorit nehmen diese ebenfalls signifikant zu. Verbunden ist damit aber gleichzeitig eine deutliche Abnahme an K und Rb, beides Elemente, die in Alkalifeldspat eingebaut sind.

Das bedeutet, für die Lage der Projektionspunkte der Magmatite im System An-Ab-Or-Qz-H<sub>2</sub>O (Abb. 21), ist im Falle der Granite der höhere normative Plagioklasanteil im Hauzenberger Granit II verantwortlich. Beim Granodiorit bestimmen der höhere normative Plagioklas- und der niedrigere Alkalifeldspatanteil die Lage des Projektionspunktes im Phasenvolumen des Plagioklas.

Die in der petrographischen Beschreibung erwähnte Fließregelung der basischen Plagioklase im Granodiorit weist darauf hin, daß sie früh ausgeschleden wurden. Für die Entstehung der Hauzenberger Magmatite ergibt sich so das Modell einer teilweisen Assimilation von dioritischer Schmelze, seitens einer Or-reichen Schmelze (Hauzenberger Granit I) und einer eventuellen Auskristallisation und Absaigerung von Plagioklas. Jene reicherten sich vom Hauzenberger Granit II zum Granodiorit in der verbleibenden Schmelze an, sodaß es im Chemismus zu einem Anstieg von hauptsächlich CaO und Sr kam.

Die geochemischen Verhältnisse in den Apophysen und im sich östlich anschließenden Breitenberger Granit, deuten auf ähnlich gelagerte Bedingungen hin. Leider ist das Gebiet um Breitenberg noch nicht ausführlich kartiert und daher können keine näheren Angaben gemacht werden, in welchem Zusammenhang die etwas basischeren Proben dieses Granites zu den übrigen stehen (2 getrennte Intrusionen, vergleichbar Hauzenberger Granit I und II?).

Nach den vorliegenden Resultaten lässt sich das folgende Modell zur magmengeschichtlichen Entwicklung im Vorderen Bayerischen Wald erstellen. Dabei wird die aus seismologischen Arbeiten gewonnene Erkenntnis einer Krustenverdickung von WNW nach ESE berücksichtigt (STROSSENREUTHER, mündliche Mitteilung).

Modellvorstellung zur magmengeschichtlichen Entwicklung des Vorderen Bayerischen Waldes

Den Anfang bildet das Eindringen einer basischen Schmelze in die Kruste, die nach ihrer Zusammensetzung dem oberen Mantel entstammen könnte (Abb. 31a), was durch die hohen  $P_2O_5$ -Gehalte in den Dioriten bekräftigt wird.

Beim Eindringen in die Kruste kommt es, durch die damit verbundene Wärmezufuhr, zur Aufschmelzung von Krustenmaterial. Es erfolgt eine Mobilisation des aufgeschmolzenen Materials und eine Mischung von krustaler Schmelze mit der Mantelschmelze.

Dafür sprechen die gemeinsame Lage der älteren Granite und der Diorite im Phasenvolumen des Plagioklas, sowie der teilweise hohe Differentiationsindex und die hohen  $K_2O$ -, wie auch Rb-Gehalte der Diorite.

Die Abbildungen 3i a-d zeigen, stark überhöht, den  
schematischen, magmatischen Entwicklungsgang im  
Vorderen Bayerischen Wald

Abb. 31 a : Mantelmaterial dringt in die Kruste ein und verursacht eine Aufschmelzung von Teilen der Kruste. Dabei kommt es zu einer Mischung von sowohl Mantelschmelze mit der granitischen Krustenschmelze, als auch von Krustenmaterial mit der Mantelschmelze.




Abb. 31 b : Die mobilisierten granitischen Magmen und die durch Assimilation (Mischung) und Differentiation kontinuierlich saurer werdenden Mantelderivate intrudieren als ältere Granite und Diorite in höhere Stockwerke.





Abb. 31 c : Unter fortgesetzter Wärmezufuhr und geringer oder fehlender Zufuhr von Mantelmaterial bilden sich krustale Schmelzen, die entlang der Intrusionskontakte der älteren Granite und der Diorite zur umgebenden Kruste intrudieren und diese überlagern.

WNW




ESE

heutige Oberfläche

Abb. 31 d : Im Osten kommt es mit abnehmender Entfernung zu den Magmatiten des Waldviertels zu einer erneuten Zufuhr von Mantelderivaten in die Kruste. Daraus resultieren die jungen basischeren Magmatite des Passauer Waldes.

WNW



ESE

heutige Oberfläche

Diese zum einen granitischen, zum anderen dioritischen Gesteine, intrudieren in höhere Krustenniveaus (Abb. 31b), wobei sie, aufgrund der zunehmenden Krustenmächtigkeit gegen ESE, immer tiefere Erstarrungsorte bilden.

Mit abnehmendem Alter verringert sich dann die Zufuhr von basischer Schmelze, doch reicht die vorherrschende Temperatur aus, um weiteres Krustenmaterial aufzuschmelzen, welches entlang der Intrusionskontakte der älteren Granite und der Diorite (vgl. Kristallgranit II und Diorit im Regensburgener Wald), erleichterte Aufstiegsmöglichkeiten in höhere Stockwerke vorfindet (Abb. 31c). Die Lage der Projektionspunkte der jüngeren Granite im Phasenvolumen des Alkalifeldspates, der höhere D.I., sowie die höheren  $K_2O$  und Rb-Gehalte, sprechen dafür.

Im Osten kommt es schließlich mit abnehmender Entfernung zu den Intrusiva des Waldviertels, zu einer erneuten Beteiligung von basischer (Mantel-?) Schmelze, wodurch es in der Intrusionsfolge zur Bildung basischerer granitoider Intrusiva kam (Abb. 31d).

Die differierenden Intrusionsniveaus der Magmatite in diesem Modell, die auf einer unterschiedlichen Krustenmächtigkeit beruhen, lassen sich mit einigen, in Abschnitt 6 besprochenen, geochemischen Trends erklären.

1) Da die Diorite von WNW nach ESE zunehmend größere Strecken durch die Kruste zurückzulegen hatten, bis sie das heutige Anschnittsniveau erreichten, verblieb längere Zeit für eine Interaktion zwischen dem basischen und dem granitischen Magma, was sich in der Zunahme des Differentiationsindex und Abnahme der Elementgehalte  $MgO$ ,  $TiO_2$  und  $P_2O_5$  äußert.

2) Durch die häufig beobachteten Differentiationsverläufe innerhalb eines Plutons, vom äußeren Rand gegen das Zentrum (CARMICHAEL, TURNER, VERHOOGEN 1974), sind die hohen  $K_2O$ -, Rb-Gehalte im Kristallgranit I und die Verringerung dieser Elementgehalte in Richtung der östlich gelegenen Intrusiva erklärt. Im Regensburger Wald wird ein Kernbereich, gegen Osten aber, zunehmend die Randbereiche der Plutone angeschnitten. Daraus erklärt sich auch das Fehlen der älteren Granite im Passauer Wald.

## 7 Der Vergleich Varistischer Massive Mittel- und Südeuropas anhand geochemischer Daten

Im folgenden werden varistische Magmatite des Waldviertels, des Vorderen Bayerischen Waldes, des Massiv Central und der Pyrenäen, anhand einiger Elemente verglichen.

Dabei muß berücksichtigt werden, daß für die französischen Magmatite die Spurenelemente Ba, Rb und Sr nicht vorliegen und für die Diorite des Schwarzwaldes in dieser Arbeit nur die Elemente Na, Ca und K (aus BOSCH 1966), herangezogen werden können. Allein die Granite des Waldviertels, des Vorderen Bayerischen Waldes und des Schwarzwaldes, konnten auch hinsichtlich dieser Spurenelemente gegenübergestellt werden (Lit. siehe Anhang 1).

Bei der Darstellung der Granite wurde, soweit das Alter durch eine radiometrische Altersbestimmung oder aus feldgeologischen Beobachtungen ersichtlich war, darauf geachtet, die jüngeren und die älteren Granite getrennt gekennzeichnet aufzuführen.

Die Analysen der einzelnen Magmatite sind getrennt nach den Massiven in Anhang 1 zu ersehen.

In Abb. 32 ist der  $K_2O$ -Gehalt für die Intrusiva innerhalb der einzelnen varistischen Gebiete angetragen. Dabei fällt auf, daß die Kaliumgehalte der älteren Granite des Schwarzwaldes, bei vergleichbar hohen  $SiO_2$ -Gehalten, im Mittel höher sind als jene im Vorderen Bayerischen Wald, im Waldviertel, im Massiv Central und in den Pyrenäen.

Für  $CaO$  (Abb. 33a) liegen die niedrigsten Gehalte im Mittel im Massiv Central. Die jüngeren und die älteren Granite des Schwarzwaldes weisen jeweils niedrigere  $CaO$ -Gehalte auf als jene des Vorderen Bayerischen Waldes und des Waldviertels.

Die Abb. 34 zeigt auf, daß der hohe Differentiationsgrad der jüngeren Schwarzwälder Granite in erster Linie durch die hohen  $Rb$ -Gehalte nachgewiesen wird, dies aber in den  $K_2O$ -Gehalten nicht so deutlich zum Ausdruck kommt.

Im Verhältnis  $Ca/Sr$  (Abb. 34b) ergeben sich für die älteren Granite im Durchschnitt die niedrigsten Werte im Schwarzwald. Sie liegen recht konstant, wohingegen die jüngeren Schwarzwälder Granite deutlich differenziert sind. Die Werte reichen hier von  $Ca/Sr = 40$  bis 460, während die Granite des Vorderen Bayerischen Waldes und des Waldviertels allesamt bei einem Verhältnis zwischen 50 und 150 liegen.

Das gleiche Ergebnis bringt auch die Normierung von  $Rb$  und  $Sr$  gegen  $Ba$  (Abb. 35). Hier weisen die Granite des Waldviertels generell niedrige  $Rb/Ba$ -Werte auf, während die  $Sr/Ba$ -Werte mit denen des Vorderen Bayerischen Waldes und des Schwarzwaldes durchaus verglichen werden können. Die Felder für die älteren Schwarzwälder Granite und die älteren Granite des Vorderen Bayerischen Waldes stimmen in diesem Diagramm überein.

Abb. 32 :

■ = Diorite und Gabbro

● = ältere Granite

○ = jüngere Granite

+ = Aplite




Abb. 32 : Vergleich der K<sub>2</sub>O-Gehalte der varistischen Magmatite des Waldviertels, Vorderen Bayerischen Waldes, Schwarzwaldes, des Massif Central und der Pyrenäen

Abb. 33 :




Abb. 33 : Vergleich der CaO-Gehalte der varistischen Magmatite des Walldvierteils, Vorderen Bayerischen Waldes, Schwarzwaldes, des Massif Central und der Pyrenäen

Abb 34 a :

$K_2O/Rb$





Abb. 34 b :

$CaO/Sr$






Abb. 35 : Variationsdiagramm  $Rb/Ba$  gegen  $Sr/Ba$

Abb. 36 :




Abb. 36 : Vergleich der Varistischen Magmatite des Waldviertels, Vorderen Bayerischen Waldes, Schwarzwaldes, des Massif Centrals und der Pyrenäen im Dreieck Na<sub>2</sub>O - K<sub>2</sub>O - CaO

Innerhalb der jüngeren Granite ist in letzteren varistischen Gebieten ein enormer Zuwachs im Rb/Ba-Verhältnis zu beobachten, wobei die Granite des Schwarzwaldes eine höhere Differentiation aufweisen (Werte bis größer 6). Kennzeichnend hierfür ist ein deutlicher Anstieg der  $\text{Na}_2\text{O}$ -Gehalte (Abb. 36). So steigen diese  $\text{Na}_2\text{O}$ -Gehalte innerhalb der Magmatitfolgen vom Waldviertel über den Vorderen Bayerischen Wald, Schwarzwald zum Massiv Central an. Bei den Pyrenäen ist wieder eine Abnahme zu beobachten.

Die Abb. 36 zeigt deutlich den Trend innerhalb der verschiedenen varistischen Intrusivgebiete Mittel- und Südeuropas. Deutlich erkennbar ist die Zunahme an  $\text{K}_2\text{O}$ , die in all diesen Gebieten die jüngeren Intrusiva kennzeichnet.

Dem Versuch, eine geochemische Beziehung zwischen den hier betrachteten Gebieten herzustellen, steht gegenüber, daß die einzelnen Intrusivregionen regional weit voneinander entfernt liegen. Geht man aber davon aus, daß die krustalen Ausgangsgesteine durch Sedimentation innerhalb eines, alle Gebiete einschließenden "europäischen Ozeanbeckens" (COGNE 1972), hervorgegangen sind, kann unter Vorbehalt angenommen werden, daß sich die Zusammensetzung der Ausgangssedimente nicht sehr deutlich unterschied.

Unter dieser Voraussetzung läßt sich als Modell folgende Entstehungsgeschichte der varistischen Magmatite verstehen:

Durch eindringende Mantelderivate in die Kruste, kam es zur Aufschmelzung derselben wobei es durch

- a) Magmendifferenzierung
- b) unterschiedlich starker Assimilationsverhältnisse mit Krustenmaterial

zur Bildung chemisch verschieden zusammengesetzter basischer Magmatite kam.

Ähnliches gilt für die "älteren" Granite. Diese sind hervorgegangen durch teilweise Mischungen von Krustenderivaten mit den basischen Schmelzen, wobei sich im Vergleich der hier behandelten Gebiete kein eindeutiger geochemischer Trend erkennen läßt.

Anders verhält sich der beobachtbare dargestellte Verlauf innerhalb der "jungen" Granite der varistischen Ära. Hier ergibt sich eine eindeutige Tendenz zu höher differenzierten Graniten gegen Massiv Central und Schwarzwald.

Erklären kann man dies mit einer, in diesen Gebieten eventuell erhöhten Wärmezufuhr, wobei Biotitanteile der Kruste aufgeschmolzen wurden (vgl. EMMERMANN 1977).

Aus diesen Beobachtungen lassen sich unterschiedliche Krustenniveaus, Magmenzufuhranteile, nicht aber eine Subduktionszone ableiten. Definitivere Aussagen könnten erfolgen, wenn mehr Daten von Seiten der Geochronologie (bezügl. des Gesamtgesteinsalters) und der Seltenen Erden vorliegen (bezügl. der Eu-Anomalien Fsp. - Biotit).

ANHANG I

DIE MITTLERE CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG DER VARISTISCHEN  
MAGMATITE DES WALDVIERTELS, DES VORDEREN BAYERISCHEN WAL-  
DES, DES SCHWARZWALDES, DES MASSIF CENTRALS UND DER PY-  
RENÄEN

VARIISTISCHE MAGMATITE DES WALDVIERTELS (ÖSTERREICH) (nach Koller, 1981)

|                                | <u>Qz-Monzodiorit</u> | <u>Qz-Monzonit</u> | <u>Wolfsegger Granit</u> | <u>Eisgarner Granit</u> | <u>Schremser Granit</u> | <u>Mauth. Gran.</u> |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
|                                | n = 10                | n = 15             | n = 3                    | n = 2                   | n = 2                   | n = 1               |
| SiO <sub>2</sub>               | 58,31                 | 62,72              | 66,87                    | 71,65                   | 71,60                   | 69,72               |
| TiO <sub>2</sub>               | 1,35                  | 1,21               | 1,01                     | 0,31                    | 0,44                    | 0,51                |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 16,19                 | 15,96              | 15,67                    | 14,65                   | 14,51                   | 15,23               |
| FeO                            | 7,27                  | 5,74               | 4,39                     | 1,71                    | 1,78                    | 2,08                |
| MnO                            | 0,12                  | 0,15               | 0,08                     | 0,03                    | 0,04                    | 0,04                |
| MgO                            | 4,37                  | 2,52               | 1,55                     | 0,47                    | 0,49                    | 1,09                |
| CaO                            | 5,99                  | 4,39               | 2,68                     | 1,09                    | 2,22                    | 2,75                |
| Na <sub>2</sub> O              | 3,00                  | 3,12               | 2,96                     | 2,93                    | 3,47                    | 3,34                |
| K <sub>2</sub> O               | 2,94                  | 3,83               | 4,74                     | 5,75                    | 4,28                    | 3,97                |
| H <sub>2</sub> O               | 0,94                  | 0,67               | 0,72                     | 0,76                    | 0,51                    | 0,78                |
| SUMME                          | 100,48                | 100,31             | 100,67                   | 99,35                   | 99,34                   | 99,51               |
| Ba                             | 863                   | 1232               | 1110                     | 755                     | 1135                    | 1678                |
| F                              | 1052                  | 1149               | ----                     | ----                    | ----                    | 673                 |
| Rb                             | 76                    | 103                | 125                      | 204                     | 195                     | 80                  |
| Sr                             | 369                   | 285                | 203                      | 159                     | 210                     | 567                 |

Fortsetzung: VARISTISCHE MAGMATITE DES WALDVIERTELS (ÖSTERREICH)

|                                | Oz-Norit | Gabbro |
|--------------------------------|----------|--------|
|                                | n = 1    | n = 1  |
| SiO <sub>2</sub>               | 56,50    | 50,80  |
| TiO <sub>2</sub>               | 0,81     | 0,86   |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 15,38    | 14,60  |
| FeO                            | 8,32     | 8,57   |
| MnO                            | 0,14     | 0,13   |
| MgO                            | 7,22     | 13,15  |
| CaO                            | 5,85     | 8,12   |
| Na <sub>2</sub> O              | 2,67     | 2,00   |
| K <sub>2</sub> O               | 2,16     | 1,30   |
| H <sub>2</sub> O               | ----     | 1,31   |
| SUMME                          | 99,05    | 99,78  |
| Ba                             | 680      | 200    |
| F                              | ----     | ----   |
| Rb                             | 32       | 5      |
| Sr                             | 140      | 110    |

Mittlere chemische Zusammensetzung der Varistischen Magmatite des Vorderen Bayerischen Waldes

1) Regensburg-Wald

|                                | Diorit Regensburger<br>Wald | Kristallgranit I | Kristallgranit II | Klein-, Mittelkörniger<br>Granit | Granitporphyr |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|
| (Gew.-%)                       | n = 16                      | n = 14           | n = 10            | n = 19                           | n = 16        |
| SiO <sub>2</sub>               | 58,97                       | 68,00            | 71,31             | 73,96                            | 73,02         |
| TiO <sub>2</sub>               | 1,47                        | 0,64             | 0,36              | 0,19                             | 0,23          |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 16,26                       | 15,06            | 14,55             | 14,27                            | 14,68         |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 0,48                        | 0,59             | 0,56              | 0,40                             | 0,82          |
| FeO                            | 6,27                        | 2,90             | 1,75              | 0,94                             | 1,02          |
| MnO                            | 0,12                        | 0,04             | 0,01              | 0,02                             | 0,02          |
| MgO                            | 2,88                        | 1,11             | 0,59              | 0,52                             | 0,52          |
| CaO                            | 4,70                        | 2,00             | 1,34              | 0,62                             | 0,81          |
| Na <sub>2</sub> O              | 3,00                        | 3,00             | 3,22              | 3,30                             | 2,67          |
| K <sub>2</sub> O               | 3,82                        | 5,03             | 4,90              | 5,11                             | 5,28          |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | 0,93                        | 0,31             | 0,26              | 0,19                             | 0,10          |
| G.V.                           | ----                        | ----             | 0,90              | 0,77                             | 1,29          |
| Summe                          | 98,90                       | 98,68            | 99,75             | 100,29                           | 100,44        |
| (ppm)                          |                             |                  |                   |                                  |               |
| Ba                             | 1093                        | 887              | 722               | 267                              | 408           |
| F                              | 1402                        | 1414             | 1191              | 574                              | 1086          |
| Rb                             | 149                         | 222              | 248               | 225                              | 347           |
| Sr                             | 455                         | 181              | 112               | 59                               | 110           |
| Zr                             | 461                         | 298              | 271               | 91                               | 184           |
| D.I.                           | 52                          | 76,5             | 84,5              | 90                               | 87,5          |

| (Gew.-%)                       | Gangdiorit: Lalling, Regen |  | Kaussinger Granit |  | Mettener Granit |  | Granit von Sattel-<br>peilstein |  | Flasergranit |  |
|--------------------------------|----------------------------|--|-------------------|--|-----------------|--|---------------------------------|--|--------------|--|
|                                | n = 5                      |  | n = 9             |  | n = 9           |  | n = 9                           |  | n = 14       |  |
| SiO <sub>2</sub>               | 63,52                      |  | 71,58             |  | 71,74           |  | 71,68                           |  | 72,97        |  |
| TiO <sub>2</sub>               | 1,37                       |  | 0,37              |  | 0,36            |  | 0,39                            |  | 0,25         |  |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 15,91                      |  | 14,98             |  | 15,04           |  | 14,74                           |  | 14,53        |  |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 1,36                       |  | 0,40              |  | 0,34            |  | 0,34                            |  | 0,19         |  |
| FeO                            | 5,32                       |  | 1,77              |  | 1,72            |  | 1,96                            |  | 1,57         |  |
| MnO                            | 0,09                       |  | 0,05              |  | 0,03            |  | 0,03                            |  | 0,01         |  |
| MgO                            | 2,31                       |  | 0,90              |  | 0,68            |  | 0,83                            |  | 0,62         |  |
| CaO                            | 3,36                       |  | 1,98              |  | 1,80            |  | 1,19                            |  | 1,02         |  |
| Na <sub>2</sub> O              | 3,36                       |  | 2,95              |  | 3,06            |  | 2,75                            |  | 2,71         |  |
| K <sub>2</sub> O               | 3,91                       |  | 4,29              |  | 4,33            |  | 5,25                            |  | 5,34         |  |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | 0,58                       |  | 0,16              |  | 0,18            |  | 0,20                            |  | 0,22         |  |
| G.V.                           | 0,53                       |  | 0,61              |  | 0,61            |  | 0,96                            |  | 0,99         |  |
| Summe                          | 101,30                     |  | 100,04            |  | 99,89           |  | 100,39                          |  | 100,42       |  |
| (ppm)                          |                            |  |                   |  |                 |  |                                 |  |              |  |
| Ba                             | 1211                       |  | 776               |  | 692             |  | 527                             |  | 385          |  |
| F                              | 1352                       |  | 583               |  | 753             |  | 1029                            |  | 883          |  |
| Rb                             | 134                        |  | 126               |  | 177             |  | 234                             |  | 256          |  |
| Sr                             | 288                        |  | 334               |  | 189             |  | 107                             |  | 83           |  |
| Zr                             | 582                        |  | 246               |  | 191             |  | 342                             |  | 164          |  |
| D.I.                           | 61,5                       |  | 80                |  | 82              |  | 83,5                            |  | 86,5         |  |

Mittlere chemische Zusammensetzung der Varistischen Magmatite des Vorderen Bayerischen Waldes

3) Das Intrusivgebiet von Fürstenstein

|                                | Fürstensteiner | Tittlinger | Eberhardsreuther | Zwei-Glimmer- | Saldenburger | Apophysen  |
|--------------------------------|----------------|------------|------------------|---------------|--------------|------------|
|                                | Diorit         | Granit     | Granit           | granit        | Granit       | Vilschofen |
| (Gew.-%)                       | n = 12         | n = 11     | n = 3            | n = 4         | n = 20       | n = 2      |
| SiO <sub>2</sub>               | 63,49          | 69,59      | 71,75            | 71,64         | 73,54        | 72,03      |
| TiO <sub>2</sub>               | 1,07           | 0,49       | 0,35             | 0,35          | 0,28         | 0,38       |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 15,26          | 15,09      | 14,54            | 14,45         | 13,96        | 14,38      |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 1,03           | 0,31       | 0,19             | 0,45          | 0,28         | 0,96       |
| FeO                            | 4,67           | 2,27       | 1,82             | 1,62          | 1,77         | 1,15       |
| MnO                            | 0,12           | 0,07       | 0,05             | 0,05          | 0,03         | 0,04       |
| MgO                            | 1,87           | 0,81       | 0,67             | 0,55          | 0,33         | 0,42       |
| CaO                            | 4,09           | 2,74       | 1,90             | 1,45          | 1,16         | 1,27       |
| Na <sub>2</sub> O              | 3,94           | 3,59       | 3,40             | 3,23          | 3,05         | 3,15       |
| K <sub>2</sub> O               | 3,89           | 4,02       | 4,24             | 5,11          | 5,15         | 5,42       |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | 0,45           | 0,21       | 0,15             | 0,20          | 0,18         | 0,25       |
| G.V.                           | 0,82           | 0,59       | 0,88             | 0,57          | 0,72         | 0,76       |
| Summe                          | 100,70         | 99,78      | 99,94            | 99,67         | 100,45       | 100,21     |
| (ppm)                          |                |            |                  |               |              |            |
| Ba                             | 1183           | 1063       | 927              | 587           | 538          | 680        |
| F                              | 890            | 695        | 585              | 587           | 538          | 692        |
| Rb                             | 93             | 123        | 151              | 219           | 175          | 208        |
| Sr                             | 447            | 455        | 339              | 126           | 137          | 168        |
| Zr                             | 268            | 199        | 170              | 270           | 209          | 389        |
| D.I.                           | 67             | 77         | 82,5             | 85            | 87           | 87,5       |

## Mittlere chemische Zusammensetzung der Varistischen Magmatite des Vorderen Bayerischen Waldes

4) Passauer\_Wald

|                                | Hauzenberger<br>Diorit | Hauzenberger<br>Granit I | Hauzenberger<br>Granit II | Hauzenberger<br>Granodiorit | Breitenberger<br>Granit | Apophysen<br>Hauzenberg |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| (Gew.-%)                       | n = 1                  | n = 22                   | n = 18                    | n = 3                       | n = 17                  | n = 11                  |
| SiO <sub>2</sub>               | 63,11                  | 72,28                    | 70,01                     | 67,13                       | 72,29                   | 72,37                   |
| TiO <sub>2</sub>               | 1,30                   | 0,24                     | 0,51                      | 0,53                        | 0,22                    | 0,38                    |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 14,15                  | 14,55                    | 14,83                     | 16,78                       | 14,57                   | 14,20                   |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 1,20                   | 0,20                     | 0,43                      | 0,35                        | 0,36                    | 0,38                    |
| FeO                            | 4,19                   | 1,23                     | 1,93                      | 2,03                        | 1,33                    | 1,24                    |
| MnO                            | 0,14                   | 0,04                     | 0,06                      | 0,06                        | 0,03                    | 0,03                    |
| MgO                            | 2,08                   | 0,48                     | 0,87                      | 1,00                        | 0,42                    | 0,57                    |
| CaO                            | 2,88                   | 0,95                     | 1,83                      | 3,22                        | 1,16                    | 1,24                    |
| Na <sub>2</sub> O              | 4,51                   | 3,00                     | 3,17                      | 4,50                        | 3,23                    | 2,77                    |
| K <sub>2</sub> O               | 4,50                   | 5,36                     | 5,00                      | 3,34                        | 5,51                    | 5,87                    |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | 0,58                   | 0,24                     | 0,22                      | 0,18                        | 0,18                    | 0,15                    |
| G.V.                           | 0,81                   | 0,64                     | 0,71                      | 0,59                        | 0,65                    | 0,66                    |
| Summe                          | 99,45                  | 99,38                    | 99,66                     | 99,71                       | 99,95                   | 100,35                  |
| (ppm)                          |                        |                          |                           |                             |                         |                         |
| Ba                             | 1778                   | 938                      | 1285                      | 1364                        | 779                     | 794                     |
| F                              | 1467                   | 906                      | 1024                      | 1074                        | 782                     | 814                     |
| Rb                             | 158                    | 264                      | 238                       | 86                          | 279                     | 222                     |
| Sr                             | 229                    | 119                      | 288                       | 791                         | 134                     | 145                     |
| Zr                             | 423                    | 234                      | 313                       | 352                         | 240                     | 395                     |
| O.I.                           | 76                     | 88                       | 81                        | 74,5                        | 86                      | 87,5                    |

VARISTISCHE INTRUSIVA DES SCHWARZWALD (aus Emmermann, 1977)

|                                | Kleimbach-<br>Schlächten-<br>hausgranit | Blauen-<br>granit | Malsburg-<br>granit | St.Blasien-<br>granit | Albtal-<br>granit | Schluchsee-<br>granit | Bärhalde-<br>granit | Oberkirch-<br>granit | Raunünzsch-<br>granit |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|                                | n = 30                                  | n = 22            | n = 22              | n = 65                | n = 37            | n = 18                | n = 17              | n = 20               | n = 22                |
| SiO <sub>2</sub>               | 73,10                                   | 71,10             | 68,40               | 67,90                 | 68,50             | 71,30                 | 75,40               | 68,20                | 70,90                 |
| TiO <sub>2</sub>               | 0,19                                    | 0,23              | 0,47                | 0,55                  | 0,56              | 0,23                  | 0,07                | 0,56                 | 0,32                  |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 15,10                                   | 14,90             | 15,30               | 15,70                 | 15,10             | 14,30                 | 13,60               | 15,50                | 15,30                 |
| Fe <sub>ges.</sub>             | 1,03                                    | 1,77              | 2,74                | 3,23                  | 3,16              | 2,58                  | 1,21                | 3,93                 | 1,85                  |
| MgO                            | 0,38                                    | 1,03              | 1,48                | 1,43                  | 1,60              | 0,72                  | 0,17                | 1,34                 | 0,50                  |
| CaO                            | 0,74                                    | 1,38              | 1,84                | 2,03                  | 2,27              | 1,05                  | 0,31                | 1,62                 | 0,58                  |
| Na <sub>2</sub> O              | 4,20                                    | 3,87              | 3,65                | 3,42                  | 3,49              | 3,28                  | 3,38                | 3,12                 | 2,83                  |
| K <sub>2</sub> O               | 4,53                                    | 4,69              | 4,88                | 4,38                  | 4,63              | 5,32                  | 5,01                | 4,96                 | 5,70                  |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | 0,11                                    | 0,16              | 0,19                | 0,25                  | 0,27              | 0,12                  | 0,19                | 0,20                 | 0,20                  |
| SUMME                          | 99,28                                   | 99,13             | 98,95               | 98,89                 | 99,58             | 98,90                 | 99,34               | 99,43                | 98,18                 |
| Ba                             | 635                                     | 924               | 1022                | 1180                  | 943               | 1079                  | 226                 | 860                  | 384                   |
| F                              | 385                                     | 620               | 850                 | 874                   | 855               | 1270                  | 2985                | 892                  | 910                   |
| Rb                             | 221                                     | 236               | 226                 | 222                   | 220               | 289                   | 477                 | 224                  | 280                   |
| Sr                             | 192                                     | 242               | 302                 | 342                   | 357               | 85                    | 15                  | 199                  | 78                    |
| Zr                             | 75                                      | 126               | 188                 | 210                   | 177               | 167                   | 56                  | 226                  | 168                   |

Fortsetzung: VARISTISCHE MAGMATITE DES SCHWARZWALD

|                                | Bühlertal-<br>granit<br>n = 30 | Seebach-<br>granit<br>n = 55 | Forbach-<br>granit<br>n = 57 | Sprollenhaus-<br>granit<br>n = 5 |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| SiO <sub>2</sub>               | 71,50                          | 71,70                        | 72,10                        | 73,10                            |
| TiO <sub>2</sub>               | 0,24                           | 0,20                         | 0,17                         | 0,04                             |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 15,50                          | 15,20                        | 15,10                        | 15,80                            |
| Fe <sub>ges.</sub>             | 1,64                           | 1,33                         | 1,29                         | 1,03                             |
| MgO                            | 0,47                           | 0,31                         | 0,27                         | 0,07                             |
| CaO                            | 0,79                           | 0,58                         | 0,44                         | 0,46                             |
| Na <sub>2</sub> O              | 2,95                           | 2,88                         | 3,09                         | 3,50                             |
| K <sub>2</sub> O               | 5,66                           | 5,67                         | 5,20                         | 4,81                             |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | 0,22                           | 0,20                         | 0,25                         | 0,25                             |
| SUMME                          | 98,97                          | 98,07                        | 97,91                        | 99,06                            |
| Ba                             | 298                            | 194                          | 71                           | 85                               |
| F                              | 905                            | 932                          | 1175                         | 1975                             |
| Rb                             | 292                            | 340                          | 392                          | 574                              |
| Sr                             | 61                             | 52                           | 38                           | 10                               |
| Zr                             | 95                             | 91                           | 38                           | 25                               |

MASSIV CENTRAL (aus Didier, 1973)

|                                | <u>AIGUAL-MASSIV</u> |           | <u>St. GUTRAL-MASSIV</u> |                   | <u>SIDOBRE-MASSIV</u> |                   | <u>PIERRE-QUI-VIRE</u> |       | <u>ECHASSIERES-MASSIV</u> |                  |
|--------------------------------|----------------------|-----------|--------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------|---------------------------|------------------|
|                                | Porphy-<br>granit    | Qz-Diorit | Granodiorit              | Alkali-<br>granit | Granodiorit           | Alkali-<br>granit | Leucogranit            | n = 2 | Colettes-<br>granit       | Porphy-<br>Aplit |
|                                |                      |           |                          |                   |                       |                   |                        | n = 3 |                           | n = 4            |
| SiO <sub>2</sub>               | 66,90                | 68,50     | 69,75                    | 76,15             | 70,70                 | 73,90             | 74,40                  | 73,20 | 72,90                     |                  |
| TiO <sub>2</sub>               | 0,35                 | 0,35      | 0,45                     | 0,10              | 0,25                  | 0,15              | 0,05                   | 0,05  | 0,05                      |                  |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 15,25                | 12,35     | 14,30                    | 12,85             | 15,20                 | 14,90             | 14,35                  | 15,25 | 14,85                     |                  |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 1,35                 | 4,35      | 0,60                     | 0,40              | 0,15                  | 0,35              | 0,55                   | 0,40  | 0,40                      |                  |
| FeO                            | 2,85                 | 3,35      | 2,70                     | 0,20              | 2,15                  | 0,80              | 0,75                   | 0,70  | 0,70                      |                  |
| MnO                            | 0,05                 | 0,05      | ----                     | ----              | ----                  | ----              | ----                   | ----  | ----                      |                  |
| MgO                            | 2,45                 | 2,35      | 2,05                     | 1,40              | 1,25                  | 0,70              | 0,80                   | 0,80  | 1,35                      |                  |
| CaO                            | 1,80                 | 2,55      | 2,40                     | 0,20              | 2,05                  | 0,60              | 0,55                   | 0,70  | 0,70                      |                  |
| Na <sub>2</sub> O              | 2,95                 | 3,00      | 3,35                     | 2,90              | 3,50                  | 3,75              | 3,65                   | 3,40  | 3,35                      |                  |
| K <sub>2</sub> O               | 4,55                 | 3,15      | 3,45                     | 4,75              | 3,10                  | 3,85              | 4,20                   | 3,85  | 3,90                      |                  |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | 0,20                 | 0,05      | 0,20                     | 0,10              | 0,15                  | 0,15              | 0,05                   | 0,35  | 0,35                      |                  |
| H <sub>2</sub> O               | 0,95                 | 0,35      | 0,50                     | 1,10              | 0,80                  | 0,95              | 0,60                   | 1,15  | 1,25                      |                  |
| SUMME                          | 99,65                | 100,35    | 99,75                    | 100,15            | 99,30                 | 100,00            | 99,95                  | 99,85 | 99,90                     |                  |

| INTRUSIVA PYRENEÉN             |           |             |             |         |             |                    |         |                |       | (aus Fourcade & Allegre, 1981) |        |        |        |        |        |        |       |  |  |
|--------------------------------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|--------------------|---------|----------------|-------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--|--|
| Gabbro                         | Qz-Diorit | Granodiorit | Monzogranit | Porphy. | Monzogranit | Zentral-<br>granit | Porphy. | Muskovitgranit | Aplit |                                |        |        |        |        |        |        |       |  |  |
|                                |           |             |             |         |             |                    |         |                |       | n = 1                          | n = 25 | n = 42 | n = 36 | n = 46 | n = 15 | n = 15 | n = 3 |  |  |
|                                |           |             |             |         |             |                    |         |                |       |                                |        |        |        |        |        |        |       |  |  |
| SiO <sub>2</sub>               | 51,71     | 53,72       | 64,90       | 68,10   | 68,60       | 72,30              | 73,32   | 73,10          | 75,50 |                                |        |        |        |        |        |        |       |  |  |
| TiO <sub>2</sub>               | 0,91      | 1,63        | 0,54        | 0,38    | 0,40        | 0,18               | 0,15    | 0,16           | 0,07  |                                |        |        |        |        |        |        |       |  |  |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 13,03     | 19,04       | 16,85       | 15,65   | 15,35       | 14,15              | 14,48   | 14,60          | 12,40 |                                |        |        |        |        |        |        |       |  |  |
| Fe <sub>ges.</sub>             | 8,12      | 8,05        | 4,04        | 3,09    | 2,96        | 1,91               | 1,94    | 1,28           | 0,59  |                                |        |        |        |        |        |        |       |  |  |
| MnO                            | 0,09      | 0,10        | 0,06        | 0,05    | 0,05        | 0,04               | 0,05    | 0,03           | 0,01  |                                |        |        |        |        |        |        |       |  |  |
| MgO                            | 10,94     | 3,11        | 0,39        | 1,09    | 1,02        | 0,37               | 0,27    | 0,29           | 0,04  |                                |        |        |        |        |        |        |       |  |  |
| CaO                            | 7,27      | 6,21        | 4,20        | 2,70    | 2,67        | 1,33               | 1,27    | 0,90           | 1,04  |                                |        |        |        |        |        |        |       |  |  |
| Na <sub>2</sub> O              | 1,95      | 3,63        | 3,55        | 3,55    | 3,47        | 3,49               | 3,58    | 3,28           | 2,43  |                                |        |        |        |        |        |        |       |  |  |
| K <sub>2</sub> O               | 3,32      | 2,85        | 3,03        | 3,78    | 3,88        | 4,56               | 4,62    | 4,98           | 6,44  |                                |        |        |        |        |        |        |       |  |  |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>  | 0,15      | 0,40        | -----       | ----    | ----        | ----               | 0,02    | ----           | ----  |                                |        |        |        |        |        |        |       |  |  |
| G.V.                           | 1,47      | 1,69        | 1,03        | 1,39    | 1,29        | 1,39               | 0,59    | 0,96           | 0,80  |                                |        |        |        |        |        |        |       |  |  |
| SUMME                          | 98,96     | 100,43      | 99,59       | 99,78   | 99,69       | 99,72              | 100,29  | 99,58          | 99,32 |                                |        |        |        |        |        |        |       |  |  |

ANHANG II

CHEMISCHE ANALYSEN DER VARISTISCHEN MAGMATITE DES  
VORDEREN BAYERISCHEN WALDES

| MR.    | ST02  | AL203 | FE203 | FE0  | M60  | CA0  | NA20 | K20  | H20  | T102 | P203 | M40 | SUPPE  | FB  | SR  | ZR  | PA    | F    | D1    | R      | M      |
|--------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|--------|-----|-----|-----|-------|------|-------|--------|--------|
| 20150  | 71.54 | 14.76 | .21   | 1.09 | .64  | .82  | 3.38 | 5.21 | .68  | .22  | .33  | .05 | 98.93  | 252 | 283 | 285 | 134.8 | 1120 | 89.80 | 539755 | 539100 |
| 20151  | 72.90 | 14.26 | .31   | .88  | .35  | 1.05 | 3.43 | 5.23 | .68  | .24  | .18  | .03 | 99.34  | 266 | 89  | 223 | 686   | 754  | 90.55 | 539720 | 539220 |
| 20153  | 71.75 | 14.48 | .24   | 1.37 | .37  | 1.02 | 3.25 | 5.28 | .62  | .34  | .25  | .06 | 99.03  | 276 | 126 | 272 | 990   | 995  | 89.33 | 539790 | 539425 |
| 20154  | 73.22 | 14.33 | .11   | 1.34 | .36  | 1.05 | 3.14 | 5.26 | .52  | .24  | .18  | .03 | 99.78  | 266 | 113 | 265 | 704   | 1170 | 89.47 | 539760 | 539420 |
| 20155A | 73.48 | 15.09 | .12   | 1.39 | .36  | .98  | 3.23 | 5.08 | .52  | .20  | .22  | .02 | 99.69  | 270 | 129 | 264 | 911   | 898  | 87.23 | 539730 | 539425 |
| 20155B | 72.26 | 14.54 | .28   | 1.24 | .41  | 1.10 | 3.20 | 5.31 | .81  | .29  | .15  | .03 | 99.62  | 276 | 125 | 276 | 886   | 1160 | 85.84 | 539730 | 539405 |
| 20156  | 72.35 | 14.32 | .14   | 1.36 | .48  | .82  | 3.38 | 5.24 | .61  | .29  | .22  | .06 | 99.27  | 284 | 91  | 254 | 928   | 950  | 90.09 | 539635 | 539448 |
| 20157  | 72.74 | 14.14 | .13   | 1.28 | .68  | .84  | 3.31 | 5.63 | .42  | .25  | .23  | .07 | 99.72  | 280 | 78  | 212 | 1065  | 762  | 90.41 | 539754 | 539610 |
| 20160  | 73.18 | 14.66 | .40   | 1.23 | .34  | .97  | 3.06 | 5.28 | .66  | .17  | .17  | .02 | 99.94  | 219 | 92  | 157 | 526   | 930  | 89.65 | 539760 | 539416 |
| 20161  | 71.33 | 14.70 | .11   | 1.30 | .64  | .91  | 3.57 | 5.00 | .47  | .24  | .31  | .06 | 98.84  | 267 | 115 | 244 | 1000  | 800  | 89.48 | 540040 | 539518 |
| 20162  | 72.68 | 14.67 | .06   | 1.13 | .30  | .96  | 3.25 | 5.12 | .48  | .22  | .23  | .03 | 99.13  | 288 | 93  | 239 | 1110  | 894  | 90.08 | 539960 | 539374 |
| 20165A | 71.26 | 14.59 | .31   | 1.26 | .53  | .91  | 3.41 | 5.24 | .35  | .31  | .37  | .06 | 98.60  | 265 | 114 | 260 | 874   | 931  | 90.00 | 539610 | 539245 |
| 20165B | 71.87 | 14.38 | .30   | 1.37 | .51  | .95  | 3.48 | 4.96 | .42  | .31  | .24  | .06 | 98.85  | 285 | 113 | 264 | 985   | 926  | 89.46 | 539622 | 539252 |
| 20167A | 69.85 | 15.19 | .25   | 1.17 | .64  | .87  | 3.17 | 5.40 | .74  | .25  | .41  | .05 | 98.19  | 265 | 156 | 249 | 1031  | 905  | 89.11 | 539684 | 539370 |
| 20167C | 71.02 | 15.15 | .30   | 1.25 | .65  | 1.09 | 2.72 | 5.76 | .67  | .32  | .27  | .03 | 99.23  | 271 | 128 | 220 | 738   | 830  | 87.62 | 539684 | 539370 |
| 20170A | 73.97 | 13.95 | .15   | 1.23 | .32  | 1.04 | 3.17 | 5.39 | .69  | .16  | .13  | .03 | 100.23 | 244 | 113 | 181 | 944   | 660  | 90.16 | 539810 | 540210 |
| 20170C | 71.40 | 15.41 | .19   | 1.06 | .39  | .94  | 3.21 | 6.08 | .82  | .24  | .20  | .03 | 99.97  | 220 | 169 | 219 | 1075  | 418  | 89.89 | 539810 | 540210 |
| 20172  | 71.99 | 15.38 | .14   | 1.27 | .45  | .98  | 2.90 | 5.68 | .59  | .19  | .25  | .04 | 99.86  | 264 | 110 | 190 | 983   | 802  | 88.65 | 540240 | 539880 |
| 20174  | 72.68 | 14.08 | .09   | 1.17 | .57  | 1.01 | 3.49 | 5.38 | .54  | .21  | .23  | .05 | 99.50  | 262 | .98 | 230 | 1041  | 990  | 90.37 | 539712 | 539830 |
| 20175  | 75.12 | 13.04 | .12   | .91  | .33  | .73  | 2.85 | 4.93 | .85  | .20  | .16  | .03 | 99.27  | 267 | 82  | 220 | 773   | 1215 | 91.40 | 539806 | 539822 |
| 20176  | 72.22 | 14.06 | .40   | 1.06 | .45  | .91  | 3.03 | 5.34 | 1.60 | .31  | .09  | .05 | 99.52  | 268 | 97  | 271 | 916   | 724  | 89.87 | 539566 | 539768 |
| 20184  | 71.99 | 14.74 | .02   | 1.02 | .65  | 1.05 | 3.46 | 5.87 | .46  | .14  | .27  | .05 | 99.72  | 286 | 73  | 151 | 879   | 675  | 90.38 | 540320 | 538774 |
| 20187  | 70.38 | 15.01 | .30   | 1.38 | .93  | 1.67 | 3.24 | 5.08 | .56  | .60  | .26  | .09 | 99.50  | 237 | 294 | 299 | 1127  | 938  | 84.98 | 540064 | 539336 |
| 20186  | 71.29 | 14.19 | .24   | 1.79 | .87  | 1.46 | 3.16 | 5.14 | .59  | .41  | .27  | .08 | 99.49  | 257 | 275 | 282 | 1400  | 930  | 85.94 | 539935 | 530210 |
| 20166  | 69.21 | 15.14 | .13   | 1.95 | .99  | 1.33 | 3.17 | 5.39 | 1.25 | .39  | .32  | .07 | 99.34  | 283 | 203 | 267 | 1052  | 1089 | 84.61 | 539386 | 539432 |
| 20169  | 68.66 | 15.37 | 1.17  | 1.60 | .76  | 1.87 | 3.29 | 5.55 | .74  | .61  | .23  | .05 | 99.90  | 291 | 215 | 402 | 1266  | 2007 | 84.03 | 539276 | 539720 |
| 20171  | 68.82 | 15.08 | .54   | 2.09 | 1.16 | 1.67 | 3.03 | 5.30 | .91  | .61  | .30  | .08 | 99.39  | 305 | 232 | 345 | 1258  | 1753 | 82.60 | 539886 | 540066 |
| 20177B | 71.30 | 15.06 | .15   | 1.72 | .51  | 1.94 | 3.23 | 4.95 | .48  | .39  | .10  | .06 | 99.89  | 227 | 289 | 273 | 1504  | 1131 | 84.47 | 539740 | 539136 |
| 20178  | 70.35 | 16.20 | .42   | 2.05 | 1.09 | 1.87 | 3.33 | 4.45 | .69  | .49  | .23  | .08 | 99.25  | 241 | 189 | 286 | 1096  | 1027 | 82.81 | 539510 | 539018 |
| 20179  | 69.79 | 15.18 | .12   | 1.84 | .84  | 1.89 | 3.61 | 4.65 | .97  | .45  | .23  | .09 | 99.26  | 220 | 329 | 279 | 1240  | 962  | 83.76 | 539590 | 539010 |

HAUZNEEGGR GRANT

HAUZNEEGGR GRANT

| NR.    | ST02  | AL203 | FE203 | FE0  | H60  | CA0  | NA20 | K20  | H20  | TI02 | P205 | PNO | SURME  | RE  | SR  | ZR  | EA   | F    | D1    | R       | M      |
|--------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|--------|-----|-----|-----|------|------|-------|---------|--------|
| 20180A | 70.24 | 14.97 | 57    | 1.57 | .74  | 2.10 | 3.46 | 4.76 | .69  | .46  | .10  | .06 | 99.72  | 224 | 327 | 288 | 1262 | 918  | 83.41 | 539747. | 539032 |
| 20180B | 69.77 | 14.47 | 55    | 2.11 | 1.17 | 2.22 | 3.65 | 4.20 | .45  | .60  | .22  | .08 | 99.49  | 189 | 378 | 331 | 1558 | 1211 | 81.53 | 539747. | 539032 |
| 20180C | 69.89 | 15.30 | 118   | 2.00 | .77  | 2.30 | 3.28 | 4.70 | .70  | .69  | .13  | .06 | 99.80  | 228 | 324 | 293 | 1328 | 1260 | 81.52 | 539740. | 539021 |
| 20180D | 70.14 | 14.25 | 35    | 2.30 | .85  | 2.05 | 3.40 | 4.30 | .54  | .61  | .21  | .08 | 99.24  | 185 | 359 | 332 | 1594 | 1195 | 82.01 | 539740. | 539021 |
| 20181  | 69.82 | 15.37 | 66    | 2.00 | 1.07 | 2.01 | 3.52 | 4.86 | .53  | .45  | .21  | .08 | 99.58  | 227 | 328 | 285 | 1350 | 922  | 82.58 | 539878. | 539054 |
| 20182  | 71.03 | 14.31 | 43    | 1.86 | .76  | 2.26 | 3.29 | 4.65 | .56  | .47  | .11  | .06 | 99.49  | 221 | 315 | 288 | 1155 | 924  | 82.97 | 539954. | 539124 |
| 20183  | 71.99 | 14.33 | 30    | 1.45 | .58  | 1.47 | 2.80 | 5.00 | .80  | .35  | .20  | .04 | 99.31  | 274 | 150 | 254 | 1157 | 832  | 86.08 | 540116. | 538968 |
| 20192A | 69.95 | 14.50 | 89    | 2.19 | .75  | 1.42 | 2.89 | 6.06 | .83  | .53  | .24  | .04 | 100.29 | 227 | 94  | 428 | 845  | 2409 | 85.35 | 539335. | 540140 |
| 20192C | 69.33 | 15.11 | 44    | 2.42 | .77  | 1.56 | 3.23 | 5.62 | .93  | .54  | .20  | .06 | 100.21 | 202 | 180 | 438 | 962  | 2811 | 83.97 | 539340. | 540145 |
| 20194  | 68.29 | 15.21 | 98    | 2.37 | .83  | 1.84 | 3.25 | 5.52 | .87  | .67  | .26  | .05 | 100.14 | 224 | 329 | 539 | 1477 | 1500 | 82.34 | 538880. | 539640 |
| 20198  | 66.66 | 16.41 | 23    | 2.45 | 1.15 | 3.08 | 4.54 | 3.23 | .94  | .61  | .19  | .09 | 99.58  | 99  | 716 | 309 | 1323 | 1124 | 76.36 | 539910. | 539750 |
| 20199A | 66.68 | 17.22 | 43    | 1.92 | 1.03 | 3.51 | 4.51 | 3.19 | .40  | .56  | .18  | .05 | 99.68  | 69  | 873 | 377 | 1447 | 1130 | 75.88 | 539935. | 539745 |
| 201678 | 68.06 | 16.71 | 40    | 1.72 | .82  | 3.08 | 4.46 | 3.60 | .43  | .41  | .17  | .04 | 99.90  | 90  | 783 | 371 | 1323 | 967  | 79.08 | 539084. | 539370 |
| 20235  | 71.84 | 14.52 | 25    | 1.87 | .60  | 1.58 | 3.39 | 4.83 | .50  | .29  | .14  | .03 | 99.84  | 249 | 161 | 263 | 943  | 819  | 85.64 | 540460. | 539530 |
| 20236  | 72.82 | 14.54 | 31    | 1.15 | .17  | .88  | 3.04 | 5.89 | .70  | .15  | .20  | .03 | 99.88  | 318 | 109 | 223 | 656  | 678  | 90.81 | 540631. | 539585 |
| 20237  | 75.11 | 13.78 | 08    | .76  | .08  | .70  | 3.26 | 4.73 | .62  | .02  | .18  | .07 | 99.39  | 378 | 42  | 220 | 745  | 670  | 92.27 | 540630. | 539830 |
| 20238  | 74.33 | 14.43 | 83    | .43  | .05  | .71  | 3.27 | 4.57 | .41  | .06  | .11  | .04 | 99.64  | 290 | 20  | 177 | 725  | 326  | 92.25 | 540660. | 539880 |
| 20240  | 71.86 | 14.41 | 31    | 1.80 | .71  | 1.68 | 3.35 | 4.88 | .51  | .31  | .14  | .03 | 99.99  | 258 | 166 | 271 | 854  | 1028 | 85.35 | 540750. | 539840 |
| 20241  | 72.10 | 14.44 | 44    | 1.65 | .53  | 1.66 | 3.17 | 4.84 | .55  | .31  | .15  | .03 | 99.87  | 267 | 169 | 281 | 1075 | 1000 | 85.66 | 540780. | 539805 |
| 20242  | 71.86 | 14.85 | 42    | 1.15 | .47  | .78  | 3.21 | 6.13 | .72  | .18  | .20  | .01 | 99.98  | 272 | 143 | 217 | 699  | 930  | 90.56 | 540820. | 539620 |
| 20243  | 72.11 | 14.90 | 26    | 1.22 | .28  | 1.00 | 3.29 | 6.34 | .37  | .19  | .20  | .02 | 100.38 | 259 | 156 | 238 | 901  | 443  | 91.20 | 541135. | 539745 |
| 20244  | 71.44 | 14.99 | 35    | 1.29 | .56  | .71  | 2.81 | 6.03 | 1.52 | .23  | .20  | .02 | 100.15 | 226 | 95  | 211 | 799  | 948  | 88.53 | 540865. | 539960 |
| 20245  | 72.48 | 14.47 | 28    | 1.29 | .44  | 1.06 | 3.19 | 5.74 | .53  | .22  | .20  | .04 | 99.94  | 353 | 127 | 226 | 382  | 903  | 89.61 | 540750. | 540080 |
| 20246  | 70.67 | 14.57 | 23    | 2.08 | .74  | 1.63 | 3.29 | 5.77 | .52  | .41  | .22  | .04 | 100.17 | 335 | 194 | 306 | 818  | 2145 | 85.71 | 540330. | 540210 |
| 20247  | 73.04 | 14.64 | 52    | .79  | .28  | .75  | 3.20 | 5.59 | .81  | .13  | .18  | .02 | 99.95  | 260 | 117 | 214 | 750  | 564  | 91.20 | 540345. | 540250 |
| 20249  | 72.22 | 14.39 | 46    | 1.37 | .61  | 1.31 | 3.39 | 5.71 | .55  | .26  | .14  | .03 | 100.24 | 269 | 168 | 240 | 397  | 439  | 88.92 | 541160. | 539960 |
| 20250  | 70.87 | 14.82 | 41    | 1.87 | .52  | 1.80 | 3.48 | 5.00 | .40  | .37  | .18  | .04 | 99.76  | 260 | 183 | 284 | 1015 | 856  | 85.18 | 541020. | 539385 |
| 20252  | 72.10 | 14.49 | 31    | 1.65 | .48  | 1.55 | 3.35 | 4.96 | .60  | .27  | .15  | .03 | 99.94  | 246 | 171 | 266 | 1035 | 552  | 86.41 | 541010. | 539440 |
| 20254  | 71.78 | 14.77 | 35    | 1.15 | .45  | .95  | 3.20 | 6.34 | .89  | .23  | .21  | .04 | 100.32 | 212 | 145 | 225 | 688  | 258  | 90.19 | 540845. | 539130 |
| 20255  | 72.42 | 14.66 | 37    | 1.15 | .33  | 1.01 | 3.07 | 5.70 | .83  | .18  | .21  | .03 | 99.96  | 366 | 111 | 223 | 764  | 808  | 89.50 | 540800. | 539360 |

| NR.    | STC2   | AL203 | FEB23 | FEB  | 160  | CAO  | MA20 | K20  | H20  | T102 | P205 | MA0 | SUMPE  | FE  | SR  | ZR  | BA   | F    | DI    | R      | H      |
|--------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|--------|-----|-----|-----|------|------|-------|--------|--------|
| 20166  | 72.36  | 14.88 | 80    | 1.75 | .72  | 1.52 | 1.85 | 4.46 | .86  | .38  | .11  | .05 | 99.34  | 257 | 197 | 322 | 1178 | 964  | 82.24 | 538860 | 539370 |
| 20191  | 11.21  | 14.72 | 25    | 2.44 | .77  | 1.40 | 3.30 | 6.21 | .78  | .48  | .16  | .02 | 100.72 | 242 | 92  | 550 | 663  | 922  | 85.75 | 539275 | 540110 |
| 20193  | 74.88  | 12.00 | 58    | 1.56 | .52  | .81  | 2.42 | 5.75 | .70  | .31  | .10  | .03 | 100.29 | 255 | 118 | 158 | 1053 | 633  | 89.70 | 538880 | 539550 |
| 20194  | 508.29 | 15.21 | 58    | 2.37 | .82  | 1.84 | 3.25 | 5.52 | .87  | .67  | .26  | .05 | 100.14 | 224 | 329 | 540 | 1477 | 1200 | 82.64 | 538860 | 539660 |
| 20195  | 71.15  | 14.24 | 49    | 2.06 | .74  | 1.58 | 2.90 | 6.17 | .68  | .54  | .14  | .02 | 100.73 | 198 | 109 | 813 | 609  | 874  | 85.60 | 538660 | 539550 |
| 20196  | 73.54  | 14.54 | 60    | 1.14 | .35  | .85  | 2.72 | 5.12 | .64  | .14  | .23  | .03 | 99.38  | 286 | 91  | 198 | 782  | 566  | 89.64 | 538600 | 539545 |
| 20197  | 71.23  | 14.33 | 100   | 1.72 | .72  | 1.13 | 2.96 | 6.36 | .70  | .58  | .14  | .02 | 100.90 | 184 | 159 | 786 | 831  | 952  | 87.53 | 538480 | 539470 |
| 20208  | 75.38  | 13.33 | 05    | 1.45 | .44  | .81  | 2.47 | 6.01 | .56  | .22  | .04  | .02 | 100.78 | 269 | 84  | 176 | 364  | 1042 | 90.13 | 538095 | 540170 |
| 20211  | 74.61  | 13.03 | 01    | 1.13 | .31  | 1.22 | 2.46 | 6.49 | .40  | .15  | .01  | .02 | 100.44 | 139 | 207 | 148 | 703  | 136  | 90.20 | 538640 | 540690 |
| 20212  | 71.69  | 14.30 | 10    | 2.37 | .58  | 1.56 | 2.61 | 6.34 | .60  | .53  | .20  | .04 | 101.22 | 183 | 134 | 332 | 684  | 1110 | 86.01 | 538595 | 539760 |
| 20217  | 72.76  | 14.22 | 46    | 1.01 | .24  | .90  | 3.28 | 6.15 | .42  | .19  | .26  | .05 | 99.96  | 209 | 95  | 117 | 387  | 552  | 92.17 | 537820 | 539910 |
| 20200  | 09.30  | 15.57 | 00    | 2.15 | .82  | 2.68 | 3.62 | 4.20 | .54  | .50  | .19  | .04 | 100.03 | 130 | 469 | 174 | 1192 | 753  | 79.34 | 538130 | 539575 |
| 20206A | 69.58  | 14.56 | 20    | 2.59 | .74  | 2.50 | 3.59 | 3.56 | 1.00 | .49  | .23  | .07 | 99.53  | 136 | 427 | 202 | 890  | 581  | 79.77 | 537980 | 540150 |
| 20206R | 70.58  | 14.23 | 24    | 2.51 | .62  | 2.41 | 3.46 | 3.66 | .68  | .47  | .22  | .06 | 99.44  | 125 | 443 | 200 | 944  | 696  | 80.34 | 537985 | 540185 |
| 20207  | 71.00  | 15.14 | 00    | 1.94 | .54  | 2.52 | 3.64 | 4.20 | .46  | .42  | .20  | .05 | 100.19 | 124 | 488 | 176 | 1089 | 540  | 82.21 | 537995 | 540210 |
| 20209  | 70.35  | 14.96 | 14    | 2.16 | .62  | 2.55 | 3.58 | 4.15 | .60  | .40  | .20  | .07 | 99.79  | 131 | 458 | 190 | 863  | 693  | 81.34 | 538060 | 540250 |
| 20213  | 68.44  | 14.94 | 55    | 2.52 | .80  | 2.95 | 3.87 | 4.16 | .50  | .58  | .26  | .09 | 99.75  | 129 | 479 | 210 | 1029 | 794  | 79.53 | 537980 | 540000 |
| 20214  | 70.54  | 14.66 | 39    | 2.37 | .70  | 2.47 | 3.35 | 4.24 | .44  | .47  | .22  | .08 | 99.78  | 135 | 419 | 209 | 969  | 614  | 81.13 | 537950 | 540020 |
| 20215  | 67.51  | 15.95 | 12    | 2.80 | .96  | 3.29 | 3.61 | 3.76 | .64  | .55  | .23  | .06 | 99.94  | 107 | 527 | 226 | 1536 | 812  | 75.55 | 537850 | 539840 |
| 20218A | 69.35  | 15.34 | 35    | 2.30 | .82  | 2.73 | 3.63 | 4.04 | .45  | .47  | .23  | .07 | 99.79  | 116 | 489 | 194 | 912  | 589  | 79.65 | 537695 | 539800 |
| 20219  | 69.68  | 15.22 | 22    | 1.58 | .60  | 2.66 | 3.53 | 3.96 | .60  | .46  | .22  | .05 | 99.59  | 112 | 388 | 212 | 1036 | 642  | 80.05 | 537760 | 539820 |
| 20224R | 68.34  | 15.56 | 82    | 1.62 | .62  | 3.14 | 3.59 | 4.33 | .54  | .61  | .15  | .08 | 99.77  | 111 | 421 | 200 | 1233 | 935  | 78.99 | 537645 | 539770 |
| 20216  | 64.78  | 14.64 | 113   | 4.31 | 1.57 | 3.50 | 3.88 | 4.44 | .72  | 1.03 | .43  | .13 | 100.52 | 107 | 372 | 269 | 1090 | 826  | 73.05 | 537990 | 539930 |
| 20218B | 65.17  | 15.20 | 65    | 4.17 | 1.35 | 2.64 | 4.17 | 4.42 | .90  | .91  | .37  | .08 | 100.27 | 136 | 342 | 277 | 1354 | 833  | 76.13 | 537695 | 539800 |

| NR.    | S102  | AL203 | PER23 | TEC  | JGC  | C/G  | H420 | V20  | H20  | T102 | P205 | MNO | SUPPE  | RF  | SR  | ZR  | PA   | F    | D1    | R      | H      |
|--------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|--------|-----|-----|-----|------|------|-------|--------|--------|
| 20220  | 62.50 | 16.58 | 51    | 2.45 | 1.66 | 4.06 | 4.36 | 2.74 | .61  | .66  | .45  | .11 | 100.17 | 79  | 663 | 224 | 1091 | .862 | 65.45 | 337760 | 339685 |
| 20221  | 63.63 | 14.34 | 1.00  | 2.31 | 1.63 | 3.82 | 3.68 | 5.03 | .56  | 1.31 | .42  | .18 | 99.71  | 157 | 305 | 244 | 1236 | 1032 | 74.39 | 339650 | 339820 |
| 20222  | 62.97 | 16.00 | .60   | 4.74 | 2.00 | 3.77 | 3.76 | 3.69 | 1.13 | 1.03 | .43  | .09 | 100.71 | 105 | 402 | 268 | 1381 | 936  | 67.72 | 337635 | 339800 |
| 20223  | 60.66 | 15.38 | 1.61  | 5.53 | 2.44 | 4.79 | 4.25 | 3.55 | 1.10 | 1.25 | .56  | .14 | 101.23 | 85  | 462 | 253 | 1154 | 848  | 64.59 | 337680 | 339775 |
| 20224  | 58.54 | 15.55 | 1.99  | 5.60 | 3.11 | 4.06 | 4.35 | 2.98 | .84  | 1.41 | .73  | .15 | 101.71 | 59  | 624 | 239 | 1097 | 620  | 59.39 | 337645 | 339770 |
| 20225  | 67.52 | 14.00 | .70   | 3.45 | 1.09 | 2.49 | 3.52 | 4.73 | .72  | .79  | .34  | .10 | 100.04 | 139 | 291 | 366 | 1107 | 1028 | 74.56 | 337500 | 339760 |
| 20226  | 64.11 | 16.04 | .88   | 3.52 | 1.66 | 4.56 | 3.04 | 3.30 | .77  | .79  | .38  | .12 | 100.10 | 74  | 590 | 221 | 1373 | 682  | 68.80 | 337460 | 339720 |
| 20227  | 65.81 | 14.82 | .64   | 3.65 | 1.30 | 3.12 | 3.59 | 4.58 | .82  | .90  | .38  | .12 | 100.37 | 139 | 324 | 323 | 995  | 1100 | 74.99 | 337500 | 339735 |
| 20228  | 64.42 | 15.07 | 1.36  | 4.24 | 1.57 | 3.52 | 3.83 | 4.36 | .50  | 1.08 | .44  | .13 | 100.47 | 111 | 375 | 322 | 1130 | 1080 | 73.08 | 337430 | 339780 |
| 20230  | 61.30 | 14.90 | .57   | 5.32 | 2.54 | 5.88 | 3.90 | 2.62 | 1.21 | 1.34 | .50  | .11 | 100.70 | 57  | 609 | 212 | 1182 | 819  | 60.24 | 337155 | 339860 |
| 20706  | 63.11 | 14.15 | 1.20  | 4.19 | 2.78 | 2.88 | 4.51 | 4.50 | .81  | 1.30 | .58  | .14 | 99.45  | 158 | 229 | 432 | 1778 | 1467 | 76.17 | 329790 | 340210 |
| 20283  | 64.08 | 15.73 | 1.44  | 4.89 | 2.11 | 3.06 | 3.26 | 4.58 | .88  | 1.28 | .55  | .09 | 101.52 | 144 | 240 | 583 | 1336 | 1492 | 70.00 | 336240 | 341570 |
| 20284  | 64.06 | 15.69 | 1.52  | 4.96 | 2.60 | 3.01 | 2.96 | 4.45 | .66  | 1.32 | .58  | .09 | 101.39 | 140 | 252 | 659 | 1182 | 1337 | 69.76 | 336080 | 341560 |
| 20285  | 62.62 | 15.86 | 1.65  | 4.04 | 2.44 | 3.65 | 2.93 | 3.46 | .68  | 1.54 | .76  | .12 | 101.57 | 135 | 269 | 468 | 1301 | 1363 | 63.59 | 336080 | 341560 |
| 20286  | 64.20 | 16.01 | 1.01  | 5.17 | 2.44 | 3.33 | 3.08 | 3.27 | .60  | 1.35 | .49  | .09 | 101.05 | 138 | 313 | 481 | 1042 | 1389 | 65.83 | 336180 | 341970 |
| 20288  | 62.66 | 16.26 | 1.16  | 5.53 | 2.41 | 3.73 | 2.96 | 3.58 | .75  | 1.35 | .51  | .08 | 100.98 | 114 | 365 | 419 | 1196 | 1158 | 63.75 | 335570 | 342960 |
| 20205  | 76.70 | 12.73 | .01   | 1.22 | .04  | .77  | 2.93 | 4.98 | .58  | .10  | .05  | .02 | 100.13 | 209 | 55  | 119 | 102  | 642  | 92.12 | 337980 | 340710 |
| 202211 | 73.83 | 15.94 | .10   | 1.37 | .10  | .66  | 3.38 | 5.57 | .63  | .14  | .16  | .04 | 99.74  | 182 | 84  | 118 | 320  | 449  | 92.50 | 337650 | 339820 |
| 202228 | 71.81 | 14.85 | .11   | 1.65 | .33  | 1.03 | 3.51 | 5.47 | .55  | .21  | .23  | .03 | 99.78  | 148 | 108 | 166 | 503  | 335  | 89.49 | 337635 | 339800 |
| 202258 | 71.42 | 14.26 | .07   | 2.08 | .37  | 1.35 | 3.52 | 5.54 | .71  | .32  | .22  | .06 | 99.92  | 154 | 139 | 216 | 771  | 706  | 88.01 | 337500 | 339760 |
| 20229  | 74.62 | 14.32 | .03   | 1.33 | .01  | 1.01 | 3.34 | 4.92 | .53  | .16  | .08  | .02 | 100.37 | 121 | 111 | 154 | 396  | 801  | 90.29 | 337440 | 339790 |
| 20258  | 71.91 | 14.32 | .29   | 2.44 | .40  | 1.63 | 3.13 | 5.33 | .51  | .38  | .23  | .06 | 100.77 | 165 | 174 | 283 | 583  | 948  | 85.16 | 338060 | 340250 |
| 20260  | 73.22 | 13.50 | .87   | 1.97 | .47  | 1.24 | 2.81 | 4.63 | 1.26 | .38  | .24  | .04 | 100.58 | 154 | 137 | 334 | 390  | 547  | 85.92 | 337850 | 340370 |
| 20261  | 75.71 | 13.53 | .24   | 1.44 | .04  | .78  | 2.78 | 4.84 | .87  | .18  | .12  | .02 | 100.52 | 211 | 83  | 143 | 145  | 305  | 90.13 | 337880 | 340520 |
| 20262  | 76.95 | 13.08 | .33   | .90  | .51  | .52  | 2.90 | 4.43 | 1.01 | .09  | .06  | .01 | 100.49 | 209 | 44  | 116 | 133  | 243  | 92.08 | 337800 | 340730 |
| 20263  | 75.74 | 13.80 | .12   | 1.15 | .21  | .86  | 2.70 | 4.75 | .61  | .18  | .21  | .01 | 100.49 | 184 | 89  | 147 | 244  | 458  | 90.05 | 337515 | 339940 |
| 20264  | 75.35 | 13.17 | .15   | 1.58 | .16  | .87  | 3.00 | 4.83 | .66  | .23  | .14  | .03 | 100.29 | 203 | 88  | 175 | 54   | 564  | 90.35 | 337300 | 339870 |
| 20265  | 69.88 | 14.85 | .76   | 2.30 | .85  | 1.47 | 3.21 | 5.26 | 1.27 | .49  | .31  | .07 | 100.44 | 155 | 218 | 283 | 786  | 777  | 84.42 | 337300 | 339870 |
| 20266  | 70.93 | 14.65 | .36   | 2.38 | .69  | 1.76 | 3.10 | 5.25 | .67  | .43  | .26  | .05 | 100.55 | 130 | 206 | 329 | 809  | 753  | 84.16 | 337275 | 340240 |
| 20267  | 71.40 | 14.61 | .26   | 2.44 | .47  | 1.64 | 3.04 | 5.21 | .60  | .43  | .25  | .04 | 100.39 | 150 | 211 | 268 | 742  | 644  | 84.69 | 337300 | 340400 |

SALBENKUGEL GRANT

| NR.   | S102  | AL203 | FL203 | FEO  | ICO  | CAU  | NA20 | K20  | H20  | T102 | P205 | MRO | SUMPE  | RB  | SR  | ZR  | PA   | F    | DI    | R      | H      |
|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|--------|-----|-----|-----|------|------|-------|--------|--------|
| 20268 | 74.05 | 13.44 | .43   | 1.80 | .44  | 1.33 | 3.03 | 4.91 | .51  | .31  | .19  | .04 | 100.52 | 184 | 166 | 207 | 409  | 559  | 87.52 | 537370 | 540650 |
| 20269 | 77.23 | 12.21 | .18   | 1.80 | .14  | .66  | 2.73 | 4.26 | .65  | .21  | .11  | .03 | 100.40 | 175 | 78  | 213 | 222  | 712  | 89.51 | 537580 | 540620 |
| 20270 | 71.65 | 14.72 | .43   | 2.44 | .65  | 1.53 | 3.14 | 5.35 | .78  | .43  | .22  | .03 | 100.47 | 138 | 110 | 312 | 920  | 794  | 84.31 | 537500 | 540430 |
| 20271 | 72.13 | 14.54 | .19   | 2.08 | .81  | 1.27 | 3.12 | 4.87 | 1.08 | .32  | .21  | .03 | 100.65 | 190 | 158 | 212 | 538  | 753  | 84.99 | 537690 | 540440 |
| 20272 | 74.62 | 13.58 | .09   | .43  | .76  | .70  | 2.31 | 7.05 | .57  | .09  | .03  | .01 | 101.54 | 185 | 165 | 116 | 1967 | 224  | 93.67 | 537480 | 540340 |
| 20273 | 70.57 | 14.90 | .55   | 2.61 | .64  | 1.77 | 3.03 | 5.31 | .49  | .46  | .27  | .03 | 100.63 | 157 | 211 | 275 | 730  | 915  | 83.31 | 537655 | 540265 |
| 20201 | 72.00 | 14.12 | .11   | 2.08 | .58  | 1.94 | 3.36 | 4.21 | .75  | .36  | .17  | .06 | 99.71  | 168 | 333 | 158 | 811  | 581  | 84.01 | 537970 | 541040 |
| 20202 | 70.70 | 14.94 | .06   | 2.15 | .76  | 2.41 | 3.56 | 4.12 | .60  | .39  | .17  | .05 | 99.84  | 129 | 378 | 196 | 1064 | 628  | 81.37 | 537980 | 540925 |
| 20203 | 72.55 | 14.56 | .43   | 1.22 | .64  | 1.35 | 3.28 | 4.30 | 1.28 | .29  | .10  | .04 | 100.15 | 156 | 306 | 155 | 906  | 547  | 85.92 | 538110 | 541000 |
| 20196 | 74.08 | 14.04 | .53   | .93  | .18  | .63  | 2.54 | 5.56 | .82  | .13  | .21  | .05 | 99.75  | 263 | 50  | 116 | 114  | 895  | 91.04 | 537760 | 539570 |
| 20198 | 70.08 | 15.04 | .60   | 1.78 | .56  | 2.37 | 3.46 | 3.88 | .51  | .52  | .22  | .04 | 99.40  | 217 | 196 | 199 | 818  | 1080 | 81.27 | 537900 | 539510 |
| 20233 | 71.62 | 14.62 | .20   | 1.58 | .50  | 1.09 | 3.77 | 5.50 | .45  | .23  | .21  | .04 | 99.81  | 107 | 110 | 129 | 543  | 586  | 89.67 | 537580 | 539570 |
| 20234 | 70.77 | 14.11 | .46   | 2.20 | .62  | 1.65 | 3.14 | 5.51 | .51  | .50  | .15  | .07 | 99.69  | 190 | 147 | 234 | 874  | 856  | 85.51 | 537580 | 539640 |
| 20231 | 70.44 | 14.72 | 1.64  | 1.72 | .67  | 1.85 | 3.32 | 4.56 | .68  | .60  | .24  | .04 | 100.34 | 175 | 296 | 661 | 1088 | 524  | 84.94 | 536690 | 539360 |
| 20232 | 73.61 | 14.04 | .27   | 1.06 | .20  | .68  | 2.97 | 5.88 | .83  | .15  | .26  | .04 | 100.01 | 241 | 39  | 116 | 272  | 860  | 91.95 | 536650 | 539010 |
| 20274 | 71.36 | 15.39 | .20   | 1.80 | .50  | 2.15 | 3.46 | 3.35 | .53  | .34  | .15  | .04 | 99.67  | 97  | 400 | 205 | 663  | 481  | 81.13 | 536390 | 541280 |
| 20275 | 71.03 | 14.60 | .57   | 1.72 | 1.05 | 1.81 | 2.96 | 5.20 | .45  | .39  | .16  | .06 | 100.10 | 181 | 236 | 245 | 864  | 871  | 83.81 | 536320 | 541230 |
| 20276 | 71.70 | 15.22 | .15   | 1.80 | .83  | 2.14 | 3.30 | 3.43 | .63  | .33  | .16  | .05 | 99.74  | 95  | 395 | 188 | 756  | 446  | 81.25 | 536220 | 541080 |
| 20277 | 73.21 | 14.50 | .58   | 1.22 | .73  | 1.16 | 2.60 | 5.12 | .74  | .28  | .16  | .04 | 100.34 | 226 | 115 | 149 | 491  | 492  | 86.59 | 536330 | 541100 |
| 20278 | 74.95 | 13.43 | .38   | 1.29 | .80  | .94  | 1.69 | 6.44 | .74  | .22  | .12  | .02 | 101.06 | 149 | 138 | 456 | 634  | 334  | 87.90 | 536150 | 541000 |
| 20279 | 71.57 | 15.32 | .23   | 1.87 | .82  | 2.12 | 3.31 | 3.37 | .48  | .35  | .17  | .05 | 99.66  | 97  | 385 | 186 | 746  | 477  | 81.19 | 536300 | 541000 |
| 20280 | 65.41 | 15.47 | .64   | 2.16 | 1.12 | 2.61 | 3.19 | 4.25 | .50  | .55  | .18  | .06 | 100.14 | 101 | 449 | 261 | 1131 | 743  | 78.59 | 536140 | 540900 |
| 20281 | 65.28 | 15.48 | .65   | 2.16 | 1.14 | 2.86 | 3.01 | 4.00 | .59  | .54  | .20  | .05 | 99.98  | 92  | 508 | 278 | 1140 | 903  | 77.10 | 536120 | 540830 |
| 20282 | 71.71 | 15.38 | .18   | 1.87 | .73  | 1.99 | 2.99 | 3.32 | .83  | .36  | .16  | .04 | 99.56  | 95  | 377 | 203 | 559  | 498  | 80.88 | 536290 | 540860 |
| 20289 | 71.51 | 15.05 | .42   | 1.72 | .84  | 2.27 | 3.03 | 3.83 | .35  | .39  | .12  | .03 | 99.62  | 147 | 230 | 203 | 759  | 856  | 81.16 | 534560 | 541770 |
| 20290 | 73.34 | 14.92 | .01   | 1.80 | .44  | 1.20 | 2.50 | 4.59 | .35  | .27  | .17  | .02 | 99.69  | 231 | 105 | 139 | 406  | 641  | 85.80 | 534635 | 541850 |
| 20291 | 71.27 | 15.55 | .11   | 2.01 | .64  | 2.10 | 2.75 | 4.20 | .35  | .37  | .17  | .03 | 99.70  | 153 | 251 | 214 | 735  | 709  | 81.43 | 534635 | 541850 |
| 20292 | 69.54 | 15.25 | .25   | 2.08 | .83  | 2.31 | 4.61 | 3.79 | .51  | .43  | .17  | .04 | 99.85  | 151 | 280 | 229 | 781  | 681  | 82.83 | 534780 | 541720 |
| 20293 | 70.20 | 15.18 | .37   | 2.23 | 1.04 | 2.64 | 2.99 | 3.91 | .52  | .50  | .15  | .04 | 99.74  | 123 | 294 | 290 | 817  | 727  | 78.41 | 534725 | 541680 |
| 20294 | 76.45 | 14.71 | .42   | .86  | .30  | .87  | 2.40 | 4.79 | .81  | .16  | .26  | .01 | 100.04 | 220 | 78  | 95  | 423  | 400  | 88.69 | 534380 | 541600 |

| Nr.   | SIC2  | ALP02 | FE207 | FE0  | LOC  | CAO  | KAP0 | P20  | V20  | T102 | P205 | MAO | SUMVE  | FE  | SR  | ZR  | BA   | F    | DI    | M      | H      |
|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|--------|-----|-----|-----|------|------|-------|--------|--------|
| 20295 | 73.56 | 14.97 | 20    | 1.15 | 30   | 1.00 | 2.73 | 5.19 | .72  | .22  | .25  | .01 | 100.42 | 219 | 91  | 120 | 487  | 1107 | 88.30 | 534390 | 541510 |
| 20296 | 73.78 | 14.92 | 20    | 1.04 | 30   | 1.00 | 3.30 | 4.33 | 1.14 | .39  | .16  | .03 | 100.05 | 172 | 193 | 202 | 818  | 721  | 84.00 | 534220 | 541760 |
| 20297 | 71.10 | 14.71 | 27    | 2.23 | 23   | 2.09 | 5.01 | 4.23 | .73  | .47  | .15  | .02 | 99.84  | 174 | 163 | 325 | 1002 | 936  | 81.33 | 533810 | 542020 |
| 20298 | 73.78 | 14.47 | 28    | 2.43 | 30   | 1.53 | 2.06 | 6.68 | .65  | .17  | .11  | .01 | 100.47 | 229 | 133 | 124 | 687  | 395  | 89.02 | 533810 | 542020 |
| 20300 | 72.85 | 14.19 | 24    | 1.72 | 63   | 1.12 | 2.55 | 5.77 | .99  | .31  | .21  | .01 | 100.59 | 237 | 83  | 287 | 275  | 965  | 87.04 | 535460 | 542670 |
| 20310 | 72.84 | 14.56 | 20    | 1.58 | 57   | 1.04 | 2.81 | 5.16 | .93  | .25  | .23  | .01 | 100.15 | 260 | 88  | 149 | 470  | 952  | 87.42 | 535570 | 542530 |
| 20311 | 73.27 | 14.27 | 17    | 1.58 | 57   | 1.09 | 2.64 | 5.22 | .95  | .27  | .20  | .01 | 100.19 | 232 | 84  | 183 | 276  | 927  | 87.28 | 535450 | 542555 |
| 20312 | 72.36 | 14.81 | 29    | 1.51 | 67   | 1.05 | 2.67 | 5.40 | 1.05 | .26  | .23  | .01 | 100.35 | 221 | 96  | 180 | 381  | 596  | 86.95 | 535620 | 542580 |
| 20313 | 71.62 | 14.55 | 22    | 1.94 | 71   | 1.26 | 2.77 | 5.46 | 1.04 | .34  | .27  | .01 | 100.27 | 233 | 106 | 192 | 496  | 787  | 85.65 | 535790 | 542630 |
| 20314 | 71.84 | 15.53 | 20    | 1.58 | 67   | 1.00 | 2.68 | 5.55 | .91  | .24  | .23  | .01 | 100.44 | 243 | 107 | 138 | 530  | 696  | 86.34 | 535720 | 542430 |
| 20315 | 72.44 | 14.72 | 18    | 1.67 | 60   | 1.15 | 2.65 | 5.45 | .71  | .33  | .25  | .01 | 100.67 | 204 | 106 | 245 | 534  | 617  | 85.69 | 535710 | 542550 |
| 20316 | 73.17 | 13.99 | 20    | 1.72 | 71   | 1.10 | 2.69 | 5.90 | .84  | .28  | .25  | .04 | 100.96 | 283 | 73  | 181 | 238  | 1578 | 87.44 | 535820 | 542240 |
| 20317 | 72.50 | 14.93 | 22    | 1.58 | 72   | 1.03 | 2.62 | 5.50 | 1.05 | .26  | .24  | .01 | 100.66 | 268 | 91  | 161 | 352  | 1179 | 86.44 | 536060 | 542240 |
| 20318 | 73.61 | 14.38 | 15    | 1.58 | 61   | 1.08 | 2.62 | 5.36 | .58  | .30  | .22  | .02 | 100.51 | 271 | 76  | 152 | 416  | 953  | 87.42 | 535945 | 542410 |
| 20319 | 74.16 | 14.28 | 10    | 1.37 | 63   | .83  | 2.38 | 5.10 | 1.13 | .21  | .23  | .01 | 100.39 | 278 | 60  | 105 | 319  | 948  | 87.37 | 536460 | 541960 |
| 20320 | 73.64 | 14.49 | 16    | 1.37 | 64   | .89  | 2.83 | 5.03 | 1.04 | .21  | .17  | .01 | 100.48 | 324 | 61  | 122 | 401  | 1288 | 87.70 | 536410 | 542160 |
| 20321 | 74.11 | 13.98 | 20    | 1.08 | 28   | .75  | 3.22 | 4.70 | 1.42 | .10  | .13  | .01 | 99.87  | 258 | 46  | 95  | 137  | 350  | 90.10 | 536330 | 542240 |
| 20322 | 73.16 | 14.78 | 16    | 1.44 | 40   | .79  | 2.79 | 5.17 | 1.13 | .22  | .22  | .01 | 100.36 | 270 | 82  | 135 | 570  | 322  | 88.08 | 536170 | 542170 |
| 20323 | 69.25 | 15.47 | 62    | 1.94 | 1.28 | 2.73 | 3.26 | 3.86 | .84  | .48  | .14  | .03 | 99.90  | 148 | 268 | 251 | 1086 | 826  | 77.60 | 535040 | 543050 |
| 20300 | 72.19 | 14.59 | 34    | 1.87 | .79  | 1.07 | 2.82 | 5.09 | 1.07 | .37  | .19  | .02 | 100.41 | 230 | 92  | 321 | 436  | 841  | 85.66 | 532930 | 544525 |
| 20301 | 70.69 | 15.76 | 22    | 2.08 | .78  | 1.19 | 2.78 | 5.33 | 1.00 | .33  | .28  | .01 | 100.43 | 256 | 80  | 209 | 546  | 879  | 84.31 | 532905 | 544550 |
| 20302 | 72.22 | 14.41 | 32    | 1.80 | .68  | 1.13 | 2.63 | 5.15 | 1.31 | .34  | .16  | .02 | 100.17 | 240 | 87  | 270 | 440  | 1234 | 85.57 | 532805 | 544450 |
| 20303 | 72.14 | 14.86 | 36    | 1.72 | .71  | 1.09 | 2.68 | 5.25 | .93  | .33  | .17  | .02 | 100.28 | 255 | 94  | 240 | 506  | 1051 | 85.85 | 532890 | 544370 |
| 20304 | 71.33 | 14.73 | 49    | 2.01 | .77  | 1.25 | 2.65 | 5.52 | 1.01 | .42  | .19  | .03 | 100.40 | 285 | 93  | 276 | 442  | 856  | 84.88 | 533000 | 544235 |
| 20305 | 72.90 | 14.33 | 32    | 1.65 | .54  | .99  | 2.71 | 5.17 | 1.07 | .31  | .16  | .02 | 100.18 | 238 | 87  | 239 | 366  | 844  | 87.08 | 532870 | 544270 |
| 20306 | 72.76 | 14.14 | 63    | 1.65 | .62  | 1.03 | 2.73 | 5.33 | .73  | .37  | .21  | .04 | 100.54 | 217 | 118 | 348 | 653  | 996  | 86.55 | 532690 | 544420 |
| 20307 | 70.61 | 15.00 | 51    | 2.30 | 1.13 | 1.47 | 2.95 | 5.29 | .56  | .49  | .22  | .04 | 100.57 | 194 | 133 | 540 | 678  | 883  | 83.19 | 532580 | 544330 |
| 20308 | 70.26 | 14.87 | 46    | 2.59 | 1.11 | 1.49 | 2.77 | 5.15 | 1.00 | .55  | .25  | .03 | 100.60 | 208 | 143 | 434 | 677  | 1678 | 81.80 | 532635 | 544190 |
| 19252 | 75.08 | 13.32 | 28    | 1.29 | .29  | .89  | 2.48 | 5.49 | .43  | .19  | .06  | .01 | 100.00 | 236 | 71  | 207 | 366  | 226  | 90.49 | 534680 | 543245 |
| 20001 | 59.04 | 15.87 | 77    | 5.53 | 3.46 | 5.23 | 3.54 | 4.75 | 0.00 | 1.27 | .57  | .11 | 99.66  | 148 | 308 | 238 | 553  | 830  | 60.81 | 526524 | 543914 |

| HR.    | S102  | AL203 | Fe2O3 | FeO  | IlmC | CAU  | MA2O | K2O  | H2O  | TiO2 | P2O5 | MAO | SUMME  | RB  | SR  | ZR  | BA   | F    | DI    | M      | H      |
|--------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|--------|-----|-----|-----|------|------|-------|--------|--------|
| 20004A | 59.13 | 16.37 | .55   | 6.52 | 2.51 | 4.60 | 3.04 | 3.51 | 0.00 | 1.57 | .95  | .12 | 99.31  | 128 | 422 | 519 | 930  | 1167 | 60.74 | 330880 | 346640 |
| 20004B | 59.35 | 16.10 | .30   | 6.16 | 2.47 | 4.35 | 3.47 | 4.07 | 0.00 | 1.39 | .85  | .11 | 98.64  | 152 | 393 | 456 | 944  | 1315 | 63.28 | 330880 | 346640 |
| 20005A | 57.76 | 16.08 | .67   | 6.39 | 2.70 | 4.61 | 2.98 | 4.24 | 0.00 | 1.49 | .98  | .13 | 98.14  | 154 | 394 | 534 | 1058 | 1431 | 60.43 | 330870 | 346687 |
| 20005B | 59.52 | 16.44 | .65   | 6.16 | 2.45 | 4.44 | 3.31 | 4.32 | 0.00 | 1.44 | .87  | .12 | 99.72  | 169 | 384 | 503 | 1951 | 1551 | 62.84 | 330870 | 346687 |
| 20006  | 62.31 | 15.73 | .22   | 5.56 | 2.34 | 3.26 | 3.54 | 4.10 | 0.00 | 1.28 | .78  | .09 | 99.18  | 142 | 259 | 414 | 1073 | 1244 | 68.99 | 331190 | 346622 |
| 20007A | 60.90 | 16.02 | .40   | 6.16 | 2.60 | 3.76 | 2.88 | 3.94 | 0.00 | 1.44 | .95  | .11 | 99.18  | 147 | 316 | 423 | 1004 | 1365 | 64.10 | 332032 | 346712 |
| 20007B | 58.16 | 16.33 | .36   | 6.57 | 2.67 | 5.14 | 3.74 | 2.62 | 0.00 | 1.48 | .80  | .11 | 97.78  | 138 | 492 | 432 | 976  | 1589 | 55.66 | 332032 | 346712 |
| 20008  | 58.86 | 15.92 | .50   | 6.81 | 3.02 | 4.13 | 2.72 | 3.88 | 0.00 | 1.61 | 1.04 | .13 | 98.72  | 143 | 344 | 420 | 984  | 1445 | 60.36 | 331304 | 346912 |
| 20009  | 59.51 | 16.12 | .43   | 6.17 | 2.64 | 4.31 | 2.70 | 4.10 | 0.00 | 1.49 | .93  | .13 | 98.92  | 150 | 370 | 521 | 958  | 1479 | 61.45 | 331350 | 346800 |
| 20011A | 61.02 | 16.04 | .42   | 5.27 | 2.57 | 3.93 | 2.95 | 4.16 | 0.00 | 1.30 | .88  | .11 | 98.76  | 165 | 320 | 395 | 871  | 1099 | 65.25 | 330302 | 344520 |
| 20011B | 57.50 | 16.43 | .59   | 6.53 | 3.27 | 4.70 | 2.95 | 4.10 | 0.00 | 1.63 | 1.12 | .12 | 99.75  | 150 | 382 | 474 | 839  | 1559 | 58.12 | 330302 | 344520 |
| 20012A | 58.85 | 16.54 | .17   | 6.16 | 2.97 | 5.26 | 2.69 | 3.06 | 0.00 | 1.50 | .93  | .12 | 98.05  | 153 | 824 | 519 | 1805 | 1544 | 56.38 | 331206 | 343968 |
| 20012B | 56.65 | 16.81 | .27   | 6.80 | 3.54 | 6.85 | 2.10 | 3.23 | 0.00 | 1.65 | 1.13 | .14 | 99.57  | 153 | 874 | 500 | 1979 | 1692 | 47.35 | 331206 | 343968 |
| 20012C | 56.85 | 16.55 | .42   | 6.47 | 3.39 | 5.92 | 2.64 | 2.98 | 0.00 | 1.57 | 1.06 | .12 | 98.00  | 150 | 783 | 501 | 1418 | 1529 | 52.41 | 331206 | 343968 |
| 20013  | 57.25 | 16.58 | .05   | 6.14 | 2.62 | 4.62 | 3.20 | 4.19 | 0.00 | 1.47 | 1.01 | .12 | 98.98  | 146 | 413 | 531 | 1138 | 1600 | 60.86 | 330880 | 346640 |
| 19082  | 47.10 | 15.20 | .32   | 3.88 | 1.66 | 2.10 | 3.00 | 4.50 | 0.00 | .81  | .34  | .05 | 98.90  | 198 | 201 | 301 | 915  | 1190 | 76.64 | 531240 | 543200 |
| 19083  | 48.60 | 14.90 | .38   | 3.02 | 1.46 | 1.50 | 2.90 | 4.70 | 0.00 | .64  | .27  | .04 | 98.75  | 213 | 197 | 291 | 851  | 1139 | 79.59 | 531460 | 543295 |
| 19091  | 67.60 | 14.90 | 1.34  | 2.16 | 1.36 | 2.10 | 3.10 | 4.50 | 0.00 | .69  | .30  | .04 | 98.43  | 204 | 186 | 310 | 850  | 1260 | 79.58 | 530888 | 546640 |
| 19092  | 65.50 | 15.70 | .71   | 3.09 | 1.66 | 2.20 | 2.90 | 5.10 | 0.00 | .65  | .49  | .04 | 97.98  | 180 | 221 | 368 | 1023 | 1490 | 77.34 | 530854 | 544922 |
| 19767  | 68.00 | 15.10 | .38   | 3.02 | 1.40 | 1.90 | 3.10 | 4.90 | 0.00 | .65  | .35  | .04 | 98.54  | 226 | 159 | 273 | 715  | 1260 | 80.83 | 531240 | 543755 |
| 19768  | 68.10 | 15.00 | .22   | 3.02 | 1.40 | 1.90 | 3.10 | 5.10 | 0.00 | .63  | .34  | .04 | 98.61  | 232 | 163 | 287 | 684  | 1425 | 81.31 | 530828 | 543884 |
| 19769  | 66.80 | 15.70 | .71   | 3.59 | 1.50 | 2.40 | 3.10 | 4.90 | 0.00 | .82  | .44  | .04 | 100.00 | 209 | 199 | 344 | 990  | 1392 | 76.23 | 531112 | 544020 |
| 19770  | 65.60 | 15.50 | .61   | 3.59 | 1.40 | 2.30 | 3.00 | 4.70 | 0.00 | .81  | .44  | .05 | 98.00  | 212 | 191 | 326 | 940  | 1441 | 76.76 | 531060 | 544050 |
| 19771  | 65.10 | 15.50 | .23   | 3.68 | 1.20 | 2.40 | 3.10 | 5.00 | 0.00 | .73  | .30  | .07 | 97.51  | 205 | 231 | 337 | 1242 | 1090 | 77.10 | 531351 | 544800 |
| 19774  | 66.60 | 15.50 | .49   | 3.31 | 1.20 | 2.20 | 3.20 | 5.10 | 0.00 | .70  | .29  | .04 | 98.63  | 219 | 215 | 316 | 1069 | 1725 | 78.67 | 531240 | 544070 |
| 19775  | 67.20 | 15.50 | .61   | 2.59 | .50  | 2.20 | 3.10 | 5.20 | 0.00 | .57  | .25  | .04 | 98.16  | 217 | 214 | 278 | 1291 | 1620 | 80.48 | 531242 | 544070 |
| 19791  | 71.40 | 14.10 | .56   | 1.44 | .46  | 1.50 | 2.80 | 5.60 | 0.00 | .40  | .15  | .03 | 98.78  | 264 | 118 | 265 | 638  | 1410 | 86.76 | 530888 | 546640 |
| 19792  | 71.90 | 14.20 | .66   | 1.44 | .30  | 1.50 | 2.90 | 5.60 | 0.00 | .39  | .14  | .04 | 99.27  | 257 | 128 | 211 | 716  | 1572 | 87.15 | 530888 | 546640 |
| 19794  | 72.50 | 14.00 | .31   | 2.59 | .66  | 1.40 | 2.70 | 5.10 | 0.00 | .48  | .20  | .05 | 99.93  | 274 | 115 | 270 | 455  | 1778 | 84.91 | 529644 | 544952 |
| 19820  | 70.86 | 14.76 | .42   | 2.14 | .76  | 1.47 | 2.84 | 4.57 | .92  | .40  | .17  | .01 | 99.72  | 230 | 125 | 254 | 781  | 1172 | 83.93 | 529100 | 545528 |

| HR.    | STC2  | AL203 | FE203 | FFG  | ITC | CAO  | HA20 | K20  | H20  | T102 | P205 | KNO | SUPPE  | RR  | SR  | 2R  | EA  | F    | DT    | R      | H      |
|--------|-------|-------|-------|------|-----|------|------|------|------|------|------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|------|-------|--------|--------|
| 19225A | 15.70 | 14.66 | 39    | 2.73 | 76  | 1.59 | 4.07 | 4.47 | .75  | .47  | .20  | .02 | 99.40  | 248 | 121 | 290 | 906 | 1199 | 85.00 | 531183 | 546634 |
| 19225B | 71.50 | 14.73 | 41    | 1.43 | 44  | 1.13 | 3.40 | 4.75 | .93  | .27  | .20  | .01 | 99.71  | 214 | 109 | 160 | 453 | 591  | 87.83 | 531183 | 546634 |
| 19228A | 71.67 | 14.80 | 42    | 1.76 | 42  | 1.57 | 2.70 | 5.22 | .81  | .44  | .13  | .01 | 99.35  | 234 | 121 | 510 | 730 | 1515 | 84.97 | 529434 | 546978 |
| 19228B | 11.16 | 14.16 | 81    | 1.55 | 59  | 1.42 | 3.32 | 5.08 | .92  | .38  | .11  | .01 | 99.50  | 232 | 109 | 352 | 911 | 1913 | 86.78 | 529455 | 546955 |
| 19229A | 71.60 | 14.36 | 71    | 1.51 | 51  | 1.31 | 2.88 | 5.05 | 1.00 | .33  | .13  | .01 | 99.60  | 228 | 113 | 274 | 756 | 1391 | 86.25 | 529455 | 546955 |
| 19230A | 72.12 | 14.57 | 44    | 1.46 | 56  | 1.14 | 3.64 | 4.76 | .83  | .28  | .18  | .02 | 100.03 | 279 | 93  | 139 | 598 | 991  | 87.95 | 530838 | 546640 |
| 19232A | 72.52 | 14.27 | 46    | 2.35 | 82  | 1.51 | 3.14 | 4.80 | .94  | .45  | .18  | .02 | 99.80  | 256 | 121 | 319 | 893 | 1297 | 84.03 | 529268 | 545029 |
| 19233A | 71.64 | 14.36 | 42    | 1.87 | 64  | 1.29 | 3.00 | 4.50 | .85  | .35  | .14  | .02 | 99.85  | 278 | 111 | 233 | 793 | 691  | 86.11 | 529248 | 545041 |
| 19234A | 72.20 | 14.70 | 48    | 1.02 | 44  | .99  | 3.16 | 4.51 | 1.05 | .25  | .17  | .01 | 99.69  | 279 | 95  | 178 | 398 | 1146 | 88.35 | 529255 | 545036 |
| 20620A | 72.60 | 14.58 | 53    | 1.02 | 50  | .76  | 2.85 | 5.47 | 0.00 | .25  | .12  | .03 | 99.20  | 324 | 106 | 189 | 349 | 886  | 89.79 | 529090 | 545536 |
| 20627A | 72.55 | 14.68 | 71    | 1.29 | 46  | .72  | 3.04 | 5.37 | 0.00 | .24  | .16  | .02 | 99.32  | 343 | 115 | 181 | 366 | 832  | 89.70 | 529004 | 545574 |
| 20671A | 74.20 | 14.03 | 70    | .95  | 36  | .46  | 2.40 | 5.23 | 0.00 | .13  | .13  | .01 | 99.27  | 354 | 86  | 109 | 332 | 620  | 91.87 | 529234 | 545580 |
| 20672A | 72.48 | 14.79 | 107   | 1.54 | 55  | .98  | 2.59 | 5.35 | 0.00 | .30  | .09  | .02 | 99.79  | 326 | 109 | 278 | 408 | 1522 | 87.84 | 528817 | 546752 |
| 20673A | 74.02 | 14.34 | 77    | .88  | 44  | .69  | 2.91 | 4.98 | 0.00 | .19  | .11  | .02 | 99.34  | 366 | 96  | 128 | 333 | 1085 | 91.44 | 528841 | 546743 |
| 20674A | 73.00 | 14.43 | 100   | .74  | 44  | .66  | 3.40 | 5.10 | 0.00 | .23  | .09  | .03 | 99.34  | 369 | 97  | 137 | 356 | 797  | 90.55 | 528823 | 546678 |
| 20675A | 74.08 | 14.29 | 92    | 1.29 | 52  | .89  | 2.26 | 5.31 | 0.00 | .24  | .08  | .03 | 99.91  | 333 | 122 | 229 | 483 | 1353 | 89.61 | 528890 | 546662 |
| 20675B | 71.53 | 13.35 | 83    | .65  | 40  | .52  | 3.56 | 4.93 | 0.00 | .04  | .16  | .03 | 96.00  | 443 | 26  | 87  | 165 | 1537 | 93.44 | 528890 | 546662 |
| 20676A | 72.79 | 15.00 | 34    | 1.33 | 57  | .87  | 3.04 | 5.25 | 0.00 | .21  | .12  | .02 | 99.54  | 347 | 115 | 145 | 479 | 1250 | 89.22 | 529102 | 546618 |
| 20676B | 72.81 | 14.70 | 56    | 1.01 | 46  | .82  | 3.62 | 5.10 | 0.00 | .22  | .11  | .02 | 99.42  | 312 | 112 | 148 | 381 | 1267 | 90.07 | 529102 | 546618 |
| 20677A | 73.35 | 14.30 | 83    | 1.58 | 61  | 1.18 | 2.88 | 5.23 | 0.00 | .25  | .06  | .03 | 100.00 | 318 | 129 | 240 | 517 | 1522 | 88.00 | 529102 | 546618 |
| 20678A | 73.57 | 14.96 | 105   | .44  | 53  | .60  | 2.73 | 5.47 | 0.00 | .20  | .08  | .02 | 99.65  | 357 | 107 | 125 | 357 | 760  | 91.44 | 528933 | 546255 |
| 20678B | 72.29 | 15.49 | 69    | .92  | 51  | .76  | 2.97 | 5.48 | 0.00 | .21  | .17  | .02 | 99.53  | 376 | 122 | 136 | 437 | 1023 | 89.72 | 528933 | 546255 |
| 20679A | 72.57 | 15.23 | 120   | .58  | 42  | .55  | 3.10 | 5.30 | 0.00 | .24  | .12  | .02 | 99.33  | 375 | 106 | 142 | 426 | 763  | 90.77 | 528905 | 545913 |
| 20680A | 72.77 | 15.12 | 123   | 1.21 | 58  | .88  | 2.71 | 5.15 | 0.00 | .21  | .19  | .02 | 99.17  | 372 | 117 | 128 | 404 | 1244 | 88.73 | 529120 | 546620 |
| 20681A | 75.63 | 13.17 | 123   | .30  | 34  | .52  | 3.55 | 4.63 | 0.00 | .12  | .04  | .01 | 99.53  | 406 | 37  | 140 | 102 | 948  | 93.78 | 529229 | 546335 |
| 20682A | 69.49 | 15.63 | 105   | 2.73 | 94  | 1.64 | 2.68 | 5.66 | 0.00 | .44  | .13  | .04 | 99.93  | 275 | 183 | 481 | 808 | 1479 | 82.72 | 529338 | 546472 |
| 20014A | 76.32 | 13.30 | 11    | .54  | 34  | .43  | 3.12 | 5.66 | .31  | .06  | .11  | .02 | 100.36 | 186 | 26  | 27  | 73  | 110  | 94.33 | 530786 | 543951 |
| 20015A | 75.37 | 14.05 | 53    | .56  | 38  | .47  | 3.36 | 4.66 | .52  | .09  | .17  | .03 | 100.19 | 223 | 34  | 50  | 176 | 644  | 92.40 | 532389 | 543651 |
| 20016A | 71.68 | 14.50 | 42    | 1.78 | 83  | 1.09 | 3.28 | 5.18 | .52  | .40  | .18  | .03 | 99.89  | 255 | 89  | 238 | 480 | 1121 | 87.15 | 532747 | 546382 |
| 20017A | 73.60 | 14.41 | 50    | .59  | 41  | .55  | 3.45 | 5.37 | .53  | .17  | .19  | .03 | 99.89  | 181 | 63  | 70  | 276 | 276  | 92.68 | 532095 | 546725 |

| NP.    | SIC2  | AL203 | FE203 | FE0  | UOC | CAU | NA70 | K20  | H20 | TI02 | P205 | MNO | SUMPE  | FB  | 3R | 2R  | BA  | F   | DI    | M             |
|--------|-------|-------|-------|------|-----|-----|------|------|-----|------|------|-----|--------|-----|----|-----|-----|-----|-------|---------------|
| 20018  | 73.06 | 14.44 | .38   | 1.32 | .72 | .83 | 3.28 | 4.96 | .57 | .29  | .24  | .02 | 100.07 | 258 | 75 | 111 | 326 | 845 | 89.05 | 531643 544824 |
| 20019  | 73.31 | 14.54 | .16   | 1.33 | .58 | .64 | 3.34 | 5.03 | .17 | .22  | .22  | .02 | 99.53  | 233 | 68 | 110 | 303 | 526 | 90.68 | 531565 544948 |
| 20020A | 75.34 | 14.05 | .53   | .19  | .23 | .21 | 2.70 | 6.86 | .21 | .02  | .14  | .01 | 100.10 | 201 | 15 | 23  | 43  | 126 | 96.36 | 531365 544940 |
| 20020B | 74.38 | 13.88 | .56   | .77  | .43 | .68 | 3.33 | 4.90 | .46 | .15  | .14  | .02 | 99.70  | 211 | 51 | 85  | 214 | 209 | 91.73 | 531365 544940 |
| 20021  | 72.33 | 14.84 | .77   | .06  | .81 | .67 | 3.37 | 5.11 | .67 | .26  | .26  | .03 | 100.08 | 233 | 84 | 118 | 356 | 492 | 89.54 | 531005 544943 |
| 20022  | 73.12 | 14.63 | .68   | .55  | .62 | .89 | 3.11 | 5.33 | .63 | .28  | .16  | .01 | 100.41 | 243 | 81 | 123 | 387 | 502 | 89.23 | 529745 544823 |
| 20023  | 72.74 | 14.68 | .49   | 1.19 | .72 | .87 | 3.33 | 5.25 | .55 | .28  | .18  | .03 | 100.31 | 287 | 90 | 135 | 381 | 979 | 89.04 | 529117 545308 |
| 20024A | 73.65 | 14.47 | .27   | 1.06 | .58 | .60 | 3.24 | 5.25 | .52 | .22  | .29  | .02 | 100.17 | 265 | 68 | 95  | 261 | 970 | 90.97 | 529142 545308 |
| 20024B | 73.64 | 14.06 | .45   | 1.09 | .50 | .61 | 3.34 | 5.05 | .61 | .15  | .25  | .02 | 100.31 | 226 | 55 | 63  | 306 | 757 | 90.61 | 529142 545308 |
| 20025  | 77.34 | 12.48 | .73   | .60  | .48 | .29 | 3.65 | 4.85 | .46 | .13  | .08  | .02 | 101.11 | 268 | 34 | 117 | 166 | 569 | 94.39 | 529865 545298 |
| 20026  | 73.30 | 14.07 | .34   | .98  | .50 | .64 | 3.43 | 5.06 | .62 | .16  | .26  | .02 | 99.98  | 191 | 62 | 81  | 289 | 527 | 90.96 | 529040 544830 |
| 20027  | 74.80 | 14.02 | .11   | .94  | .25 | .49 | 3.50 | 4.64 | .62 | .09  | .20  | .02 | 99.68  | 250 | 38 | 62  | 170 | 554 | 92.58 | 530332 543055 |
| 20028  | 75.60 | 14.51 | .01   | .47  | .21 | .46 | 3.44 | 4.71 | .54 | .10  | .21  | .01 | 100.27 | 255 | 42 | 141 | 154 | 791 | 93.13 | 530866 543115 |
| 20029  | 73.42 | 14.65 | .43   | .81  | .47 | .56 | 3.37 | 4.98 | .63 | .15  | .27  | .02 | 99.76  | 196 | 59 | 65  | 270 | 379 | 91.45 | 530903 543706 |
| 20030  | 72.18 | 14.41 | .58   | 1.69 | .84 | .85 | 3.06 | 5.22 | .41 | .32  | .22  | .02 | 99.77  | 199 | 86 | 115 | 431 | 529 | 88.04 | 532278 543452 |

KLEIN-MITTELKÖRNIGER GRANIT

ANHANG III

MESO-NORM DER VARISTISCHEN MAGMATITE DES VORDEREN BAYERISCHEN  
WALDES

## MESO-NORM

| Probe Nr.    | Ab    | Or    | An   | Qz    | Bi   | Hb | Wt   | Hm | Il   | Ap   | C    |
|--------------|-------|-------|------|-------|------|----|------|----|------|------|------|
| Hauzenberger |       |       |      |       |      |    |      |    |      |      |      |
| Granit I     |       |       |      |       |      |    |      |    |      |      |      |
| 2o 15o       | 28,63 | 27,84 | 1,91 | 31,09 | 4,83 | /  | 0,30 | /  | 0,21 | 0,78 | 2,86 |
| 2o 151       | 29,05 | 28,97 | 4,03 | 31,17 | 3,19 | /  | 0,45 | /  | 0,23 | 0,42 | 1,47 |
| 2o 153       | 27,53 | 28,45 | 3,42 | 31,14 | 4,64 | /  | 0,35 | /  | 0,32 | 0,59 | 2,16 |
| 2o 154       | 26,60 | 28,42 | 4,03 | 33,06 | 4,53 | /  | 0,16 | /  | 0,23 | 0,42 | 1,99 |
| 2o 155 A     | 18,89 | 27,33 | 3,42 | 39,57 | 4,59 | /  | 0,17 | /  | 0,19 | 0,52 | 4,67 |
| 2o 155 B     | 27,10 | 28,80 | 4,47 | 31,37 | 4,32 | /  | 0,41 | /  | 0,28 | 0,35 | 1,88 |
| 2o 156       | 28,63 | 27,95 | 2,63 | 31,48 | 5,07 | /  | 0,20 | /  | 0,24 | 0,52 | 2,12 |
| 2o 157       | 28,04 | 29,90 | 2,66 | 30,77 | 5,57 | /  | 0,19 | /  | 0,24 | 0,54 | 1,62 |
| 2o 160       | 25,92 | 28,94 | 3,70 | 33,55 | 3,82 | /  | 0,58 | /  | 0,16 | 0,40 | 2,35 |
| 2o 161       | 30,24 | 26,25 | 2,48 | 30,53 | 5,47 | /  | 0,16 | /  | 0,23 | 0,73 | 2,50 |
| 2o 162       | 27,53 | 27,98 | 3,26 | 32,75 | 3,87 | /  | 0,09 | /  | 0,21 | 0,54 | 2,58 |
| 2o 165 A     | 28,88 | 28,05 | 2,09 | 30,44 | 4,83 | /  | 0,45 | /  | 0,29 | 0,87 | 2,54 |
| 2o 165 B     | 29,48 | 26,29 | 3,14 | 31,26 | 5,04 | /  | 0,44 | /  | 0,29 | 0,57 | 2,13 |
| 2o 167 A     | 26,85 | 30,05 | 1,63 | 29,25 | 5,00 | /  | 0,36 | /  | 0,24 | 0,97 | 3,31 |
| 2o 167 C     | 23,04 | 30,88 | 3,64 | 31,56 | 5,17 | /  | 0,44 | /  | 0,30 | 0,64 | 3,11 |
| 2o 170 A     | 26,85 | 29,49 | 4,31 | 33,02 | 4,04 | /  | 0,22 | /  | 0,15 | 0,31 | 1,32 |
| 2o 170 C     | 27,19 | 33,60 | 3,35 | 27,98 | 3,89 | /  | 0,28 | /  | 0,23 | 0,47 | 2,32 |
| 2o 172       | 24,56 | 30,82 | 3,22 | 31,97 | 4,63 | /  | 0,20 | /  | 0,18 | 0,59 | 3,28 |
| 2o 174       | 29,56 | 28,84 | 3,50 | 30,25 | 4,90 | /  | 0,13 | /  | 0,20 | 0,54 | 1,23 |
| 2o 175       | 24,14 | 27,12 | 2,57 | 38,54 | 3,37 | /  | 0,17 | /  | 0,19 | 0,38 | 2,07 |
| 2o 176       | 25,66 | 29,15 | 3,92 | 32,44 | 3,96 | /  | 0,58 | /  | 0,29 | 0,21 | 1,85 |
| 2o 184       | 29,31 | 31,75 | 3,44 | 27,89 | 4,85 | /  | 0,03 | /  | 0,13 | 0,64 | 1,43 |

Ab = Albit, Or = Orthoklas, An = Anorthit, Qz = Quarz, Bi = Biotit, Hb = Hornblende, Wt = Megmnetit, Hm = Hämatit, Il = Ilmenit, Ap = Apatit, C = Corund;

## MESO-NORM

| Probe Nr.    | Ab    | Or    | An    | Qz    | Bi    | Hb | Mt   | Hm | Il   | Ap   | C    |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|------|----|------|------|------|
| Hauzenberger |       |       |       |       |       |    |      |    |      |      |      |
| Granit II    |       |       |       |       |       |    |      |    |      |      |      |
| 2o 163       | 27,44 | 26,05 | 6,58  | 29,23 | 6,43  | /  | 0,73 | /  | 0,38 | 0,61 | 1,76 |
| 2o 164       | 26,77 | 25,87 | 5,47  | 30,85 | 7,45  | /  | 0,35 | /  | 0,39 | 0,64 | 1,42 |
| 2o 166       | 26,85 | 26,82 | 4,50  | 28,17 | 8,32  | /  | 0,19 | /  | 0,37 | 0,76 | 2,44 |
| 2o 169       | 27,87 | 29,25 | 7,77  | 24,90 | 5,69  | /  | 1,70 | /  | 0,58 | 0,54 | 1,10 |
| 2o 171       | 25,66 | 25,82 | 6,32  | 28,16 | 8,98  | /  | 0,78 | /  | 0,58 | 0,71 | 2,04 |
| 2o 177 B     | 27,36 | 25,65 | 8,97  | 29,67 | 6,08  | /  | 0,22 | /  | 0,37 | 0,24 | 1,09 |
| 2o 178       | 28,21 | 21,00 | 7,77  | 30,57 | 8,69  | /  | 0,61 | /  | 0,47 | 0,54 | 1,05 |
| 2o 179       | 30,58 | 22,87 | 7,87  | 27,58 | 7,64  | /  | 0,17 | /  | 0,43 | 0,54 | 1,31 |
| 2o 180 A     | 29,31 | 24,39 | 9,76  | 27,66 | 6,12  | /  | 0,83 | /  | 0,44 | 0,24 | 0,54 |
| 2o 180 B     | 30,92 | 19,28 | 9,57  | 28,31 | 9,04  | /  | 0,80 | /  | 0,57 | 0,52 | 0,40 |
| 2o 180C      | 27,78 | 23,17 | 10,56 | 28,24 | 7,67  | /  | 0,26 | /  | 0,47 | 0,31 | 0,94 |
| 2o 180 D     | 28,80 | 19,88 | 8,79  | 30,09 | 9,15  | /  | 0,51 | /  | 0,58 | 0,50 | 0,77 |
| 2o 181       | 29,81 | 23,35 | 8,59  | 27,01 | 8,86  | /  | 0,09 | /  | 0,43 | 0,50 | 1,16 |
| 2o 182       | 27,87 | 23,06 | 10,49 | 29,55 | 7,35  | /  | 0,19 | /  | 0,45 | 0,26 | 0,01 |
| 2o 183       | 23,72 | 26,27 | 5,98  | 33,96 | 5,45  | /  | 0,44 | /  | 0,33 | 0,47 | 2,12 |
| 2o 192 A     | 24,48 | 31,42 | 5,47  | 27,56 | 7,28  | /  | 1,29 | /  | 0,50 | 0,57 | 1,18 |
| 2o 192 C     | 27,36 | 28,19 | 6,43  | 26,23 | 8,43  | /  | 0,64 | /  | 0,51 | 0,47 | 1,35 |
| 2o 194       | 27,53 | 27,77 | 7,42  | 25,03 | 8,00  | /  | 1,42 | /  | 0,64 | 0,61 | 1,16 |
| Hauzenberger |       |       |       |       |       |    |      |    |      |      |      |
| Granodiorit  |       |       |       |       |       |    |      |    |      |      |      |
| 2o 158       | 38,45 | 12,95 | 14,03 | 21,81 | 10,15 | /  | 0,33 | /  | 0,58 | 0,45 | 0,28 |
| 2o 159 A     | 38,20 | 13,87 | 16,23 | 21,21 | 8,14  | /  | 0,62 | /  | 0,53 | 0,42 | 0,38 |
| 2o 167 B     | 37,78 | 17,11 | 14,16 | 22,20 | 6,85  | /  | 0,58 | /  | 0,39 | 0,40 | 0,27 |

| Probe Nr.     | Ab    | Or    | An   | Qz    | MESO-NORM |    |  |      | Mt | Hm   | Il   | Ap   | C |
|---------------|-------|-------|------|-------|-----------|----|--|------|----|------|------|------|---|
|               |       |       |      |       | Bi        | Hb |  |      |    |      |      |      |   |
| Breitenberger |       |       |      |       |           |    |  |      |    |      |      |      |   |
| Granit        |       |       |      |       |           |    |  |      |    |      |      |      |   |
| 20 235        | 28,71 | 24,69 | 6,92 | 30,63 | 6,50      | /  |  | 0,36 | /  | 0,28 | 0,33 | 1,17 |   |
| 20 236        | 25,75 | 32,99 | 3,06 | 31,25 | 3,15      | /  |  | 0,45 | /  | 0,14 | 0,47 | 2,04 |   |
| 20 237        | 27,61 | 26,73 | 2,29 | 37,03 | 2,17      | /  |  | 0,12 | /  | 0,02 | 0,42 | 2,45 |   |
| 20 238        | 27,70 | 29,10 | 2,80 | 35,05 | 0,44      | /  |  | 1,20 | /  | 0,06 | 0,26 | 2,64 |   |
| 20 240        | 28,37 | 24,85 | 7,42 | 30,47 | 6,66      | /  |  | 0,45 | /  | 0,29 | 0,33 | 0,89 |   |
| 20 241        | 26,85 | 25,29 | 7,25 | 31,98 | 5,55      | /  |  | 0,64 | /  | 0,29 | 0,35 | 1,32 |   |
| 20 242        | 27,19 | 33,79 | 2,56 | 28,60 | 4,04      | /  |  | 0,61 | /  | 0,17 | 0,47 | 1,99 |   |
| 20 243        | 27,87 | 36,45 | 3,65 | 26,34 | 3,75      | /  |  | 0,38 | /  | 0,18 | 0,47 | 1,07 |   |
| 20 244        | 23,80 | 32,73 | 2,21 | 31,04 | 4,82      | /  |  | 0,51 | /  | 0,22 | 0,47 | 3,03 |   |
| 20 245        | 27,02 | 31,23 | 3,95 | 30,23 | 4,52      | /  |  | 0,41 | /  | 0,21 | 0,47 | 1,56 |   |
| 20 246        | 27,87 | 29,56 | 6,64 | 26,56 | 7,61      | /  |  | 0,33 | /  | 0,39 | 0,52 | 0,47 |   |
| 20 247        | 27,10 | 31,57 | 2,54 | 31,91 | 2,42      | /  |  | 0,75 | /  | 0,12 | 0,42 | 2,39 |   |
| 20 249        | 28,71 | 31,11 | 5,58 | 28,21 | 4,42      | /  |  | 0,67 | /  | 0,25 | 0,33 | 0,58 |   |
| 20 250        | 29,48 | 25,91 | 7,75 | 28,12 | 6,13      | /  |  | 0,59 | /  | 0,35 | 0,42 | 0,83 |   |
| 20 252        | 28,37 | 26,07 | 6,71 | 30,71 | 5,49      | /  |  | 0,45 | /  | 0,26 | 0,35 | 1,15 |   |
| 20 254        | 27,10 | 34,97 | 3,34 | 27,43 | 4,15      | /  |  | 0,51 | /  | 0,22 | 0,50 | 1,42 |   |
| 20 255        | 26,00 | 31,52 | 3,63 | 31,15 | 3,66      | /  |  | 0,54 | /  | 0,17 | 0,50 | 2,10 |   |
| Apophysen     |       |       |      |       |           |    |  |      |    |      |      |      |   |
| Hauzenberg    |       |       |      |       |           |    |  |      |    |      |      |      |   |
| 20 168        | 15,67 | 22,36 | 6,82 | 41,57 | 6,62      | /  |  | 0,57 | /  | 0,36 | 0,26 | 4,51 |   |
| 20 191        | 27,95 | 31,61 | 5,90 | 24,68 | 8,56      | /  |  | 0,33 | /  | 0,46 | 0,38 | 0,40 |   |
| 20 193        | 20,50 | 30,76 | 3,36 | 37,32 | 5,38      | /  |  | 0,58 | /  | 0,29 | 0,24 | 1,36 |   |
| 20 194        | 27,53 | 27,77 | 7,42 | 25,03 | 8,00      | /  |  | 1,42 | /  | 0,64 | 0,61 | 1,16 |   |

## MESO-NORM

| Probe Nr.      | Ab    | Or    | An     | Qz    | Bi    | Hb    | Mt   | Hm | Il   | Ap   | C    |
|----------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|------|----|------|------|------|
| Apophysen      |       |       |        |       |       |       |      |    |      |      |      |
| Hauzenberg     |       |       |        |       |       |       |      |    |      |      |      |
| 20 195         | 24,56 | 32,03 | 6,92   | 27,66 | 7,37  | /     | 0,71 | /  | 0,51 | 0,53 | 0,25 |
| 20 196         | 23,04 | 27,91 | 2,71   | 36,93 | 3,99  | /     | 0,12 | /  | 0,13 | 0,54 | 3,53 |
| 20 197         | 25,07 | 33,91 | 4,69   | 27,62 | 5,96  | /     | 1,45 | /  | 0,55 | 0,53 | 0,86 |
| 20 208         | 20,92 | 32,51 | 3,76   | 36,37 | 5,10  | /     | 0,07 | /  | 0,21 | 0,09 | 1,39 |
| 20 211         | 20,84 | 36,08 | 5,99   | 32,85 | 3,88  | /     | 0,01 | /  | 0,14 | 0,02 | 0,37 |
| 20 212         | 24,65 | 32,78 | 6,43   | 27,70 | 7,96  | /     | 0,15 | /  | 0,50 | 0,47 | 0,29 |
| 20 217         | 27,78 | 34,60 | 2,76   | 28,92 | 2,96  | /     | 0,70 | /  | 0,18 | 0,61 | 1,15 |
| Hauzenberger   |       |       |        |       |       |       |      |    |      |      |      |
| Diorit         |       |       |        |       |       |       |      |    |      |      |      |
| 20 170 B       | 38,20 | 23,42 | - 0,40 | 11,56 | 4,84  | 17,26 | 1,74 | /  | 1,24 | 1,37 | /    |
| Fürstensteiner |       |       |        |       |       |       |      |    |      |      |      |
| Diorit         |       |       |        |       |       |       |      |    |      |      |      |
| 20 218 B       | 35,32 | 18,74 | 8,68   | 18,71 | 12,28 | 3,22  | 1,23 | /  | 0,86 | 0,87 | /    |
| 20 220         | 36,76 | 10,94 | 13,70  | 14,96 | 8,47  | 12,62 | 0,74 | /  | 0,91 | 1,06 | /    |

MESO-NORM

| Probe Nr.      | Ab    | Or    | An     | Qz    | Bi     | Hb    | Mt   | Hm | Il   | Ap   | C    |
|----------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|------|----|------|------|------|
| Fürstensteiner |       |       |        |       |        |       |      |    |      |      |      |
| Diorit         |       |       |        |       |        |       |      |    |      |      |      |
| 2o 221 B       | 31,17 | 31,74 | - 0,72 | 10,46 | - 3,88 | 27,14 | 1,45 | /  | 1,24 | 0,99 | /    |
| 2o 222 A       | 31,85 | 12,80 | 14,65  | 18,91 | 16,85  | 1,99  | 1,25 | /  | 0,98 | 1,01 | /    |
| 2o 223         | 36,00 | 18,62 | 4,65   | 8,63  | 3,40   | 24,67 | 2,33 | /  | 1,19 | 1,32 | /    |
| 2o 224 A       | 36,84 | 18,32 | 2,85   | 4,01  | - 1,87 | 35,49 | 2,89 | /  | 1,34 | 1,72 | /    |
| 2o 225 A       | 29,81 | 20,94 | 9,98   | 24,49 | 11,75  | 0,24  | 1,02 | /  | 0,75 | 0,80 | /    |
| 2o 226         | 33,37 | 16,07 | 12,48  | 17,35 | 5,40   | 12,21 | 1,28 | /  | 0,75 | 0,90 | /    |
| 2o 227         | 30,41 | 21,70 | 8,57   | 20,32 | 8,81   | 7,11  | 1,36 | /  | 0,86 | 0,90 | /    |
| 2o 228         | 32,44 | 21,53 | 7,48   | 16,82 | 6,80   | 11,38 | 1,97 | /  | 1,03 | 1,04 | /    |
| 2o 230         | 33,80 | 15,77 | 4,06   | 9,77  | - 1,17 | 34,71 | 0,83 | /  | 1,27 | 1,18 | /    |
| Tittlinger     |       |       |        |       |        |       |      |    |      |      |      |
| Granit         |       |       |        |       |        |       |      |    |      |      |      |
| 2o 200         | 30,66 | 19,91 | 13,04  | 26,52 | 8,19   | /     | 0,29 | /  | 0,48 | 0,45 | 0,28 |
| 2o 206 A       | 30,41 | 15,69 | 10,89  | 30,75 | 9,04   | /     | 0,29 | /  | 0,47 | 0,54 | 0,79 |
| 2o 206 B       | 29,31 | 16,07 | 10,51  | 31,89 | 9,32   | /     | 0,35 | /  | 0,45 | 0,52 | 0,71 |
| 2o 207         | 30,83 | 20,82 | 11,19  | 28,90 | 6,77   | /     | 0,12 | /  | 0,40 | 0,47 | 0,49 |
| 2o 209         | 30,32 | 20,05 | 11,34  | 28,73 | 7,58   | /     | 0,20 | /  | 0,38 | 0,47 | 0,41 |
| 2o 213         | 32,78 | 21,62 | 9,24   | 23,19 | 4,83   | 5,95  | 0,80 | /  | 0,55 | 0,61 | /    |
| 2o 214         | 28,37 | 20,13 | 10,81  | 30,14 | 8,29   | /     | 0,57 | /  | 0,45 | 0,52 | 0,39 |
| 2o 215         | 30,58 | 16,03 | 14,81  | 26,11 | 10,40  | /     | 0,17 | /  | 0,52 | 0,54 | 0,54 |
| 2o 218 A       | 30,75 | 18,84 | 12,03  | 27,56 | 8,42   | /     | 0,51 | /  | 0,45 | 0,54 | 0,57 |
| 2o 219         | 29,90 | 18,63 | 11,75  | 28,90 | 7,89   | /     | 0,41 | /  | 0,44 | 0,52 | 0,87 |
| 2o 224 B       | 30,41 | 22,83 | 12,48  | 23,86 | 4,37   | 3,32  | 1,28 | /  | 0,58 | 0,35 | /    |

## MESO-NORM

| Probe Nr.        | Ab    | Or    | An    | Qz    | Bi   | Hb | Mt   | Hm | Il   | Ap   | C    |
|------------------|-------|-------|-------|-------|------|----|------|----|------|------|------|
| Eberhardsreuther |       |       |       |       |      |    |      |    |      |      |      |
| Granit           |       |       |       |       |      |    |      |    |      |      |      |
| 2o 201           | 28,46 | 20,71 | 8,51  | 32,65 | 7,09 | /  | 0,16 | /  | 0,34 | 0,40 | /    |
| 2o 202           | 30,15 | 19,50 | 10,84 | 29,52 | 8,14 | /  | 0,09 | /  | 0,37 | 0,40 | /    |
| 2o 203           | 27,78 | 22,88 | 6,04  | 34,04 | 5,00 | /  | 0,62 | /  | 0,28 | 0,24 | 2,19 |
| Zwei-Glimmer     |       |       |       |       |      |    |      |    |      |      |      |
| Granit           |       |       |       |       |      |    |      |    |      |      |      |
| 2o 198           | 21,51 | 31,41 | 2,00  | 37,14 | 2,47 | /  | 0,77 | /  | 0,12 | 0,50 | 3,11 |
| 2o 199           | 29,31 | 18,56 | 10,31 | 30,63 | 7,13 | /  | 0,87 | /  | 0,49 | 0,52 | 1,36 |
| 2o 233           | 31,93 | 29,25 | 4,03  | 26,87 | 5,50 | /  | 0,29 | /  | 0,22 | 0,50 | 0,98 |
| 2o 234           | 26,60 | 28,19 | 7,20  | 28,28 | 7,36 | /  | 0,67 | /  | 0,48 | 0,35 | 0,34 |
| Saldenburger     |       |       |       |       |      |    |      |    |      |      |      |
| Granit           |       |       |       |       |      |    |      |    |      |      |      |
| 2o 205           | 24,82 | 27,69 | 3,49  | 39,07 | 3,13 | /  | 0,01 | /  | 0,10 | 0,12 | 1,24 |
| 2o 221 A         | 28,63 | 30,85 | 2,33  | 31,87 | 3,67 | /  | 0,15 | /  | 0,13 | 0,38 | 1,49 |
| 2o 222 B         | 29,73 | 29,34 | 3,60  | 28,88 | 5,14 | /  | 0,16 | /  | 0,20 | 0,54 | 1,83 |
| 2o 225 B         | 29,81 | 28,98 | 5,26  | 27,45 | 6,49 | /  | 0,10 | /  | 0,30 | 0,52 | 0,54 |
| 2o 229           | 28,29 | 27,24 | 4,49  | 34,40 | 3,31 | /  | 0,04 | /  | 0,15 | 0,19 | 1,85 |
| 2o 258           | 26,51 | 27,12 | 6,58  | 30,44 | 7,53 | /  | 0,42 | /  | 0,36 | 0,54 | 1,05 |
| 2o 260           | 23,80 | 24,09 | 4,58  | 37,16 | 5,54 | /  | 1,26 | /  | 0,36 | 0,57 | 2,18 |
| 2o 261           | 23,55 | 26,73 | 3,08  | 39,66 | 3,36 | /  | 0,35 | /  | 0,17 | 0,28 | 2,58 |
| 2o 262           | 24,56 | 26,31 | 2,19  | 41,40 | 1,90 | /  | 0,48 | /  | 0,09 | 0,14 | 2,49 |
| 2o 263           | 23,63 | 26,09 | 2,89  | 40,06 | 3,40 | /  | 0,26 | /  | 0,17 | 0,50 | 3,01 |
| 2o 264           | 26,17 | 25,99 | 3,40  | 37,40 | 4,46 | /  | 0,22 | /  | 0,22 | 0,33 | 1,61 |
| 2o 265           | 27,19 | 26,93 | 5,26  | 28,78 | 7,01 | /  | 1,13 | /  | 0,47 | 0,73 | 1,94 |
| 2o 266           | 27,02 | 26,43 | 7,03  | 29,22 | 7,80 | /  | 0,52 | /  | 0,41 | 0,61 | 1,14 |

MESO-NORM

| Probe Nr.              | Ab    | Or    | An    | Qz    | Bi    | Hb | Mt   | Hm | Il   | Ap   | C    |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|------|----|------|------|------|
| Saldenburger<br>Granit |       |       |       |       |       |    |      |    |      |      |      |
| 2o 267                 | 25,75 | 26,41 | 6,50  | 30,95 | 7,51  | /  | 0,38 | /  | 0,41 | 0,59 | 1,58 |
| 2o 268                 | 25,66 | 25,66 | 5,35  | 35,30 | 5,70  | /  | 0,62 | /  | 0,29 | 0,45 | 1,19 |
| 2o 269                 | 23,12 | 22,44 | 4,04  | 43,28 | 4,84  | /  | 0,12 | /  | 0,20 | 0,26 | 1,62 |
| 2o 270                 | 26,60 | 26,85 | 6,15  | 29,23 | 8,06  | /  | 0,62 | /  | 0,41 | 0,52 | 1,56 |
| 2o 271                 | 26,43 | 24,12 | 4,92  | 33,19 | 7,81  | /  | 0,28 | /  | 0,30 | 0,50 | 2,33 |
| 2o 272                 | 19,57 | 40,96 | 3,28  | 34,76 | 1,21  | /  | 0,13 | /  | 0,09 | 0,07 | 0,95 |
| 2o 273                 | 25,66 | 26,56 | 7,01  | 29,57 | 8,19  | /  | 0,80 | /  | 0,44 | 0,64 | 1,59 |
| Apophysen<br>Vilshofen |       |       |       |       |       |    |      |    |      |      |      |
| 2o 231                 | 28,12 | 26,84 | 7,60  | 28,84 | 3,81  | /  | 2,38 | /  | 0,57 | 0,57 | 1,09 |
| 2o 232                 | 25,16 | 32,92 | 1,67  | 33,08 | 3,16  | /  | 0,39 | /  | 0,14 | 0,61 | 2,18 |
| Gangdiorit<br>Lalling  |       |       |       |       |       |    |      |    |      |      |      |
| 2o 283                 | 27,61 | 15,77 | 11,68 | 22,53 | 18,57 | /  | 2,09 | /  | 1,22 | 1,30 | 1,12 |
| 2o 284                 | 25,07 | 16,28 | 11,13 | 24,22 | 18,44 | /  | 2,20 | /  | 1,25 | 1,37 | 1,70 |
| 2o 285                 | 24,82 | 6,91  | 13,13 | 26,65 | 22,36 | /  | 2,39 | /  | 1,46 | 1,79 | 2,47 |
| 2o 286                 | 26,09 | 6,71  | 13,31 | 28,01 | 20,74 | /  | 1,46 | /  | 1,28 | 1,16 | 2,51 |
| 2o 288                 | 25,07 | 8,27  | 15,16 | 25,18 | 21,28 | /  | 1,68 | /  | 1,28 | 1,20 | 1,95 |
| Kaussinger<br>Granit   |       |       |       |       |       |    |      |    |      |      |      |
| 2o 274                 | 29,31 | 15,27 | 9,68  | 34,22 | 7,48  | /  | 0,29 | /  | 0,32 | 0,35 | 2,51 |
| 2o 275                 | 25,07 | 26,72 | 7,93  | 30,08 | 7,49  | /  | 0,83 | /  | 0,37 | 0,38 | 1,08 |
| 2o 276                 | 27,95 | 15,87 | 9,57  | 35,23 | 7,31  | /  | 0,22 | /  | 0,31 | 0,38 | 2,56 |

MESO-NORM

| Probe Nr.<br>Kaussinger<br>Granit | Ab    | Or    | An    | Qz    | Bi   | Hb   | Mt   | Hm | Il   | Ap   | C    |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|----|------|------|------|
| 2o 277                            | 22,02 | 27,13 | 4,71  | 36,44 | 5,07 | /    | 0,84 | /  | 0,27 | 0,38 | 2,95 |
| 2o 278                            | 14,31 | 34,62 | 3,88  | 38,82 | 5,61 | /    | 0,55 | /  | 0,21 | 0,28 | 2,26 |
| 2o 279                            | 28,04 | 15,48 | 9,40  | 35,34 | 7,37 | /    | 0,33 | /  | 0,33 | 0,40 | 2,77 |
| 2o 280                            | 27,02 | 19,73 | 11,77 | 29,49 | 8,81 | /    | 0,93 | /  | 0,52 | 0,42 | 1,30 |
| 2o 281                            | 25,49 | 18,19 | 12,88 | 30,89 | 8,91 | /    | 0,94 | /  | 0,51 | 0,47 | 1,47 |
| 2o 282                            | 25,33 | 15,37 | 8,82  | 37,79 | 7,09 | /    | 0,26 | /  | 0,34 | 0,38 | 3,62 |
| Mettener<br>Granit                |       |       |       |       |      |      |      |    |      |      |      |
| 2o 289                            | 25,66 | 18,50 | 10,47 | 34,69 | 6,79 | /    | 0,70 | /  | 0,37 | 0,28 | 2,07 |
| 2o 290                            | 21,18 | 23,57 | 4,84  | 39,12 | 6,07 | /    | 0,01 | /  | 0,26 | 0,40 | 4,12 |
| 2o 291                            | 23,29 | 21,05 | 9,30  | 34,82 | 7,24 | /    | 0,16 | /  | 0,35 | 0,40 | 3,01 |
| 2o 292                            | 39,05 | 18,38 | 9,25  | 23,36 | 6,65 | 1,77 | 0,36 | /  | 0,41 | 0,40 | /    |
| 2o 293                            | 25,33 | 17,78 | 12,11 | 32,60 | 8,80 | /    | 0,54 | /  | 0,48 | 0,35 | 1,58 |
| 2o 294                            | 20,33 | 26,65 | 2,61  | 41,01 | 2,76 | /    | 0,61 | /  | 0,15 | 0,61 | 4,62 |
| 2o 295                            | 23,12 | 28,32 | 3,32  | 36,30 | 3,93 | /    | 0,42 | /  | 0,21 | 0,59 | 3,64 |
| 2o 296                            | 29,65 | 22,13 | 7,38  | 30,64 | 5,59 | /    | 1,25 | /  | 0,37 | 0,38 | 1,76 |
| 2o 297                            | 25,49 | 20,07 | 9,38  | 33,33 | 8,22 | /    | 0,39 | /  | 0,45 | 0,35 | 1,73 |
| 2o 298                            | 17,45 | 38,29 | 6,87  | 33,24 | 1,89 | /    | 0,41 | /  | 0,16 | 0,26 | 1,34 |
| Flaser-<br>granit                 |       |       |       |       |      |      |      |    |      |      |      |
| 2o 309                            | 21,60 | 30,38 | 4,18  | 34,11 | 6,22 | /    | 0,35 | /  | 0,29 | 0,50 | 2,22 |
| 2o 310                            | 23,80 | 27,22 | 3,65  | 35,15 | 5,52 | /    | 0,29 | /  | 0,24 | 0,54 | 3,03 |
| 2o 311                            | 22,36 | 27,55 | 4,10  | 36,14 | 5,56 | /    | 0,25 | /  | 0,26 | 0,47 | 2,77 |

MESO-NORM

| Probe Nr.                  | Ab    | Or    | An    | Qz    | Bi   | Hb | Mt   | Hm | I1   | Ap   | C    |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|----|------|----|------|------|------|
| Flaser-granit              |       |       |       |       |      |    |      |    |      |      |      |
| 20 312                     | 22,61 | 29,08 | 3,70  | 34,20 | 5,61 | /  | 0,42 | /  | 0,25 | 0,54 | 3,12 |
| 20 313                     | 23,46 | 27,96 | 4,48  | 32,65 | 7,20 | /  | 0,32 | /  | 0,32 | 0,64 | 2,44 |
| 20 314                     | 22,70 | 29,29 | 3,75  | 33,37 | 5,87 | /  | 0,28 | /  | 0,23 | 0,54 | 3,74 |
| 20 315                     | 22,45 | 27,65 | 4,07  | 34,41 | 7,55 | /  | 0,26 | /  | 0,31 | 0,59 | 2,97 |
| 20 316                     | 22,78 | 30,76 | 3,82  | 33,27 | 6,84 | /  | 0,29 | /  | 0,27 | 0,59 | 1,78 |
| 20 317                     | 22,19 | 28,77 | 3,54  | 34,66 | 6,19 | /  | 0,32 | /  | 0,25 | 0,57 | 3,37 |
| 20 318                     | 22,19 | 28,12 | 3,92  | 36,14 | 5,94 | /  | 0,22 | /  | 0,29 | 0,52 | 2,83 |
| 20 319                     | 20,16 | 26,29 | 2,61  | 40,03 | 5,41 | /  | 0,23 | /  | 0,20 | 0,54 | 3,99 |
| 20 320                     | 23,97 | 26,45 | 3,30  | 36,48 | 5,45 | /  | 0,23 | /  | 0,20 | 0,40 | 3,18 |
| 20 321                     | 27,27 | 25,69 | 2,87  | 36,13 | 3,57 | /  | 1,12 | /  | 0,10 | 0,31 | 2,54 |
| 20 322                     | 23,63 | 27,52 | 2,48  | 36,05 | 5,10 | /  | 0,23 | /  | 0,21 | 0,52 | 3,68 |
| 19 252                     | 21,01 | 31,36 | 4,02  | 37,12 | 3,88 | /  | 0,41 | /  | 0,18 | 0,14 | 1,61 |
| Patersdorfer Granit        |       |       |       |       |      |    |      |    |      |      |      |
| 20 323                     | 27,61 | 17,41 | 12,62 | 30,05 | 8,74 | /  | 0,90 | /  | 0,46 | 0,33 | 1,29 |
| Granit von Sattelpfelstein |       |       |       |       |      |    |      |    |      |      |      |
| 20 300                     | 23,89 | 25,81 | 4,06  | 34,53 | 7,09 | /  | 0,49 | /  | 0,35 | 0,45 | 2,95 |
| 20 301                     | 23,55 | 26,94 | 4,07  | 32,34 | 7,65 | /  | 0,29 | /  | 0,31 | 0,66 | 3,92 |
| 20 302                     | 22,28 | 26,51 | 4,56  | 35,22 | 6,55 | /  | 0,46 | /  | 0,32 | 0,38 | 2,84 |
| 20 303                     | 22,70 | 27,18 | 4,29  | 34,58 | 6,39 | /  | 0,55 | /  | 0,31 | 0,40 | 3,19 |
| 20 304                     | 22,45 | 28,26 | 4,96  | 32,63 | 7,25 | /  | 0,71 | /  | 0,40 | 0,45 | 2,58 |
| 20 305                     | 22,95 | 27,14 | 3,86  | 35,66 | 5,72 | /  | 0,46 | /  | 0,29 | 0,38 | 2,86 |
| 20 306                     | 23,12 | 27,36 | 3,73  | 34,85 | 6,75 | /  | 0,91 | /  | 0,35 | 0,50 | 2,51 |

## MESO-NORM

| Probe Nr.         | AB    | Or    | An    | Qz    | Bi    | Hb    | Mt   | Hm | I1   | Ap   | C    |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|------|------|------|
| Granit von        |       |       |       |       |       |       |      |    |      |      |      |
| Sattelpfeilstein  |       |       |       |       |       |       |      |    |      |      |      |
| 20 307            | 24,99 | 25,66 | 5,85  | 30,66 | 9,23  | /     | 0,74 | /  | 0,47 | 0,52 | 2,27 |
| 20 308            | 23,46 | 24,29 | 5,75  | 31,93 | 10,16 | /     | 0,67 | /  | 0,52 | 0,59 | 2,63 |
| Diorite           |       |       |       |       |       |       |      |    |      |      |      |
| Regensburger Wald |       |       |       |       |       |       |      |    |      |      |      |
| 20 001            | 29,98 | 19,36 | 7,48  | 7,78  | 8,91  | 23,35 | 1,12 | /  | 1,21 | 1,35 | /    |
| 20 004 A          | 25,75 | 8,02  | 16,60 | 19,30 | 24,82 | /     | 0,86 | /  | 1,49 | 2,24 | 1,04 |
| 20 004 B          | 29,39 | 9,63  | 16,01 | 16,66 | 24,04 | /     | 0,44 | /  | 1,32 | 2,01 | 0,10 |
| 20 005 A          | 25,24 | 9,76  | 16,45 | 17,10 | 25,36 | /     | 0,97 | /  | 1,42 | 2,31 | 0,55 |
| 20 005 B          | 28,04 | 11,34 | 16,33 | 16,67 | 23,61 | /     | 0,94 | /  | 1,37 | 2,05 | 0,32 |
| 20 006            | 29,98 | 11,02 | 11,06 | 21,23 | 21,98 | /     | 0,32 | /  | 1,22 | 1,84 | 1,40 |
| 20 007 A          | 24,39 | 8,59  | 12,43 | 23,69 | 24,41 | /     | 0,58 | /  | 1,37 | 2,24 | 2,45 |
| 20 007 B          | 25,75 | /     | 19,35 | 21,40 | 26,45 | 0,65  | 0,52 | /  | 1,41 | 1,89 | 1,42 |
| 20 008            | 23,04 | 6,39  | 13,68 | 22,37 | 27,41 | /     | 0,73 | /  | 1,53 | 2,45 | 2,22 |
| 20 009            | 23,63 | 9,03  | 15,29 | 20,97 | 25,29 | /     | 0,62 | /  | 1,42 | 2,19 | 1,48 |
| 20 011 A          | 24,99 | 11,07 | 13,73 | 21,99 | 22,31 | /     | 0,61 | /  | 1,24 | 2,08 | 1,64 |
| 20 011 B          | 24,99 | 7,13  | 16,28 | 18,01 | 28,28 | /     | 0,86 | /  | 1,55 | 2,64 | 1,16 |
| 20 012 A          | 22,78 | 2,38  | 20,00 | 22,65 | 25,95 | /     | 0,25 | /  | 1,43 | 2,19 | 1,46 |
| 20 012 B          | 17,79 | 0,28  | 26,58 | 20,59 | 30,86 | /     | 0,39 | /  | 1,57 | 2,67 | 0,10 |
| 20 012 C          | 22,36 | 0,67  | 22,42 | 20,40 | 27,88 | /     | 0,61 | /  | 1,49 | 2,50 | 0,79 |
| 20 013            | 27,87 | 9,92  | 16,30 | 15,52 | 24,49 | /     | 1,44 | /  | 1,40 | 2,38 | 0,64 |
| Kristall-         |       |       |       |       |       |       |      |    |      |      |      |
| granit I          |       |       |       |       |       |       |      |    |      |      |      |
| 19 082            | 25,41 | 17,56 | 8,19  | 28,87 | 15,03 | /     | 0,45 | /  | 0,77 | 0,80 | 2,38 |

## MESO-NORM

| Probe Nr.<br>Kristall- | Ab    | Or    | An   | Qz    | Bi    | Hb | Mt   | Hm | Il   | Ap   | C    |
|------------------------|-------|-------|------|-------|-------|----|------|----|------|------|------|
| granit I               |       |       |      |       |       |    |      |    |      |      |      |
| 19 083                 | 24,56 | 20,46 | 7,66 | 30,42 | 12,10 | /  | 0,55 | /  | 0,61 | 0,64 | 2,23 |
| 19 091                 | 26,26 | 23,51 | 8,45 | 27,14 | 8,73  | /  | 1,94 | /  | 0,66 | 0,71 | 1,39 |
| 19 092                 | 24,56 | 22,46 | 7,70 | 25,77 | 12,62 | /  | 1,03 | /  | 0,62 | 1,16 | 2,58 |
| 19 767                 | 26,26 | 22,33 | 7,13 | 28,11 | 11,08 | /  | 0,55 | /  | 0,62 | 0,83 | 2,08 |
| 19 768                 | 26,26 | 23,46 | 7,20 | 27,42 | 11,17 | /  | 0,41 | /  | 0,60 | 0,80 | 1,74 |
| 19 769                 | 26,26 | 20,76 | 9,02 | 26,10 | 13,57 | /  | 1,03 | /  | 0,78 | 1,04 | 1,98 |
| 19 770                 | 25,41 | 19,75 | 8,53 | 26,46 | 13,35 | /  | 0,88 | /  | 0,77 | 1,04 | 2,35 |
| 19 771                 | 26,26 | 21,40 | 9,94 | 23,62 | 13,74 | /  | 0,33 | /  | 0,69 | 0,71 | 1,34 |
| 19 774                 | 27,10 | 22,94 | 9,01 | 24,55 | 12,02 | /  | 0,71 | /  | 0,67 | 0,68 | 1,40 |
| 19 775                 | 26,26 | 25,29 | 9,28 | 25,24 | 9,07  | /  | 0,88 | /  | 0,54 | 0,59 | 1,37 |
| 19 791                 | 23,72 | 30,61 | 6,61 | 30,87 | 4,11  | /  | 1,39 | /  | 0,38 | 0,35 | 1,06 |
| 19 792                 | 24,56 | 30,77 | 6,52 | 30,76 | 3,89  | /  | 1,25 | /  | 0,37 | 0,33 | 0,97 |
| 19 794                 | 22,87 | 25,26 | 5,63 | 34,82 | 8,32  | /  | 0,45 | /  | 0,46 | 0,47 | 1,97 |
| Kristall-              |       |       |      |       |       |    |      |    |      |      |      |
| granit II              |       |       |      |       |       |    |      |    |      |      |      |
| 19 220                 | 24,05 | 24,91 | 6,18 | 32,63 | 7,47  | /  | 0,61 | /  | 0,38 | 0,40 | 2,46 |
| 19 225 A               | 34,47 | 21,62 | 6,58 | 26,05 | 8,06  | /  | 0,57 | /  | 0,45 | 0,47 | 0,70 |
| 19 225 B               | 28,80 | 25,24 | 4,30 | 32,16 | 4,74  | /  | 0,59 | /  | 0,26 | 0,47 | 2,41 |
| 19 228                 | 22,87 | 27,82 | 6,94 | 31,97 | 5,06  | /  | 1,19 | /  | 0,42 | 0,31 | 2,16 |
| 19 229 A               | 28,12 | 26,93 | 6,32 | 29,65 | 5,09  | /  | 1,17 | /  | 0,36 | 0,26 | 0,88 |
| 19 229 B               | 22,39 | 26,93 | 5,65 | 33,06 | 4,83  | /  | 1,03 | /  | 0,31 | 0,31 | 2,28 |
| 19 230                 | 30,83 | 24,96 | 4,48 | 30,77 | 5,26  | /  | 0,64 | /  | 0,27 | 0,42 | 1,78 |
| 19 232                 | 26,60 | 23,43 | 6,31 | 31,54 | 8,26  | /  | 0,67 | /  | 0,43 | 0,42 | 1,53 |
| 19 233                 | 26,17 | 25,64 | 5,48 | 32,38 | 6,44  | /  | 0,61 | /  | 0,33 | 0,33 | 1,86 |

MESO-NORM

| Probe Nr.                          | Ab    | Or    | An   | Qz    | Bi   | Hb | Mt   | Hm | Il   | Ap   | C    |
|------------------------------------|-------|-------|------|-------|------|----|------|----|------|------|------|
| Kristall-<br>granit II             |       |       |      |       |      |    |      |    |      |      |      |
| 19 234                             | 26,77 | 26,79 | 3,80 | 33,37 | 3,66 | /  | 0,99 | /  | 0,24 | 0,40 | 2,79 |
| Kl.-bis mittel-<br>körniger Granit |       |       |      |       |      |    |      |    |      |      |      |
| 20 014                             | 26,43 | 31,88 | 1,41 | 35,87 | 2,56 | /  | 0,16 | /  | 0,06 | 0,26 | 1,25 |
| 20 015                             | 28,46 | 26,16 | 1,22 | 37,44 | 2,20 | /  | 0,77 | /  | 0,09 | 0,40 | 3,03 |
| 20 016                             | 27,78 | 26,38 | 4,23 | 30,93 | 6,97 | /  | 0,61 | /  | 0,38 | 0,42 | 1,94 |
| 20 017                             | 29,22 | 30,19 | 1,48 | 32,40 | 2,46 | /  | 0,73 | /  | 0,16 | 0,45 | 2,37 |
| 20 018                             | 27,78 | 25,98 | 2,55 | 33,88 | 5,45 | /  | 0,55 | /  | 0,28 | 0,57 | 2,70 |
| 20 019                             | 28,29 | 26,62 | 1,73 | 33,86 | 5,18 | /  | 0,23 | /  | 0,21 | 0,52 | 2,93 |
| 20 020 A                           | 23,63 | 39,76 | 0,12 | 32,79 | 1,25 | /  | 0,04 | /  | 0,02 | 0,33 | 1,99 |
| 20 020 B                           | 28,21 | 27,19 | 2,46 | 35,17 | 2,86 | /  | 0,81 | /  | 0,14 | 0,33 | 2,19 |
| 20 021                             | 28,54 | 27,36 | 1,62 | 32,45 | 4,49 | /  | 1,12 | /  | 0,25 | 0,61 | 3,17 |
| 20 022                             | 26,34 | 29,07 | 3,37 | 33,15 | 3,88 | /  | 0,99 | /  | 0,27 | 0,38 | 2,51 |
| 20 023                             | 28,21 | 27,92 | 3,14 | 31,90 | 5,04 | /  | 0,71 | /  | 0,27 | 0,42 | 2,36 |
| 20 024 A                           | 27,44 | 28,33 | 1,08 | 34,22 | 4,42 | /  | 0,39 | /  | 0,21 | 0,68 | 3,06 |
| 20 024 B                           | 28,29 | 27,44 | 1,39 | 34,26 | 3,98 | /  | 0,65 | /  | 0,14 | 0,59 | 3,13 |
| 20 025                             | 30,92 | 27,11 | 0,91 | 37,13 | 2,43 | /  | 1,06 | /  | 0,12 | 0,19 | 0,88 |
| 20 026                             | 29,05 | 27,57 | 1,47 | 33,32 | 3,84 | /  | 0,49 | /  | 0,15 | 0,61 | 3,01 |
| 20 027                             | 29,65 | 25,62 | 1,12 | 36,18 | 3,08 | /  | 0,16 | /  | 0,09 | 0,47 | 2,82 |
| 20 028                             | 29,14 | 26,68 | 0,91 | 37,15 | 1,92 | /  | 0,01 | /  | 0,10 | 0,50 | 3,41 |
| 20 029                             | 28,54 | 27,44 | 1,01 | 34,30 | 3,23 | /  | 0,62 | /  | 0,14 | 0,64 | 3,34 |
| 20 030                             | 25,92 | 26,93 | 2,78 | 33,18 | 6,44 | /  | 0,84 | /  | 0,30 | 0,52 | 2,70 |

MESO-NORM

| Probe Nr.     | Ab    | Or    | An   | Qz    | Bi   | Hb | Mt   | Hm   | Il   | Ap   | C    |
|---------------|-------|-------|------|-------|------|----|------|------|------|------|------|
| Granitporphyr |       |       |      |       |      |    |      |      |      |      |      |
| 20 669        | 24,14 | 30,22 | 2,98 | 33,87 | 3,39 | /  | 1,35 | /    | 0,24 | 0,28 | 2,87 |
| 20 670        | 25,75 | 29,19 | 2,52 | 33,20 | 4,20 | /  | 1,03 | /    | 0,23 | 0,38 | 2,94 |
| 20 671        | 21,09 | 29,10 | 1,43 | 39,06 | 2,96 | /  | 1,02 | /    | 0,12 | 0,31 | 4,35 |
| 20 672        | 21,94 | 28,72 | 4,27 | 35,07 | 4,76 | /  | 1,55 | /    | 0,29 | 0,21 | 3,17 |
| 20 673        | 24,65 | 27,62 | 2,70 | 36,84 | 2,92 | /  | 1,12 | /    | 0,18 | 0,26 | 3,17 |
| 20 674        | 29,56 | 28,49 | 2,68 | 32,09 | 2,57 | /  | 1,45 | /    | 0,22 | 0,21 | 2,18 |
| 20 675 A      | 19,14 | 28,88 | 3,89 | 38,91 | 4,10 | /  | 1,33 | /    | 0,23 | 0,19 | 3,40 |
| 20 675 B      | 30,15 | 27,80 | 1,53 | 31,27 | 2,13 | /  | 1,20 | /    | 0,04 | 0,38 | 1,59 |
| 20 676 A      | 25,75 | 28,05 | 3,53 | 33,47 | 4,94 | /  | 0,49 | /    | 0,20 | 0,28 | 3,02 |
| 20 676 B      | 30,66 | 27,97 | 3,35 | 30,76 | 3,54 | /  | 0,81 | /    | 0,21 | 0,26 | 1,99 |
| 20 677        | 24,39 | 27,59 | 5,46 | 34,20 | 5,52 | /  | 0,77 | /    | 0,24 | 0,14 | 1,90 |
| 20 678 A      | 23,12 | 30,40 | 2,45 | 35,67 | 3,05 | /  | /    | 1,05 | 0,19 | 0,19 | 3,65 |
| 20 678 B      | 25,16 | 30,28 | 2,76 | 32,83 | 3,39 | /  | 1,00 | /    | 0,20 | 0,40 | 3,66 |
| 20 679        | 26,26 | 30,14 | 1,94 | 33,39 | 1,75 | /  | 1,74 | /    | 0,23 | 0,28 | 3,68 |
| 20 680        | 22,95 | 27,59 | 3,12 | 35,93 | 4,70 | /  | 0,48 | /    | 0,20 | 0,45 | 3,94 |
| 20 681        | 30,07 | 26,13 | 2,32 | 36,24 | 1,95 | /  | /    | 1,23 | 0,11 | 0,09 | 1,46 |
| 20 682        | 22,70 | 28,71 | 7,28 | 29,07 | 7,80 | /  | 1,52 | /    | 0,42 | 0,31 | 2,42 |

# L I T E R A T U R V E R Z E I C H N I S

- BATEMAN, P.C., CAPPELL B.W. (1979): Crystallization, fractionation and Solidification of the Tuolumne Intrusive Series, Yosemite National Park. Geol.Soc. Am.Bull 90: 465-482.
- BEHR, H.J. (1978: Subfluenzprozesse im Grundgebirgs-Stockwerk Mitteleuropas. Z.dt.geol.Ges.129, S. 283-318.
- BLÜMEL, P., SCHREYER, W. (1976): Progressive regional Low-Pressure Metamorphism in Moldanubian Metapelites of the Northern Bavarian Forest, Germany. Krystalinikum 12, S.7-30.
- BÜSCH, W. (1966): Petrographie und Abfolge der Granitisation im Schwarzwald. N. Jb. Mineral.Abhandl., 104, S. 190-258.
- BURRET, C.F. (1972): Plate tectonics and the Hercynian orogeny. Nature 239, S. 155-157.
- CARMICHEL, J.S.E., TURNER, F.J., VERHOOGEN, J., (1974): Igneous Petrology. Mc Craw-Hill International Series in the Earth and planetary Sciences. McCraw-Hill Book Company, 739 S..
- CETIN, B. (1979): Geochem. und petrogr. Untersuchungen an klein- bis mittelkörnigen Graniten des Regensburger Waldes. Diplomarbeit Universität München.
- CLOOS, H., (1923): Kurze Beiträge z. Tektonik d. Magmas: 1. Die Intrusionsfolge im Bayerischen Wald. 2. Die Batholiten d. Bayer. Waldes und der Pfahl.-- Geolog. Rundschau 14, S. 7-20
- CLOOS, H., BALK, E., CLOOS, E., SCHOLZ, H., (1927): Die Plutone des Passauer Waldes. Ihr Bau und Werdegang und ihre innere Tektonik.-- Moogr. zur Geol.u.Paläont SerII, H.3, Berlin 1927.
- COGNE, J. (1972): Le Briovérien et le cycle orogénique cadomiens dans le cadre des orogènes fini-précambriens.-- Coll. Int. C.R.N.S., Paris 192, S.193-218.
- DIDIER, J. (1973): Granites and their Enclaves.-- Elsevier Scientific Publ., Amsterdam.

- DOLLINGER, W. (1961): Geologisch-petrographische Untersuchung im Südtail des Gradabteilungsblattes Waldkirchen.-- Diplomarbeit Universität München.
- DÜRR, St. (1958) Geol.-petr. Untersuchungen im Ostteil d. Gradabt. Bl. Lalling im Bayerischen Wald.-- Geol.Diplomarbeit Universität München.
- EIGENFELD, F., SCHWAB, M., (1974): Zur geotektonischen Stellung des pemosilesischen subsequenten Vulkanismus in Mitteleuropa.-- Z.geol.Wiss.2, S.115-137.
- EMMERMANN, R. (1977): A Petrogenetic Modell for the Origin and Evolution of the Hercynian Granite series of the Schwarzwald.-- N.Jb.Mineral.Abh.128, 3, S.219-253.
- FARZANEH, A. (1979): Analytik, Verteilung und Verhalten des Fluors am Beispiel ausgewählter Gesteine und Minerale aus Ostbayern.-- Diss. Universität München.
- FISCHER, G. (1959): Der Bau des Vorderen Bayerischen Waldes.-- J.Ber.Mitt.Oberr.Geol.Ver. 41, S. 1-22.
- FISCHER, G. (1965): Über die modale Zusammensetzung der Eruptiva im ostbayerischen Kristallin.-- Geol.Bavarica 55, S. 7-23.
- FISCHER, G., (1968): Über das Moldanubikum der Bayer. Oberpfalz und des Bayer. Waldes.-- Aufschluß S. 27-111, (Sonderheft Exkursionsführer).
- FOURCADE, S., ALLEGRE, C.J., (1981): Trace Elements Behavior in Granite Genesis: A Case Study. The Calc-Alkaline Plutonic Association from the Querigut Complex (Py-rénées, France).-- Contrib.Mineral.Petrol. 76, S. 177-195.
- GÜMBEL, C.W. (1868): Geognostische Beschreibung des Ostbayerischen Grenzgebirges.-- Gotha 1868.
- HALL, A., (1973): Geothermal Control of Granite Compositions in the Variscan Orogenic Belt.-- Nature Physical Science Vol. 242, April 2., 1973.
- HERRMANN, A.G., WEDEPOHL, K.H., (1970): Untersuchungen an spilitischen Gesteinen der varistischen Geosynklinale in Nordwestdeutschland.-- Contr.Mineral.Petrol., 29, S. 255-274.

- HOTH, K., HIRSCHMANN, G. (1970): Das Jungpräkambrium im Bereich der Varistiziden und Kaledoniden West- und Nordeuropas und seine Beziehungen zu den paläozoischen Entwicklungsetappen.-- Ber.dt.Geol.Wiss.,A, Geol. Paläont. 15, S. 379-424.
- KNABE, W. (1976): Anatexis von Quarz-Plagioklas-Biotit-Metamorphiten.-- Geol.Jb. 89, S. 1-32.
- KÖHLER, H., MÜLLER-SOHNUS, D., (1975): Rb-Sr-Altersbestimmung als Beitrag zur Klärung des Kristallgranit I.-- Fortschritte Mineral.Bd.1, S. 39.
- KÖHLER, H. (1981): Rb-Sr-Altersbestimmungen u.Sr-Isotopen-Systematik an Gesteinen des Regensburger Waldes.-- Habilitationsarbeit Universität München.
- KRAFT, W. (1981): Geochemische und petrographische Untersuchungen am Kristallgranit II des Regensburger Waldes.-- Diplomarbeit Universität München.
- KREBS, W., WACHENDORF, H. (1973): Protoerozoic-Paleozoic geosynclinal and orogenic evolution of Central Europe.-- Geol.Soc.Amer.Bull. 84, S 2611-2630.
- KREBS, W. (1974): Faltungskerne im Mitteleuropäischen Grundgebirge - Abbilder eines orogenen Diapirismus.-- N.Jb.Geol.Paläont.Abh. 147, S. 30-60.
- KREBS, W. (1976): Franz-Kossmat-Symposium.-- Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina, Halle (Saale), S. 23-36.
- LANGMUIR, Ch.H., VOCKE, R.D., HANSON, G.N., HART, S.R., (1978) A General Mixing Equation with Application to Icelandic Basalts.-- Earth and Planetary Science Letters, 37, S. 380-392.
- LAURENT, R. (1972): The Hercynides of south Europe, a Model.-- XXIV intern.geol.Congr., Rept.3, S. 363-370.
- LIST, F.K. ( 1958): Geol.-petr. Untersuchungen im Westteil des Gradabts. Bl.Lalling.-- Geolog.Diplomarbeit Universität München.
- MASAK, M., ZOUBEK, V., (1960): Aera of the Variscian intramontane block, in: Tectonic Development of Czechoslovakia? Edited by V. Zoubek, S. 25-51.
- MADEL, J. (1968): Magmat. Entwicklung der Massivgranite der nördlichen Oberpfalz.-- Dissertationsarbeit Universität München.
- MIELKE, P., WINKLER, H.G.F., (1979): Eine bessere Berechnung der Mesonorm für granitische Gesteine.-- N.Jb. Miner. Mh. 10, S. 471-480.

- MÜLLER-SOHNUS, D., PROPACH, G., KOHLER, H., (1976): Gleichzeitige Intrusion von Bärhalde- und Schluchseegranit.- N.Jb. Miner. Abh. 127, 2, S. 174-186.
- NICHOLLS, J.A., LORENZ, V., (1973): Origin and Crystallisation history of permian Tholeiites from the Saar-Nahe-through, SW-Germany.-- Contr.Mineral.Petrol. 40, S. 327-344.
- NICOLAS, A. (1972): Was the Hercynian orogenic belt of Europe of the Andean Type?-- Nature 236, S. 221-223.
- OLBRICH, M. (1978): Geochemie und Petrographie von dioritischen Gesteinen des Regensburger Waldes.-- Diplomarbeit Universität München.
- PITCHER, W.S. (1978): The Nature, Ascent and Emplacement of granitic Magmas.-- J.geol.Soc.London, Vol. 136, S. 627-662.
- PRESNALL, D.C., BATEMAN, P.C., (1973): Fusion Relations in the System  $\text{NaAlSi}_3\text{O}_8$ - $\text{CaAl}_2\text{Si}_2\text{O}_8$ - $\text{KAlSi}_3\text{O}_8$ - $\text{SiO}_2$ - $\text{H}_2\text{O}$  and Generation of Granitic Magmas in the Sierra Nevada Batholith.-- Geol.Society o.Am.Bull, 84, S. 3181-3202.
- PROPACH, G. (1977): Varixcan Granitisation in the Regensburger Wald, West Germany.-- N.Jb.Mineral.Mh. 3, S. 97-111.
- PROPACH, G. (1978): Granitisation by mixing of crustal rocks and subduction-derived magma.-- N.Jb.Mineral.Mh. 12, S. 537-549.
- PROPACH, G. (1982): Tscherma's Min. Petr. Mitt., 30, S.117-128.
- RYGOL, W., (1980): Geochemie und Petrographie der Granitporphyre des westlichen Regensburger Waldes.-- Diplomarbeit Universität München.
- SCHOLZ, H. (1927): Das Saldenburger Granitmassiv und seine Umgebung.-- in CLOOS (1927).
- SCHREYER, W., (1957): Über das Alter der Metamorphose im Moldanubikum des südlichen Bayerischen Waldes.-Geol.Rundschau 46, S. 306-317, Stuttgart 1957.
- Schreyer, W., (1955): Erl.z.geol.K. von Vilshofen N'b.m.bes. Berücksichtigung der jüngeren Granite einschliesslich des Neustifter Granitmassivs.-- Diplomarbeit Universität München.

- SCHREYER, W., (1967): Das Grundgebirge in der Umgebung von Deggen-  
dorf an der Donau: in TROLL, G., (1967): Führer zu geo-  
logisch- petrographischen Exkursionen im Bayer. Wald.  
Teil I: Aufschlüsse im Mittel- und Ostteil.-- Geologica  
Bavarica Nr. 58, München 1967.
- SUESS, F.E. (1903): Bau und Bild der Böhmisches Masse. Wien 1903.-
- TROLL, G. (1964): Das Intrusivgebiet von Fürstenstein (Bayeri-  
scher Wald).-- Geol. Bavarica 52.
- TROLL, G. (1967): Führer zu geologisch-petrographischen Exkur-  
sionen im Bayerischen Wald, Teil I: Aufschlüsse im  
Mittel- und Ostteil.-- Geol. Bavarica 58.
- THORNTON, C.P., TUTTLE, O.F., (1960): Chemistry of igneous  
rocks.-- Amm.J.Sci., 258, S. 664-684.
- WHITE, A.J.R., CHAPPELL, B.W., (1977) Ultrametamorphism and  
Granitoid Genesis.-- Tectonophysics, 43, S. 7-22.
- WINKLER, H.G.F., BREITBART, R., (1978): New aspects of grani-  
tic magmas.-- N.Jb.Mineral.Mh., S.463-480.
- WINKLER, H.G.F. (1979): Petrogenesis of Metamorphic Rocks,  
5th Edition, Springer Verlag New York, Heidelberg,  
Berlin.
- WINTER, GRAUBERT, (1963): Diplomarbeit Universität München.
- ZWART, H.J. (1967): The duality of orogenic belts.-- Geol.  
en Mijnbouw 46, S. 283-309.



## LEBENS LAUF

|             |                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.07.1950  | geboren in Leoben/Österreich als Sohn<br>der Eheleute Alfred und Waltraut Olbrich                                                        |
| 1954        | Umzug nach Immenstadt/Allgäu B.R.D.                                                                                                      |
| 1956 - 1960 | Besuch der Volksschule Immenstadt                                                                                                        |
| 1960        | Umzug nach Füssen/Allgäu                                                                                                                 |
| 1960 - 1966 | Besuch der Oberrealschule Füssen                                                                                                         |
| 1966 - 1971 | Besuch des Gymnasium Hohenschwangau                                                                                                      |
| Okt. 1971   | Beginn des Studiums der Mineralogie an<br>Techn. Universität Clausthal-Zellerfeld                                                        |
| 1974        | Vordiplom                                                                                                                                |
| 1974 - 1975 | Unterbrechung des Studiums aus gesundheit-<br>lichen Gründen                                                                             |
| 1975 - 1976 | Fortsetzung des Studiums an der Universi-<br>tät Heidelberg                                                                              |
| 1976        | Wechsel an die L.M.Universität München                                                                                                   |
| 1978        | Beendigung des Studiums mit Erlangung des<br>Diploms im Fach Mineralogie                                                                 |
| 1979 - 1982 | Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter<br>am Mineralogisch-Petrographischen Institut<br>der Ludwig-Maximilians-Universität München |
| Heirat      | 1978, Hildegard Olbrich, geb. Gardel                                                                                                     |



